

जलोढ मृदा :-

- इस मृदा में नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी तथा पौष्टिक उचित मात्रा में मिलता है।
- यह हल्के भूरे रंग से राख के रंग की होती है।
- इस मृदा का विस्तार उत्तर के विशाल मैदान व तटीय मैदानी प्रदेश में मिलता है।
- यह मृदा २ वर्गों में वर्गीकृत है - खादर व बांगर

खादर मृदा



- नवीन जलोढ़ जिसे पंजाब में बैट कहा जाता है।
- इसमें कृषि कार्य कम सिंचाई के माध्यम से करते हैं।
- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मिलती है।

बांगर मृदा – पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, जो नदियों दूर ऊँचे क्षेत्रों में मिलती है तथा इसे पंजाब में धाया कहा जाता है।

- इस मृदा में कृषि कार्य सिंचाई के माध्यम से किया जाता है तथा अधिक सिंचाई के कारण मृदा में रेत/कल्लर की समस्या होती है, जिसके उपचार हेतु जिप्सम का उपयोग किया जाता है।

②. लाल-पीली मृदा :-

मोटे अनाजों की कृषि - (बाजरा, मक्का), सोयाबीन, तंबाकू आदि

→ निर्माण - प्राचीन आग्नेय तथा कथान्तरित चट्टानों के अपस्दन व अपक्षय
परिणाम स्वरूप

- लौह की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे तत्वों की कमी।

→ फेरस ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल तथा फेरिक ऑक्साइड में बदलने से पीले रंग की दिखाई देती है।

→ विस्तार :- प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भाग पर।

↳ पश्चिम में काठियावाड़ से पूर्व में राजमहल तथा उत्तर में
विन्ध्यांचल से दक्षिण में तमिलनाडू तक
↳ सर्वाधिक

③. काली मृदा :- निर्माण - लावा चट्टानों के अपक्षय से

- इसे कपासी या रेगुर या उष्णकटिबंधीय चर्नोजम या स्वतः जुताई वाली मृदा
- सर्वाधिक नमी धारण की क्षमता ।
- इसमें लौहा, एल्युमिनियम, चूना व फास्फोरस, ह्यूमस, नाइट्रोजन आदि की कमी मिलती है।
- सर्वाधिक कपास हेतु उपयुक्त है।
- विस्तार - दक्कन ट्रैप, राजमहल, कर्नाटक के लावा चट्टानों वाले क्षेत्रों में।