

⑦. पीट या दलदली मृदा :- इसका विकास निम्न ताप व अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। इस मृदा में ह्यूमस की प्रधानता होने के कारण काले रंग की दिखाई देती है। इस मृदा के क्षेत्रों में धान व जूट की कृषि की जाती है।

इस मृदा का विस्तार तराई क्षेत्र, डेल्टाई प्रदेशों में मिलता है।

⑧. लवणीय मृदा :- इस मृदा का विकास हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में हुआ है तथा इसकी प्राप्ति उन क्षेत्रों में भी होती है जहाँ ज्वारीय गतिविधियाँ अधिक सक्रिय होती हैं।

↳ कच्छ का रण

* इस मृदा के उपचार हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाता है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना :- 19. Feb. 2015

↳ राजस्थान के भीगंगानगर से शुरू।


मृदा बचाओ आंदोलन :- MP के होशंगाबाद से वर्ष 1977 में शुरू।

↳ तवा नदी पर निर्मित तवा बांध के विरोध में शुरू।

प्राकृतिक वनस्पतियाँ

- वृक्षों, झाड़ियों, लताओं आदि का समूह जिसका विकास बिना मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक पर्यावरण में होता है।
- प्राकृतिक वन के विकास को प्रभावित करने वाले कारक जल की उपलब्धता, सूर्य का प्रकाश, मृदा की गुणवत्ता आदि हैं।

वर्षा की मात्रा के आधार पर 5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है-



①. उष्णकटि. सदाबहार एवं अर्द्धसदाबहार वन- इन वनों के पत्ते गिरने, फल व फूल लगने का समय अलग² होता है अतः ये वर्षभर छे- भरे दिखाई देते हैं। इनका विकास 200 cm से अधिक औसत वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में हुआ है तथा यहां वृक्षों की औसत ऊंचाई 60 मीटर या अधिक प्राप्त होती तथा इन वनों की कैनोपी (वितान) आपस में मिली होती है अर्थात् ये इपिफाइटिक वन हैं। इन वनों की लकड़ी कठोर होती है अतः इनका वाणिज्यिक महत्व कम तथा पारिस्थितिक महत्व अधिक है।

→ इन वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, पश्चिम बंगाल का पूर्वी भाग, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सम्पूर्ण पूर्वोत्तर भारत में मिलता है।

→ मुख्य वनस्पतियाँ - शैजबुड, महोगनी, बांस, गीनबुड

→ अर्द्धसदाबहार वन - सदाबहार वनों वाले क्षेत्र में ही प्राप्त होते हैं, जहां थोड़ी कम वर्षा प्राप्त होती है अर्थात् ये सदाबहार तथा आर्द्र पर्णपाती वनों का मिश्रित रूप होते हैं।

→ मुख्य वनस्पतियाँ - साइडर, कैल, होलक आदि।

भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर प्राप्त

②. पर्णपाती या पतझड़ या मानसूनी वन (70-200 cm औसत वार्षिक वर्षा)

पर प्राप्त

①. आर्द्रपर्णपाती वन

औसत वार्षिक वर्षा : 100 से 200 cm

③. शुष्क पर्णपाती वन

औसत वार्षिक वर्षा : 70 से 100 cm

→ इनका विस्तार पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, पंजाब के पश्चिम, हिमालय का गिरिप्रादेशीय भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के क्षेत्रों में मिलता है।

मुख्य वनस्पतियाँ :- साल, सागवान, शीशम, हुरा, कुसुम, आंवला, अर्जुन, चंदन, सेमल, महुआ आदि।

↳ सर्वाधिक चंदन वृक्ष कर्नाटक तथा साल व सागवान के वृक्ष MP में मिलते हैं।

③. शुष्क पर्णपाती वन :- UP, बिहार, राजस्थान व प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में विरल रूप में प्राप्त होते हैं। इनमें मुख्य वनस्पतियाँ अक्सल वुड, अमलास, पलास, तेदुं, बैर आदि हैं।

↳ पत्तों से बीड़ी बनती है