

ID: 1116191012 氏名: 東田悠希

演習問題4

$f(x) = \sin x$ は $x=0$ で何回でも微分可能であるので $x=0$ の近傍で

$$f(x) = \sin 0 + \frac{\cos 0}{1!}x + \frac{(-\sin 0)}{2!}x^2 + \frac{(-\cos 0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

(演習問題2(1))

同様に $g(x) = \cos x$ とし

$$g(x) = \cos 0 + \frac{(-\sin 0)}{1!}x + \frac{(-\cos 0)}{2!}x^2 + \frac{(\sin 0)}{3!}x^3 + \frac{(\cos 0)}{4!}x^4 + \dots$$

$$= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

(演習問題2(1))

同様に $h(x) = e^x$ とし

$$h(x) = e^0 + \frac{e^0}{1!}x + \frac{e^0}{2!}x^2 + \frac{e^0}{3!}x^3 + \dots = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

(演習問題3(1))

" $=z$ " $x=i\theta$ とおくと

$$h(i\theta) = 1 + \frac{i\theta}{1!} + \frac{-\theta^2}{2!} + \frac{-i\theta^3}{3!} + \frac{\theta^4}{4!} + \frac{i\theta^5}{5!} + \frac{-\theta^6}{6!} + \frac{-i\theta^7}{7!} + \dots$$

$$= (i\theta - \frac{i\theta^3}{3!} + \frac{i\theta^5}{5!} - \frac{i\theta^7}{7!} + \dots) + (1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots)$$

$$= i(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \dots) + (1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots)$$

$$= \underline{i \sin \theta} + \underline{\cos \theta}$$

となりオイラーの公式が得られる。