

---

## 境界条件に対する解

有限区間  $0 \leq x \leq L$  における波動方程式

$$\frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} \quad (1)$$

ただし,  $v$  は定数, について, 非自明な解であり, かつ  $t \rightarrow \infty$  で  $\psi(x, t)$  が発散しない解を求める.

境界条件として, 両端が固定されている場合

$$\begin{cases} \psi(0, t) = 0 \\ \psi(L, t) = 0 \end{cases} \quad (2)$$

初期条件は,

$$\begin{cases} \psi(x, 0) = p(x) \\ \left. \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} \right|_{t=0} = q(x) \end{cases} \quad (3)$$

とする.

---

波動方程式の解を  $\psi(x, t) = \phi(x)\zeta(t)$  と仮定して式(1)へ代入して整理すると

$$\frac{1}{v^2\zeta(t)} \frac{d^2\zeta(t)}{dt^2} = \frac{1}{\phi(x)} \frac{d^2\phi(x)}{dx^2}$$

お互いに無関係なものが等しいのは、定数の場合である.

---

(i) 定数が正の場合, 定数を  $\omega^2$  として

$$\begin{cases} \frac{d^2\zeta(t)}{dt^2} = (v\omega)^2\zeta(t) \\ \frac{d^2\phi(x)}{dx^2} = \omega^2\phi(x) \end{cases}$$

第1式の解は,  $c_1, c_2$  を任意定数として

$$\zeta(t) = c_1 e^{v\omega t} + c_2 e^{-v\omega t}$$

第2式の解は,  $c_3, c_4$  を任意定数として

$$\phi(x) = c_3 e^{\omega x} + c_4 e^{-\omega x}$$

よって, 解は

$$\psi(x, t) = (c_3 e^{\omega x} + c_4 e^{-\omega x}) (c_1 e^{v\omega t} + c_2 e^{-v\omega t}) \quad \cdots \textcircled{1}$$

式 $\textcircled{1}$ を境界条件の式 (2) に用いて

$$\begin{cases} c_3 + c_4 = 0 \\ c_3 e^{\omega L} + c_4 e^{-\omega L} = 0 \end{cases}$$

---

よって,  $c_3 = 0$ ,  $c_4 = 0$  であるが, 波動方程式の解として不適である.

---

(ii) 定数が零の場合

$$\begin{cases} \frac{d^2\zeta(t)}{dt^2} = 0 \\ \frac{d^2\phi(x)}{dx^2} = 0 \end{cases}$$

第1式の解は、 $c_1$ ,  $c_2$ を任意定数として

$$\zeta(t) = c_1 t + c_2$$

第2式の解は、 $c_3$ ,  $c_4$ を任意定数として

$$\phi(x) = c_3 x + c_4$$

よって、解は

$$\psi(x, t) = (c_3 x + c_4)(c_1 t + c_2) \cdots \textcircled{2}$$

式 $\textcircled{2}$ を境界条件の式 (2) に用いて

$$\begin{cases} c_4 = 0 \\ c_3 L + c_4 = 0 \end{cases}$$

---

よって、 $c_3 = 0$ ,  $c_4 = 0$ であるが、波動方程式の解として不適である.

---

(iii) 定数が負の場合，定数を  $-\omega^2$  として

$$\begin{cases} \frac{d^2\zeta(t)}{dt^2} = -(v\omega)^2\zeta(t) \\ \frac{d^2\phi(x)}{dx^2} = -\omega^2\phi(x) \end{cases}$$

第1式の解は， $c_1$ ， $c_2$ を任意定数として

$$\zeta(t) = c_1 \cos v\omega t + c_2 \sin v\omega t$$

第2式の解は， $c_3$ ， $c_4$ を任意定数として

$$\phi(x) = c_3 \cos \omega x + c_4 \sin \omega x$$

よって，解は

$$\psi(x, t) = (c_3 \cos \omega x + c_4 \sin \omega x) (c_1 \cos v\omega t + c_2 \sin v\omega t) \cdots \textcircled{3}$$

式 $\textcircled{3}$ を境界条件の式 (2) に用いて

$$\begin{cases} c_3 = 0 \\ c_3 \cos \omega L + c_4 \sin \omega L = 0 \end{cases}$$

---

$c_4 \sin \omega L = 0$  より  $\omega L = n\pi$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) である.

$\omega_n = \frac{n\pi}{L}$  に対応する解は

$$\begin{aligned}\psi_n(x, t) &= c_{4n} \sin \frac{n\pi x}{L} \left( c_{1n} \cos \frac{n\pi vt}{L} + c_{2n} \sin \frac{n\pi vt}{L} \right) \\ &= \sin \frac{n\pi x}{L} \left( d_{1n} \cos \frac{n\pi vt}{L} + d_{2n} \sin \frac{n\pi vt}{L} \right)\end{aligned}$$

ただし,  $n = 1, 2, \dots$  であり,  $d_{1n} = c_{1n}c_{4n}$ ,  $d_{2n} = c_{2n}c_{4n}$  とおいた.



---

以上より、与えられた境界条件を満たす波動方程式の解は、

$$\begin{aligned}\psi(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n(x, t) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi x}{L} \left( d_{1n} \cos \frac{n\pi vt}{L} + d_{2n} \sin \frac{n\pi vt}{L} \right)\end{aligned}\tag{4}$$

ここで、 $d_{1n}$ ,  $d_{2n}$  は弦の初期状態によって決まる定数である.

初期条件の式 (3) の第1式に式(4)を代入して

$$\psi(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} d_{1n} \sin \frac{n\pi x}{L} = p(x)$$

上式の両辺に  $\sin \frac{n\pi x}{L}$  を掛けて  $0 \leq x \leq L$  で積分することにより

$$d_{1n} = \frac{2}{L} \int_0^L p(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$

---

同様に、初期条件の式 (3) の第2式に式(4)を代入して

$$\left. \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} \right|_{t=0} = \sum_{n=1}^{\infty} d_{2n} \frac{n\pi v}{L} \sin \frac{n\pi x}{L} dx = q(x)$$

上式の両辺に  $\sin \frac{n\pi x}{L}$  を掛けて  $0 \leq x \leq L$  で積分することにより

$$d_{2n} = \frac{2}{n\pi v} \int_0^L q(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$

以上より、初期条件を満たす波動方程式の解は

$$\begin{aligned} \psi(x, t) = & \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi x}{L} \\ & \times \left[ \left\{ \frac{2}{L} \int_0^L p(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx \right\} \cos \frac{n\pi vt}{L} \right. \\ & \left. + \left\{ \frac{2}{n\pi v} \int_0^L q(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx \right\} \sin \frac{n\pi vt}{L} \right] \end{aligned} \quad (5)$$

---

**例 1** : 波動方程式  $\frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2}$  について, 境界条件が,  $\psi(0, t) = 0$ ,  $\psi(L, t) = 0$ , 初期条件が,  $\psi(x, 0) = \sin \frac{\pi x}{L}$ ,  $\left. \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} \right|_{t=0} = 0$  であるときの解を求めよ.

[解]

両端固定の境界条件であるので,  $\omega_n = \frac{n\pi}{L}$ , 解は式(5)で与えられる.

初期条件より,  $n \neq 1$  のとき

$$d_{1n} = \frac{2}{L} \int_0^L p(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx = 0$$

$n = 1$  のとき

$$d_{11} = \frac{2}{L} \int_0^L p(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx = 1$$

---

$$d_{2n} = \frac{2}{n\pi v} \int_0^L q(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx = 0$$

従って、与えられた境界条件，初期条件を満たす波動方程式の解は

$$\psi(x, t) = \sin \frac{\pi x}{L} \cos \frac{\pi v t}{L}$$

---

**例 2** : 波動方程式  $\frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2}$  について, 境界条件が,  $\psi(0, t) = 0$ ,  $\psi(L, t) = 0$ , 初期条件が,  $\psi(x, 0) = \begin{cases} \frac{2h}{L}x & (0 \leq x \leq \frac{L}{2}) \\ \frac{2h}{L}(L-x) & (\frac{L}{2} \leq x \leq L) \end{cases}$ ,  $\left. \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} \right|_{t=0} = 0$  であるときの解を求めよ.

[解]

両端固定の境界条件であるので,  $\omega_n = \frac{n\pi}{L}$ , 解は式(5)で与えられる.

初期条件より,

$$d_{1n} = \frac{2}{L} \int_0^L p(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{8h}{n^2 \pi^2} \sin \frac{n\pi}{2}$$

---

$$d_{2n} = \frac{2}{n\pi v} \int_0^L q(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx = 0$$

従って、与えられた境界条件，初期条件を満たす波動方程式の解は

$$\psi(x, t) = \frac{8h}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \frac{n\pi}{2} \sin \frac{n\pi x}{L} \cos \frac{n\pi vt}{L}$$

---

## 強制振動

弦に垂直な方向から外力  $F_v(x, t)$  が作用するときの波動方程式は,

$$\frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} + f(x, t) \quad (6)$$

ただし,  $v^2 = \frac{F}{\rho}$ ,  $f(x, t) = \frac{F_v(x, t)}{\rho \Delta x}$  である.

境界条件は, 両端固定として

$$\begin{cases} \psi(0, t) = 0 \\ \psi(L, t) = 0 \end{cases}$$

初期条件として

$$\begin{cases} \psi(x, 0) = p(x) \\ \left. \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} \right|_{t=0} = q(x) \end{cases}$$

の場合の解を求める.

---

自由振動による解を $\xi(x, t)$ ，強制振動による解を $\zeta(x, t)$ とすると，重ね合わせの原理より

$$\psi(x, t) = \xi(x, t) + \zeta(x, t)$$

と書くことができる．

解を式(6)へ代入して分離すると

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \xi(x, t)}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi(x, t)}{\partial x^2} & \dots \textcircled{1} \\ \frac{\partial^2 \zeta(x, t)}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \zeta(x, t)}{\partial x^2} + f(x, t) & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

式 $\textcircled{1}$ に対する境界条件は

$$\begin{cases} \xi(0, t) = 0 \\ \xi(L, t) = 0 \end{cases}$$



---

初期条件は

$$\begin{cases} \xi(x, 0) = p(x) \\ \left. \frac{\partial \xi(x, t)}{\partial t} \right|_{t=0} = q(x) \end{cases}$$

式②に対する境界条件は

$$\begin{cases} \zeta(0, t) = 0 \\ \zeta(L, t) = 0 \end{cases}$$

初期条件は

$$\begin{cases} \zeta(x, 0) = 0 \\ \left. \frac{\partial \zeta(x, t)}{\partial t} \right|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

---

式①について、上記の境界条件、初期条件による解は

$$\begin{aligned}\xi(x, t) = & \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi x}{L} \\ & \times \left[ \left\{ \frac{2}{L} \int_0^L p(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx \right\} \cos \frac{n\pi vt}{L} \right. \\ & \left. + \left\{ \frac{2}{n\pi v} \int_0^L q(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx \right\} \sin \frac{n\pi vt}{L} \right]\end{aligned}$$

である.

式②について、自由振動の場合と同様に変数分離法を用いると

$$\zeta(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \phi_n(t) \sin \frac{n\pi x}{L}$$

これは、境界条件  $\zeta(0, t) = 0$ ,  $\zeta(L, t) = 0$  を満たしている.

---

これを式②へ代入すると

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{d^2 \phi_n(t)}{dt^2} \sin \frac{n\pi x}{L} = -v^2 \sum_{n=1}^{\infty} \phi_n(t) \left( \frac{n\pi}{L} \right)^2 \sin \frac{n\pi x}{L} + f(x, t)$$

従って

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \bar{f}_n(t) \sin \frac{n\pi x}{L}$$

ただし,

$$\bar{f}_n(t) = \frac{d^2 \phi_n(t)}{dt^2} + \left( \frac{n\pi v}{L} \right)^2 \phi_n(t)$$

であり,  $\bar{f}_n(t)$  は, フーリエ級数により

$$\bar{f}_n(t) = \frac{2}{L} \int_0^L f(x, t) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$

で求めることができる.

---

従って、 $n = 1, 2, \dots$  に対して常微分方程式

$$\frac{d^2\phi_n(t)}{dt^2} + \omega_n^2\phi_n(t) = \bar{f}_n(t)$$

を解けばよい．ただし、 $\omega_n = \frac{n\pi v}{L}$  であり、初期条件は、式②から

$$\begin{cases} \phi_n(0) = 0 \\ \left. \frac{d\phi_n(t)}{dt} \right|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

である．

定数係数線形2階常微分方程式であるので、解は

$$\phi_n(t) = C_1 \cos \omega_n t + C_2 \sin \omega_n t + \frac{1}{\omega_n} \int \bar{f}_n(\tau) \sin \omega_n(t - \tau) d\tau$$

---

初期条件より  $C_1 = 0$ ,  $C_2 = 0$  であるので, 式②の解は

$$\zeta(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{L}{n\pi v} \int_0^t \bar{f}_n(\tau) \sin \frac{n\pi v(t - \tau)}{L} d\tau \sin \frac{n\pi x}{L}$$

以上より, 強制振動を受ける波動方程式の解は

$$\begin{aligned} \psi(x, t) = & \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi x}{L} \\ & \times \left[ \left\{ \frac{2}{L} \int_0^L p(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx \right\} \cos \frac{n\pi vt}{L} \right. \\ & + \left\{ \frac{2}{n\pi v} \int_0^L q(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx \right\} \sin \frac{n\pi vt}{L} \\ & \left. + \frac{L}{n\pi v} \int_0^t \bar{f}_n(\tau) \sin \frac{n\pi v(t - \tau)}{L} d\tau \right] \end{aligned} \quad (7)$$

---

**例 3**：強制力の作用する波動方程式  $\frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} + f(x, t)$  について、境界条件が、 $\psi(0, t) = 0$ ,  $\psi(L, t) = 0$ , 初期条件が、 $\psi(x, 0) = 0$ ,  $\left. \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} \right|_{t=0} = 0$  とする.  $x = \frac{L}{2}$  の位置に、調和関数による力  $f_0 \sin pt$  が加わるときの解を求めよ.

[解]

デルタ関数を用いて、 $f(x, t)$  は

$$f(x, t) = f_0 \delta \left( x - \frac{L}{2} \right) \sin pt$$

$\bar{f}_n(t)$  は

$$\begin{aligned} \bar{f}_n(t) &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x, t) \sin \frac{n\pi x}{L} dx \\ &= \frac{2f_0}{L} \sin \frac{n\pi}{2} \sin pt \end{aligned}$$

---

よって、強制解は、

$$\begin{aligned}\zeta(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{L}{n\pi v} \int_0^t \left( \frac{2f_0}{L} \sin \frac{n\pi}{2} \sin p\tau \right) \sin \frac{n\pi v(t-\tau)}{L} d\tau \sin \frac{n\pi x}{L} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2f_0}{L} \sin \frac{n\pi}{2} \frac{1}{\left(\frac{n\pi v}{L}\right)^2 - p^2} \left( \sin pt - \frac{p}{\frac{n\pi v}{L}} \sin \frac{n\pi vt}{L} \right) \sin \frac{n\pi x}{L}\end{aligned}$$

$t = 0$  で  $p(x) = 0$ ,  $q(x) = 0$  であるので、解は

$$\psi(x, t) = \frac{2f_0}{L} \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi}{2} \frac{1}{\left(\frac{n\pi v}{L}\right)^2 - p^2} \left( \sin pt - \frac{p}{\frac{n\pi v}{L}} \sin \frac{n\pi vt}{L} \right) \sin \frac{n\pi x}{L}$$

---

**演習問題 1** : 波動方程式  $\frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2}$  ( $v$  は定数) について, 境界条件が,  $\psi(0, t) = 0, \psi(L, t) = 0$ , 初期条件が,  $\psi(x, 0) = \begin{cases} h & (\frac{2L}{5} \leq x \leq \frac{3L}{5}) \\ 0 & (\text{上記以外}) \end{cases}$  (ただし,  $h$  は定数),  $\frac{\partial \psi(x, 0)}{\partial t} = 0$  であるときの解を求めよ.

**演習問題 2** : 微分方程式  $\frac{d^2 \phi_n(t)}{dt^2} + \omega_n^2 \phi_n(t) = \bar{f}_n(t)$  ( $\omega_n$  は定数) の初期条件が  $\phi_n(0) = 0, \frac{d\phi_n(0)}{dt} = 0$  であるとき, 次の  $\bar{f}_n(t)$  に対する解  $\phi_n(t)$  を求めよ.

(1)  $\bar{f}_n(t) = F_0(1 - at)$  ( $F_0, a$  は定数)

(2)  $\bar{f}_n(t) = F_0 e^{-at}$  ( $F_0, a$  は定数)