

Maths

Sommes

$$\sum_{i=1}^N i = \frac{N(N+1)}{2}$$
$$\sum_{i=1}^N i^2 = \frac{N(N+1)(2N+1)}{6}$$
$$\sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{\lambda^k}{k!} = e^\lambda$$

Pour $|x| < 1$:

$$\sum_{k=1}^{+\infty} x^k = \frac{x}{1-x}$$

Comparaisons

$$|x+y| \leq |x| + |y|$$

Transformées – Changement de domaine
Fourier continue

$$\mathcal{F}\{u(t)\} = U(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(t)e^{-2i\pi f t} \mathrm{d}t$$

Fourier Discrète

Avec $s[n]$ un signal discret de N points :

$$\mathcal{F}\{s[n]\} = S[k] = \sum_{n=0}^{N-1} s[n]e^{-2i\pi k \frac{N}{N}}$$

Analyse Vectorielle

Laplacien (cartésien)

$$\Delta = \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

D'alembertien (cartésien)

Avec k une constante :

$$\square = \Delta - k \frac{\partial^2}{\partial t^2}$$

Produits scalaires et vectoriels

$$\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z$$

$$||\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v}|| = ||\overrightarrow{u}|| ||\overrightarrow{v}|| |\cos(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v})|$$

$$||\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{v}|| = ||\overrightarrow{u}|| ||\overrightarrow{v}|| |\sin(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v})|$$

Gradient, divergence, rotationnel

Avec \overrightarrow{W} un champ vectoriel.

$$\overrightarrow{\mathrm{grad}} f = \overrightarrow{\nabla} f$$

$$\mathrm{div} \overrightarrow{F} = \overrightarrow{\nabla} \cdot \overrightarrow{W}$$

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}} \overrightarrow{W} = \overrightarrow{\nabla} \wedge \overrightarrow{W}$$

Propriétés

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}} \overrightarrow{\mathrm{grad}} f = \overrightarrow{0} \Rightarrow \exists f / \overrightarrow{W} = \overrightarrow{\mathrm{grad}} f$$

$$\overrightarrow{\mathrm{grad}} (fg) = f \overrightarrow{\mathrm{grad}} g + g \overrightarrow{\mathrm{grad}} f$$

$$\mathrm{div} (f \overrightarrow{W}) = f \mathrm{div} \overrightarrow{W} + \overrightarrow{W} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}} f$$

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}} (f \overrightarrow{W}) = f \overrightarrow{\mathrm{rot}} \overrightarrow{W} + (\overrightarrow{\mathrm{grad}} f) \wedge \overrightarrow{W}$$

Theorèmes intégraux

τ est un volume limité par la surface fermée Σ orientée vers l'extérieur.
 S est une surface appuyée sur et orientée vers le contour fermé C .

Stokes

$$\oint_C \overrightarrow{W}(\overrightarrow{\tau}) \cdot \mathrm{d} \overrightarrow{\tau} = \iiint_S \overrightarrow{\mathrm{rot}} \overrightarrow{W}(\overrightarrow{\tau}) \cdot \mathrm{d} \overrightarrow{S}$$

Stokes-Ostrogradski

$$\oint\!\!\!\oint_{\Sigma} \overrightarrow{W}(\overrightarrow{\tau}) \cdot \mathrm{d} \overrightarrow{S} = \iiint_{\tau} \mathrm{div} \overrightarrow{W}(\overrightarrow{\tau}) \cdot \mathrm{d} \tau$$

Trigonométrie

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

$$\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2}$$

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

Suites

Arithmétiques

$$\begin{cases} u_{n_0} = a \\ \forall n > n_0, \quad u_{n+1} = u_n + r \end{cases}$$

Terme général :

$$u_n = a + (n - n_0)r$$

Somme des n premiers termes :

$$\sum_{p=0}^n u_p = \frac{n+1}{2} (u_0 + u_n)$$

Géométriques

$$\begin{cases} u_{n_0} = a \\ \forall n > n_0, \quad u_{n+1} = q u_n \end{cases}$$

Terme général : TODO Somme des n premiers termes :

$$\sum_{p=0}^n u_p = \frac{n+1}{2} (u_0 + u_n)$$