

Tarea 1

Careaga Carrillo Juan Manuel

Quiróz Castañeda Edgar


Soto Corderi Sandra del Mar

Lunes 17 de Septiembre de 2018

1. Dibujar la región W definida por las superficies $x + 2y + 3z = 6$, $x = 0$, $y = 0$ y $z = 0$. Expresar la integral triple $\iiint_W f(x, y, z) dV$ de las seis formas posibles como integrales iteradas.

Dado que las ecuaciones $x = 0$, $y = 0$ y $z = 0$ representan los planos yz , xz y xy respectivamente, sólo hay que fijarse dónde el plano dado por $x + 2y + 3z = 6$ intersecta a dichos planos, en particular, dónde corta a los ejes cartesianos.

Para el plano xy hacemos $z = 0$, y tenemos la recta $x + 2y = 6$ que intersecta a los ejes en $(6, 0, 0)$ y en $(0, 3, 0)$. Para el plano xz hacemos $y = 0$ y tenemos la recta $x + 3z = 6$ que intersecta a los ejes en $(3, 0, 0)$ y $(0, 0, 2)$. Finalmente para el plano yz hacemos $x = 0$ y tenemos la recta $2y + 3z = 6$ que intersecta a los ejes en $(0, 6, 0)$ y $(0, 0, 2)$. Entonces la región buscada se ve así



Tomemos por ejemplo la triple integral en la que primero se integra sobre la variable x , luego sobre y y al final sobre z .

En general, tenemos que los límites que se obtienen despejando la variable de $x + 2y + 3z = 6$ son positivos y como el otro límite es 0, entonces podemos saber cuál es el límite superior y cual es el inferior.

Para la primera integral, hay definir los límites despejando x de las superficies que limitan la región.

Es decir $x = 0$ y $x + 2y + 3z = 6 \implies x = 6 - 2y - 3z$.

$$\int_0^{6-2y-3z} dx$$

Después, hay que hacer lo mismo con la variable y , suponiendo a x como nula, pues ya se ha integrado, es decir $y = 0$ y $6 = 0 + 2y + 3z \implies y = 3 - \frac{3}{2}z$.

$$\int_0^{3-\frac{3}{2}z} dy$$

Finalmente, hay que hacer lo mismo para z , esto es $z = 0$ y $6 = 0 + 0 + 3z \implies z = 2$.

$$\int_0^2 dz$$

Entonces, la primera triple integral sería


$$\int_0^2 \int_0^{3-\frac{3}{2}z} \int_0^{6-2y-3z} dx dy dz$$

Análogamente, cambiando el orden de integración de las variables, se obtienen las demás posibles integrales triples. Estas son

$$\begin{aligned} & \int_0^3 \int_0^{2-\frac{2}{3}y} \int_0^{6-2y-3z} dx dz dy \\ & \int_0^2 \int_0^{6-3z} \int_0^{3-\frac{x+3z}{2}} dy dx dz \\ & \int_0^6 \int_0^{2-\frac{x}{3}} \int_0^{3-\frac{x+3z}{2}} dy dz dx \\ & \int_0^6 \int_0^{3-\frac{x}{2}} \int_0^{2-\frac{x+2y}{3}} dz dy dx \\ & \int_0^3 \int_0^{6-2y} \int_0^{2-\frac{x+2y}{3}} dz dx dy \end{aligned}$$

2. Dibujar la región W descrita por la integral iterada $\int_0^1 \int_{z^3}^{\sqrt{z}} \int_0^{4-x} dy dx dz$. Calcular su volumen.

El dibujo de la región sería la superposición de las regiones en el intervalo en z de 0 a 1.



$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_{z^3}^{\sqrt{z}} \int_0^{4-x} dy dx dz &= \int_0^1 \int_{z^3}^{\sqrt{z}} y \Big|_0^{4-x} dx dz = \int_0^1 \int_{z^3}^{\sqrt{z}} ((4-x) - 0) dx dz = \int_0^1 \int_{z^3}^{\sqrt{z}} (4-x) dx dz \\ &= \int_0^1 \left(4x - \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_{z^3}^{\sqrt{z}} dz = \int_0^1 \left(4(z^{\frac{1}{2}}) - \frac{1}{2}(z^{\frac{1}{2}})^2 \right) - \left(4(z^3) - \frac{1}{2}(z^3)^2 \right) dz \\ &= \int_0^1 \left(4z^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}z - 4z^3 + \frac{1}{2}z^6 \right) dz = \left(\frac{8}{3}z^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{4}z^2 - z^4 + \frac{1}{14}z^7 \right) \Big|_0^1 \\ &= \left(\frac{8}{3}(1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{4}(1)^2 - (1)^4 + \frac{1}{14}(1)^7 \right) - \left(\frac{8}{3}(0)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{4}(0)^2 - (0)^4 + \frac{1}{14}(0)^7 \right) \\ &= \frac{8}{3} - \frac{1}{4} - 1 + \frac{1}{14} = \frac{32-3}{12} - 1 + \frac{1}{14} = \frac{203+6}{84} - 1 = \frac{209-84}{84} = \frac{125}{84} \end{aligned}$$

3. Integrar la función $f(x, y) = x^2 + 2xy^2 + 2$ sobre la región D acotada por la gráfica de $y = -x^2 + x$, el eje x , y las rectas $x = 0$ y $x = 2$.

Primero hay que determinar qué límite es el superior y cual es el inferior.

Los límites en x son sencillos, pues ambas cotas son constantes, por lo que $x = 0$ es la cota inferior y $x = 2$ es la superior.

Los límites de y son la función constante $y = 0$ y la función $y = -x^2 + x$. Hay que determinar si $-x^2 + x < 0$ o $-x^2 + x > 0$ en el intervalo $[0, 2]$ dado por las cotas de x .

$$-x^2 + x = 0 \implies x = x^2 \implies x = 1, 0$$

Entonces la función $y = -x^2 + x$ cambia de signo en 1 y en 0. Veamos qué signo tiene en qué intervalo.

$$-(0,5)^2 + 0,5 = -0,25 + 0,5 = 0,25 > 0$$

$$-(1,5)^2 + 1,5 = -2,25 + 1,5 = -0,75 < 0$$

Entonces la función es positiva en $(0, 1)$ y negativa en $(1, 2]$.

Por lo tanto hay que considerar dos integrales para calcular el volumen deseado.

$$\int_0^1 \int_0^{-x^2+x} (x^2 + 2xy^2 + 2) dy dx + \int_1^2 \int_{-x^2+x}^0 (x^2 + 2xy^2 + 2) dy dx$$

Las integrales internas serían

$$\begin{aligned} \int_0^{-x^2+x} (x^2 + 2xy^2 + 2) dy &= \left(x^2 y + \frac{2}{3} xy^3 + 2y \right) \Big|_0^{-x^2+x} = y \left(x^2 + \frac{2}{3} xy^2 + 2 \right) \Big|_0^{-x^2+x} \\ &= (-x^2 + x) \left(x^2 + \frac{2}{3} x(-x^2 + x)^2 + 2 \right) = x \left(x^2 + \frac{2}{3} (x^5 - 2x^4 + x^3) + 2 \right) - x^2 \left(x^2 + \frac{2}{3} (x^5 - 2x^4 + x^3) + 2 \right) \\ &= \left(x^3 + \frac{2}{3} (x^6 - 2x^5 + x^4) + 2x \right) - \left(x^4 + \frac{2}{3} (x^7 - 2x^6 + x^5) + 2x^2 \right) = -\frac{2}{3} x^7 + \frac{6}{3} x^6 - \frac{6}{3} x^5 - \frac{1}{3} x^4 + x^3 - 2x^2 + 2x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{-x^2+x}^0 (x^2 + 2xy^2 + 2) dy &= y \left(x^2 + \frac{2}{3} xy^2 + 2 \right) \Big|_{-x^2+x}^0 = -(-x^2 + x) \left(x^2 + \frac{2}{3} x(-x^2 + x)^2 + 2 \right) \\ &= -\left(-\frac{2}{3} x^7 + \frac{6}{3} x^6 - \frac{6}{3} x^5 - \frac{1}{3} x^4 + x^3 - 2x^2 + 2x \right) = \frac{2}{3} x^7 - 2x^6 + 2x^5 + \frac{1}{3} x^4 - x^3 + 2x^2 - 2x \end{aligned}$$

Y de esto las integrales externas serían

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(-\frac{2}{3} x^7 + 2x^6 - 2x^5 - \frac{1}{3} x^4 + x^3 - 2x^2 + 2x \right) dx &= \left(-\frac{1}{12} x^8 + \frac{2}{7} x^7 - \frac{1}{3} x^6 - \frac{1}{15} x^5 + \frac{1}{4} x^4 - \frac{2}{3} x^3 + x^2 \right) \Big|_0^1 \\ &= -\frac{1}{12} + \frac{2}{7} - \frac{1}{3} - \frac{1}{15} + \frac{1}{4} - \frac{2}{3} + 1 = \frac{27}{70} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_1^2 \left(\frac{2}{3} x^7 - 2x^6 + 2x^5 + \frac{1}{3} x^4 - x^3 + 2x^2 - 2x \right) dx &= -\int_1^2 \left(\frac{2}{3} x^7 - 2x^6 + 2x^5 + \frac{1}{3} x^4 - x^3 + 2x^2 - 2x \right) dx \\ &= -\left(-\frac{1}{12} x^8 + \frac{2}{7} x^7 - \frac{1}{3} x^6 - \frac{1}{15} x^5 + \frac{1}{4} x^4 - \frac{2}{3} x^3 + x^2 \right) \Big|_1^2 = -\left(-\frac{1}{12} (2)^8 + \frac{2}{7} (2)^7 - \frac{1}{3} (2)^6 - \frac{1}{15} (2)^5 + \frac{1}{4} (2)^4 - \frac{2}{3} (2)^3 + (2)^2 \right) - \frac{27}{70} \\ &= -\left(-\frac{64}{3} + \frac{256}{7} - \frac{64}{3} - \frac{32}{15} + 4 - \frac{16}{3} + 4 - \frac{27}{70} \right) = \frac{584}{105} + \frac{27}{70} = \frac{1249}{210} \end{aligned}$$


Entonces el volumen total sería $\frac{27}{70} + \frac{1249}{210} = \frac{19}{3}$

4. Usar integrales dobles para calcular el área de una elipse con semiejes a y b .

Supongamos, sin perder la generalidad, que $a \geq b$. La ecuación canónica de la elipse horizontal cuyo centro está en el origen del plano y tiene semiejes a y b es

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Equivalentemente, podemos afirmar entonces que $y = \frac{\pm \sqrt{a^2 b^2 - b^2 x^2}}{a}$ describe nuestro lugar geométrico. Por simpleza, y aprovechando su simetría con los ejes X e Y , dividimos la elipse en 4 regiones iguales delimitadas por los ejes coordenados y únicamente calcularemos el área de una de ellas, llámese R , al final, el área total se obtendrá de multiplicar el área de dicha región por 4.



R es una región y -simple, por lo que $R = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq a; 0 \leq y \leq \frac{\sqrt{a^2 b^2 - b^2 x^2}}{a} \right\}$, entonces el área de R está dada por

$$\iint_R dA = \int_0^a \int_0^{\frac{\sqrt{a^2 b^2 - b^2 x^2}}{a}} dy dx = \int_0^a \frac{1}{a} \sqrt{a^2 b^2 - b^2 x^2} dx = \frac{b}{a} \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

Haciendo la sustitución $x = a \sin \theta$ con $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, tenemos que $dx = a \cos \theta d\theta$; para los límites de la integral, si $x = 0 = a \sin \theta$ entonces $\theta = 0$ y si $x = a = a \sin \theta$, entonces $\theta = \frac{\pi}{2}$. La integral queda como

$$\frac{b}{a} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 \theta} a \cos \theta d\theta = b \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 (1 - \sin^2 \theta)} \cos \theta d\theta = ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta$$

Usando la fórmula del ángulo doble para el coseno tenemos

$$= ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} (1 + \cos(2\theta)) d\theta = \frac{ab}{2} \left[\theta + \frac{1}{2} \sin(2\theta) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{ab}{2} \left[\frac{\pi}{2} + 0 \right] = \frac{\pi ab}{4}$$

Por lo tanto, el área de la elipse es 4 veces lo anterior, es decir $A = \pi ab$

5. Mostrar que al evaluar $\iint_D dA$, donde D es una región y -simple, se reproduce la fórmula del cálculo de una variable para el área entre dos curvas.

Sea D una región y -simple, entonces se define como $D = \left\{ (x, y) \mid a \leq x \leq b; \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x) \right\}$ para algunos $a, b \in \mathbb{R}$ y $\varphi_1(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi_2(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Entonces

$$\iint_D dA = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} dy dx$$


por el Teorema de Fubini

$$= \int_a^b [y]_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} dx = \int_a^b [\varphi_2(x) - \varphi_1(x)] dx = \int_a^b \varphi_2(x) dx - \int_a^b \varphi_1(x) dx$$

que es como se calcula el área comprendida entre las curvas $\varphi_1(x)$ y $\varphi_2(x)$ en el intervalo $[a, b]$.

6. Describir la región que se encuentra entre el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y el paraboloide $z = x^2 + y^2$ como una región elemental.

Se puede caracterizar como una región de tipo III. Proyectando las gráficas al plano yz tenemos



Como estamos en el plano yz , entonces $x = 0$ y las ecuaciones se convertirían en

$$\begin{aligned} z &= y \\ z &= y^2 \end{aligned}$$

Al igualar ambas ecuaciones encontraremos sus intersecciones

$$\begin{aligned} y &= y^2 \\ \therefore \{y = 0, y = 1\} \end{aligned}$$

Y si de las ecuaciones originales despejamos la x nos quedaría

$$\begin{aligned} x &= \sqrt{z^2 - y^2} \\ x &= \sqrt{x - y^2} \end{aligned}$$

Por lo que la descripción de la región, por lo menos en el primer octante, queda como

$$R_1 = \left\{ (x, y, z) \mid \sqrt{z - y^2} \leq x \leq \sqrt{z^2 - y^2}; 0 \leq y \leq 1; y^2 \leq z \leq y \right\}$$

Debido a las simetrías que presentan ambas gráficas con los planos xz e yz , encontrar la descripción en los octantes restantes debe ser sencillo.

Para el segundo octante el comportamiento en y y en z es idéntico, sólo reflejamos en x

$$R_2 = \left\{ (x, y, z) \mid -\sqrt{z^2 - y^2} \leq x \leq -\sqrt{z - y^2}; 0 \leq y \leq 1; y^2 \leq z \leq y \right\}$$

Para el tercer octante reflejamos x y reflejamos y (con respecto a R_1)

$$R_3 = \left\{ (x, y, z) \mid -\sqrt{z^2 - y^2} \leq x \leq -\sqrt{z - y^2}; -1 \leq y \leq 0; y^2 \leq z \leq y \right\}$$

Y para el cuarto octante sólo reflejamos y (de nuevo, es con respecto a R_1)

$$R_4 = \left\{ (x, y, z) \mid \sqrt{z - y^2} \leq x \leq \sqrt{z^2 - y^2}; -1 \leq y \leq 0; y^2 \leq z \leq y \right\}$$

Al final, la región comprendida entre ambas superficies es la unión de estas 4 regiones (pues no existe la gráfica en los octantes 5, 6, 7, u 8).


$$R = \bigcup_{i=1}^4 R_i$$

7. Hallar el volumen acotado por el paraboloide $z = 2x^2 + y^2$ y el cilindro $z = 4 - y^2$


Para calcular el volumen tendríamos $\iiint_W dV$.

Primero veamos la intersección de las dos superficies como: $4 - y^2 = 2x^2 + y^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 2$

La intersección del paraboloide y el cilindro se ve :



La proyección del volumen en el plano xy se ve como:



De ahí, caracterizamos el volumen como: $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \int_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}} \int_{2x^2+y^2}^{4-y^2} dz dy dx$

Resolviendo la integral triple tenemos:

$$\begin{aligned} \int_{2x^2+y^2}^{4-y^2} dz &= z \Big|_{2x^2+y^2}^{4-y^2} = 4 - y^2 - 2x^2 - y^2 = -2y^2 - 2x^2 + 4 \\ \int_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}} (-2y^2 - 2x^2 + 4) dy &= \int_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}} (-2y^2) dy + \int_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}} (-2x^2) dy + \int_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}} (4) dy \\ \int_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}} (-2y^2 - 2x^2 + 4) dy &= \left(-\frac{2}{3} y^3 \right) \Big|_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}} + (-2x^2 y) \Big|_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}} + (4y) \Big|_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}} \\ \int_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}} (-2y^2 - 2x^2 + 4) dy &= -\frac{4(\sqrt{2-x^2})^3}{3} - 4x^2 \sqrt{2-x^2} + 8\sqrt{2-x^2} \\ \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \left(-\frac{4(\sqrt{2-x^2})^3}{3} - 4x^2 \sqrt{2-x^2} + 8\sqrt{2-x^2} \right) dx &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \left(-\frac{4(\sqrt{2-x^2})^3}{3} \right) dx + \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (-4x^2 \sqrt{2-x^2}) dx + \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (8\sqrt{2-x^2}) dx \\ \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \left(-\frac{4(\sqrt{2-x^2})^3}{3} \right) dx &= \frac{4}{3} \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (2-x^2)^{-\frac{3}{2}} dx \end{aligned}$$

Usando integración por sustitución $z = \frac{u}{2} = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{16} \int (8 - u^2)^{-\frac{3}{2}} du$

Usando integración por partes: $u = (8 - u^2)^{-\frac{3}{2}}, dv = 1: \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{16} (u)(8 - u^2)^{-\frac{3}{2}} + \int 3u^2 \sqrt{8 - u^2} du$

Usando integración por sustitución $u = 2\sqrt{2} \sin(m) \int 3u^2 \sqrt{8 - u^2} du = 3 \cdot 16\sqrt{2} \int \sin^2(m) \cos(m) \sqrt{8 - 8 \sin^2(m)}$

Simplificando y regresando la u : $\int 3u^2\sqrt{8-u^2}du = -24(\arcsen(\frac{1}{2\sqrt{2}}u) - \frac{1}{4}\sen(4\arcsen(\frac{1}{2\sqrt{2}}u)))$

De ahí, $\frac{4}{3} \cdot \frac{1}{16} \int (8-u^2)^{-\frac{3}{2}} du = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{16} (u)(8-u^2)^{-\frac{3}{2}} - 24(\arcsen(\frac{1}{2\sqrt{2}}u) - \frac{1}{4}\sen(4\arcsen(\frac{1}{2\sqrt{2}}u)))$

Regresando la u , $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (-\frac{4(\sqrt{2-x^2})^3}{3})dx = (-\frac{2}{3}(2x(-x^2+2)^{\frac{3}{2}}) + 3(\arcsen(\frac{1}{\sqrt{2}}x) - \frac{\sen(4\arcsen(\frac{1}{\sqrt{2}}x))}{4})) \Big|_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} = -2\pi$

$$\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (-4x^2\sqrt{2-x^2})dx = -4 \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (x^2\sqrt{2-x^2})dx$$

Usando integración trigonométrica: $x = \sqrt{2}\sen(u)$

$$\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (-4x^2\sqrt{2-x^2})dx = -2(\arcsen(\frac{1}{\sqrt{2}}x) - \frac{1}{4}\sen(4\arcsen(\frac{1}{\sqrt{2}}x))) \Big|_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} = -2\pi$$

$$\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (8\sqrt{2-x^2})dx = -8 \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (\sqrt{2-x^2})dx$$

Usando integración trigonométrica: $x = \sqrt{2}\sen(u)$

$$\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (8\sqrt{2-x^2})dx = 8(\arcsen(\frac{1}{\sqrt{2}}x) + -\frac{1}{2}\sen(2\arcsen(\frac{1}{\sqrt{2}}x))) \Big|_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} = 8\pi$$

$$\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (-\frac{4(\sqrt{2-x^2})^3}{3} - 4x^2\sqrt{2-x^2} + 8\sqrt{2-x^2})dx = -2\pi - 2\pi + 8\pi = 4\pi$$

El volúmen es de 4π

8. a) Investigar qué es el centro de masa de un cuerpo y cómo se puede calcular usando integrales múltiples.

El centro de masa es una posición definida en relación a un objeto o a un sistema de objetos. Es el promedio de la posición de todas las partes del sistema, ponderadas de acuerdo a sus masas.

Denotamos por $d: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^+$ (continua) la densidad del sólido S .

La masa viene dada por: $m = \iiint_S d(x, y, z)dx dy dz$

Los momentums respecto de los planos coordenados se definen como:

$$M_{xy} = \iiint_S zd(x, y, z)dx dy dz$$

$$M_{xz} = \iiint_S yd(x, y, z)dx dy dz$$

$$M_{yz} = \iiint_S xd(x, y, z)dx dy dz$$

El centro de masa es : $\left(\frac{M_{yz}}{m}, \frac{M_{xz}}{m}, \frac{M_{xy}}{m} \right)$

De ahí, que podamos obtener el centro de masa utilizando integrales múltiples.

- b) La densidad en un punto P de un cubo sólido de lado a es directamente proporcional al cuadrado de la distancia del punto P a una esquina fija del cubo. Encontrar el centro de masa.

Sea $P = (x, y, z)$ y la esquina fija sea el origen. Podemos usar esta función de densidad para encontrar la masa del cubo:

$$\rho(x, y, z) = k(x^2 + y^2 + z^2)$$

Debido a la simetria de la región, cualquier orden de integración producirá una integral de la misma dificultad.

$$\begin{aligned}
m &= \int_0^a \int_0^a \int_0^a k(x^2 + y^2 + z^2) dz dy dx \\
&= k \int_0^a \int_0^a \left[(x^2 + y^2)z + \frac{z^3}{3} \right]_0^a dy dz \\
&= k \int_0^a \int_0^a \left(ax^2 + ay^2 + \frac{a^3}{3} \right) dy dx \\
&= k \int_0^a \left[\left(ax^2 + \frac{a^3}{3} \right) y + \frac{a^3}{3} y \right]_0^a dx \\
&= k \int_0^a \left(a^2 x^2 + \frac{2a^4}{3} \right) dx \\
&= k \left[\frac{a^2 x^3}{3} + \frac{2a^4 x}{3} \right]_0^a \\
&= k \left[\frac{a^5}{3} + \frac{2a^5}{3} \right] \\
&= ka^5
\end{aligned}$$

El primer momentum sobre el plano yz es:

$$\begin{aligned}
M_{yz} &= k \int_0^a \int_0^a \int_0^a x(x^2 + y^2 + z^2) dz dy dx \\
&= k \int_0^a x \left[\int_0^a \int_0^a (x^2 + y^2 + z^2) dz dy \right] dx
\end{aligned}$$

Notemos que la x puede ser sacada como constante fuera de las dos integrales internas, debido a que es constante con respecto a y y z . Después de factorizar, las dos integrales internas son la misma para la masa m .

De ahí tenemos:

$$\begin{aligned}
M_{yz} &= k \int_0^a x \left(a^2 x^2 + \frac{2a^4}{3} \right) dx \\
&= k \left[\frac{a^2 x^4}{4} + \frac{a^4 x^2}{3} \right]_0^a \\
&= \frac{7}{12} a^6 k
\end{aligned}$$

$$\text{Así, } \vec{x} = \frac{M_{yz}}{m} = \frac{7a^6 k / 12}{a^5 k}$$

Finalmente, de la naturaleza de ρ y la simetría de x, y, z en este cubo sólido, se tiene $\vec{x} = \vec{y} = \vec{z}$, y el centro de masa es de $(\frac{7}{12}a, \frac{7}{12}a, \frac{7}{12}a)$