

Reporte de Detección


No. Detecciones -----	44
No. Clases Detectadas -----	9
No. de No Detectadas -----	2
Efectividad de Detección -----	95.65%

Recomendaciones

Para la enfermedad de la caña de azúcar causada por el hongo *Mycovellosiella koepkei*, se recomienda la aplicación de fungicidas como triazoles y estrobilurinas, así como la eliminación de plantas infectadas para prevenir su propagación. Es una enfermedad grave que puede reducir significativamente el rendimiento de la caña de azúcar. Para el red rot en la caña de azúcar, se sugiere el uso de fungicidas protectores como el clorotalonil y la aplicación de técnicas de manejo integrado de enfermedades. Esta enfermedad puede causar daños económicos significativos en los cultivos. El manchagris en el maíz, causado por el hongo *Cercospora zea-maydis*, puede controlarse con la aplicación de fungicidas como triazoles y estrobilurinas. Se recomienda también la rotación de cultivos y la eliminación de restos de cosecha infectados para prevenir su aparición. La roya en el maíz, causada por el hongo *Puccinia sorghi*, puede tratarse con fungicidas sistémicos y protectores. Se recomienda también la selección de variedades resistentes y la manipulación de la densidad de siembra para reducir la humedad y evitar la propagación de la enfermedad. El tizón en el maíz, causado por el hongo *Bipolaris maydis*, puede controlarse con la aplicación de fungicidas específicos y la eliminación de plantas infectadas. Es importante monitorear constantemente los cultivos para detectar posibles focos de infección y actuar a tiempo. En cuanto a las enfermedades del plátano como cordana, pestalotiopsis y sigatoka, se recomienda el uso de fungicidas específicos para cada patógeno, así como la poda de hojas enfermas y la eliminación de plantas gravemente afectadas. Es fundamental mantener una buena higiene en la plantación y evitar el exceso de humedad para prevenir la aparición de estas enfermedades. Informe de detección de enfermedades en cultivos:

- Cana amarillo (*Mycovellosiella koepkei*): Tratamiento con fungicidas y eliminación de plantas infectadas.
- Cana puntorrojo (Red Rot): Uso de fungicidas protectores y manejo integrado de enfermedades.
- Maiz manchagris (Gray Leaf Spot): Aplicación de fungicidas y rotación de cultivos.
- Maiz roya (Roya): Tratamiento con fungicidas y selección de variedades resistentes.
- Maiz tizon (Leaf Blight): Uso de fungicidas específicos y monitoreo constante de los cultivos.
- Platano cordana, pestalotiopsis, sigatoka: Tratamiento con fungicidas específicos, poda de hojas enfermas y mantenimiento de la higiene en la plantación.

Distribución de Detecciones por Clase



Conteo de Detecciones por Clase

