




# GEOMETRÍA

## Capítulo 10

**5th**  
SECONDARY

RELACIONES MÉTRICAS EN LOS  
TRIÁNGULOS OBLICUÁNGULOS




 **SACO OLIVEROS**




Continuando con el tema de relaciones métricas, en este capítulo aprenderemos a hallar las longitudes de las líneas notables más importantes como la altura, la mediana, el segmento de bisectriz, así como también la longitud de una ceviana interior, conociendo previamente las longitudes de los tres lados del triángulo.

### Actividad


Complete los casilleros con los nombres de las líneas notables que hay en cada triángulo, señaladas con la flecha.




Altura



Bisectriz



Mediana



Ceviana

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$



# RELACIONES MÉTRICAS EN EL TRIÁNGULO OBLICUÁNGULO

## Teorema de Euclides

- Primer caso

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2b.m$$

$\overline{BH}$ : Altura

$$\theta < 90^\circ$$

- Segundo caso

$$a^2 = b^2 + c^2 + 2b.m$$

$\overline{BH}$ : Altura

$$\theta > 90^\circ$$

## Teorema de Stewart

$$x^2b = a^2m + c^2n - m.n.b$$


$\overline{BP}$ : Ceviana

$\triangle ABC$ : ISÓSCELES


$$x^2 = a^2 - m.n$$

$\overline{BP}$ : Ceviana


## Teorema de la Mediana




## Teorema de Herón



## T. de la longitud de la bisectriz interior




## T. de la longitud de la bisectriz exterior



# Naturaleza de un triángulo



Sean  $a$ ,  $b$  y  $c$  las longitudes de los lados de un triángulo siendo  $a$  longitud de mayor lado:




Si:  $a^2 < b^2 + c^2$



$\beta < 90^\circ$

y el triángulo es acutángulo.




Si:  $a^2 = b^2 + c^2$



$\beta = 90^\circ$

y el triángulo es rectángulo.



Si:  $a^2 > b^2 + c^2$



$\beta > 90^\circ$

y el triángulo es obtusángulo.



1. En un triángulo ABC,  $AB = 4$  y  $BC = AC = 8$ . Luego se traza la altura  $\overline{BD}$ . Halle AD.

### Resolucion


- Primer Teorema de Euclides  
 $\Delta$  acutángulo

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2b.m$$

$$\cancel{8^2} = \cancel{8^2} + 4^2 - 2(8)(x)$$

$$16x = 16$$

$$x = 1$$



2. En un triángulo ABC,  $AB = 13$  y  $BC = 15$  y  $AC = 4$ . Se traza la altura BD. Halle AD.


• Naturaleza de un triángulo

Si:  $15^2 > 13^2 + 4^2$

$225 > 185$

→  $\theta > 90^\circ$

$\Delta$  obtusángulo



Resolucion

• Segundo Teorema de Euclides

$$a^2 = b^2 + c^2 + 2b.m$$

$$15^2 = 4^2 + 13^2 + 2(4)(x)$$

$$225 = 16 + 169 + 8x$$

$$225 = 185 + 8x$$


$$40 = 8x$$

$$x = 5$$




3. En un triángulo ABC, se traza la mediana  $\overline{BM}$ . Si  $BM = 4$ ,  $BC = 9$  y  $AB = AM = MC$ . Halle AB.

**Resolucion**



**TEOREMA DE LA MEDIANA**



$$9^2 + x^2 = 2(4)^2 + \frac{(2x)^2}{2}$$

$$81 + x^2 = 32 + 2x^2$$

$$49 = x^2$$


$$x = 7$$





## 4. Halle el valor de h.


### Resolucion



- Calculamos el semiperímetro

$$p = \frac{17 + 10 + 9}{2} \Rightarrow p = 18$$

### TEOREMA DE HERÓN



- Por teorema de Herón

$$h = \frac{2}{9} \sqrt{18(18-10)(18-9)(18-17)}$$

$$h = \frac{2}{9} \sqrt{\underbrace{18(8)}_{144} \underbrace{(9)(1)}_9}$$


$$h = \frac{2}{9} (12)(3)$$

$$h = 8$$



## 5. Halle el valor de $x$ .

### Resolucion



- $\overline{BP}$  : bisectriz interior.

- Primer teorema de la bisectriz interior

$$\frac{3}{4} = \frac{AP}{7 - AP}$$

$$21 - 3 \cdot AP = 4 \cdot AP$$

$$21 = 7 \cdot AP$$

$$AP = 3$$

$$PC = 4$$

- Segundo teorema de la bisectriz interior

$$x^2 = a \cdot b - m \cdot n$$

$$x^2 = 6 \cdot 8 - 3 \cdot 4$$


$$x^2 = 48 - 12$$

$$x^2 = 36$$

$$x = 6$$



6. En la figura se muestra un globo aerostático a punto de elevarse, el cual es amarrado con las sogas AB, AC y AD. Si  $AB = 15$  m,  $AD = 20$  m,  $BC = 14$  m y  $CD = 11$  m. Calcule AC.



**Resolucion**

- Piden: AC
- Colocamos los datos en el gráfico
- Por el teorema de Stewart

$$x^2b = a^2m + c^2n - m.n.b$$



$$x^2 \cdot 25 = 20^2 \cdot 14 + 15^2 \cdot 11 - 14 \cdot 11 \cdot 25$$

$$25x^2 = 4225$$

$$x^2 = 169$$

$$x = 13$$

7. Se muestra un poste de alumbrado público, el cual se encuentra sostenido por cuatro cables metálicos cuyas longitudes se muestran en cada uno. Halle el valor de  $x$ .



- $\Delta ABC$ :  $10^2 = b^2 + 6^2 + 2(b)(m)$   
 $64 = b^2 + 2bm \quad \dots (1)$
- $\Delta DBC$ :  $17^2 = b^2 + x^2 + 2(b)(m)$   
 $289 - x^2 = b^2 + 2bm \quad \dots (2)$
- Reemplazando (1) en (2)  
 $289 - x^2 = 64$   
 $225 = x^2$

$$x = 15$$