

TRIGONOMETRY



Chapter 4

LEVEL

Reducción al primer cuadrante.



TRIGONOMETRY

indice

01. MotivatingStrategy >

02. HelicoTheory


03. HelicoPractice

04. HelicoWorkshop

 \bigcirc


M

Video: ¿Qué significa la reducción al primer cuadrante?



MOTIVATING STRATEGY

¿QUÉ SIGNIFICA LA REDUCCIÓN AL PRIMER CUADRANTE?



Resumen



HELICO THEORY

REDUCCIÓN AL PRIMER CUADRANTE

CASO I : Para ángulos positivos menores de una vuelta

Mediante un ángulo agudo θ se obtienen los siguientes ángulos compuestos positivos y menores de una vuelta: $90^{\circ} \pm \theta$; $180^{\circ} \pm \theta$; $270^{\circ} \pm \theta$; $360^{\circ} - \theta$.


$$RT\left\{\begin{array}{c} 180^{\circ} \pm \theta \\ 360^{\circ} - \theta \end{array}\right\} = \pm RT(\theta)$$

No cambia la RT

$$RT \left\{ \begin{array}{c} \mathbf{90}^{\circ} \pm \Theta \\ \mathbf{270}^{\circ} \pm \Theta \end{array} \right\} = \pm \mathbf{Co} RT(\Theta)$$

Sí cambia la RT

El signo ± depende del cuadrante del ángulo compuesto.



>

CASO II: Para ángulos negativos

Al calcular las razones trigonométricas de un ángulo negativo $(-\alpha)$, se cumple:

$$cos(-\alpha) = cos\alpha$$

 $sec(-\alpha) = sec\alpha$



El signo (-) se omite

$$sen(-\alpha) = -sen\alpha$$

$$tan(-\alpha) = -tan\alpha$$

$$cot(-\alpha) = -cot\alpha$$

$$csc(-\alpha) = -csc\alpha$$

El signo (-) se reposiciona delante de la RT



 \bigcirc

Problema 01

Problema 02

Problema 03

Problema 04

Problema 05

HELICO PRACTICE

Problema 01




M

Halle el valor de:

$$S = sen120^{\circ} + cos150^{\circ}$$

RECORDEMOS



$$S = sen120^{\circ} + cos150^{\circ}$$

$$S = sen(180^{\circ} - 60^{\circ}) + cos(180^{\circ} - 30^{\circ})$$

IIC

IIC

$$S = sen60^{\circ} + (-cos30^{\circ})$$

$$S = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

Respuesta

 $\therefore S = 0$

Resolución

Problema 02



Simplifique:

$$E = \frac{sen(180^{\circ} + x) \cdot cos(90^{\circ} - x)}{tan(180^{\circ} + x) \cdot cot(360^{\circ} - x)}$$


RECORDEMOS

$$RT\left\{\frac{180^{\circ} \pm \Theta}{360^{\circ} - \Theta}\right\} = \pm RT(\Theta)$$

$$RT\left\{\frac{90^{\circ} \pm \Theta}{270^{\circ} + \Theta}\right\} = \pm Co_{RT}(\Theta)$$

tanx.cotx = 1

Resolución



$$\mathbf{F} = \frac{\mathbf{IIIC}}{\mathbf{Sen}(180^{\circ} + \mathbf{x}) \cdot \mathbf{cos}(90^{\circ} - \mathbf{x})}$$

$$\tan(180^{\circ} + x) \cdot \cot(360^{\circ} - x)$$

IVC

Respuesta $: E = sen^2x$

Problema 03





Reduzca:


$$F = \frac{cos(2\pi - x) - cos(\pi + x)}{cos(-x)}$$

RECORDEMOS

$$RT\left\{\begin{array}{c} 180^{\circ} \pm \Theta \\ 360^{\circ} - \Theta \end{array}\right\} = \pm RT(\Theta)$$

$$\cos(-\mathbf{x}) = \cos\mathbf{x}$$

Resolución



$$F = \frac{\cos(2\pi - x) - \cos(\pi + x)}{\cos(-x)}$$

$$\mathbf{F} = \frac{(\mathbf{cosx}) - (-\mathbf{cosx})}{(\mathbf{cosx})}$$

$$F = \frac{2\cos x}{\cos x}$$

Respuesta : F = 2

Problema 04 🕑

Resolución




Luis gasta 2P soles a diario en pasajes para ir al trabajo. Si se sabe que Luis trabaja de lunes a viernes, determine cuánto gasta Luis en pasajes en una semana.

$$P = \frac{sen(2\pi - x) - 3sen(\pi - x)}{2sen(-x)}$$

RECORDEMOS

$$RT\left\{\begin{array}{c} \mathbf{180}^{\circ} \pm \theta \\ \mathbf{360}^{\circ} - \theta \end{array}\right\} = \pm RT(\theta)$$

$$sen(-x) = -senx$$



$P = \frac{\operatorname{sen}(2\pi - x) - 3\operatorname{sen}(\pi - x)}{2 \cdot \operatorname{sen}(-x)}$

$$P = \frac{(-senx) - 3(senx)}{2 \cdot (-senx)}$$

$$P = \frac{-4 \cdot \text{senx}}{-2 \cdot \text{senx}} \rightarrow P = 2$$

Luis gasta diariamente:

$$2P = 2(2)$$

$$2P=4$$

Luis gasta semanalmente:

Respuesta : 28 soles

Problema 05 💿



La edad de Carlos es 18 años. Se sabe que Carlos tiene un hermano llamado Pedro, cuya edad es la edad de Carlos sumado con E. Determine la suma de edades de los dos hermanos.

$$\mathbf{E} = \frac{\cos(-\mathbf{x})}{-\cos\mathbf{x}} + \frac{\tan(-\mathbf{x})}{\tan(180^{\circ} + \mathbf{x})} + \frac{\sin(-\mathbf{x})}{\sin\mathbf{x}}$$

$$E = \frac{\cos(-x)}{-\cos x} + \frac{\tan(-x)}{\tan(180^{\circ} + x)} + \frac{\sin(-x)}{\sin x}$$
IIIC

$$E = \frac{\cos x}{-\cos x} + \frac{-\tan x}{\tan x} + \frac{-\sin x}{\sin x}$$

$$E = (-1) + (-1) + (-1)$$

$$\mathbf{E} = -3$$

Calculando la edad de Pedro:

$$\mathbf{P} = \mathbf{18} + \mathbf{E}$$

$$P = 18 + (-3)$$

$$P = 15$$
 años

Calculando la suma de edades (S):

$$S = C + P$$

$$S = 18 + 15$$

Respuesta : S = 33 años



 \bigcirc

 \bigcirc

Problema 06

Problema 07

Problema 08

Problema 09

Problema 10



Problema 06 💿



Problema 07 💿



Problema 08



Calcule:

$$E = sen30^{\circ} + cos120^{\circ}$$

Calcule:

$$M = 2(cos300^{\circ} + sen330^{\circ})$$

Reduzca:

$$A = \frac{\sin(180^{\circ} - x) \cdot \cos(90^{\circ} + x)}{\tan(180 - x) \cdot \cot(360^{\circ} - x)}$$



Problema 09 💿





José tiene un USB de capacidad 16 GB, en donde tiene todos sus trabajos de la universidad, ocupando P GB. Determine la capacidad disponible en el USB de José; si:

$$P = \frac{3sen(\pi - x) - 5sen(2\pi - x)}{2cos(\frac{3\pi}{2} + x)}$$



Indique cuantos hermanos tiene Alison, si está dada por el valor de la expresión E.

