



PHYSICS

Chapter 05

2th
SECONDARY

VECTORES I



 **SACO OLIVEROS**

ACC




1. Cantidad física Escalar

Cantidades físicas que para estar bien definidas solo necesitan de un número y una unidad física, es decir, conocer su módulo o magnitud.

Ejemplo: la masa de un ladrillo es:

5 kg



número unidad de medida

Así también tenemos la densidad, el tiempo, la cantidad de trabajo, el volumen, etc.

2.Cantidad física Vectorial

Son aquellas cantidades físicas que además de tener un “módulo” necesitan de una dirección para quedar bien definidos.

Ejemplo: la velocidad del carro es:




↗ Dirección
20 m/s hacia la derecha
Número ↘ ↘ Unidad de medida

Así también tenemos la aceleración, la fuerza, la velocidad, el torque, el impulso etc.


¿QUÉ ES UN VECTOR?

Elemento matemático que utilizaremos para representar una cantidad física vectorial .



Se representa con
un segmento de
recta orientado
Se lee: Vector V

Elementos del vector




Modulo ($|\vec{V}|$) : Es la cantidad de veces que contiene la unidad base de la cantidad física.

Dirección (θ): Expresado por la medida del ángulo θ en sentido antihorario a partir de +X.

VECTORES UNITARIOS CARTESIANOS


Son aquellos vectores cuyo módulo es la unidad de medida y se encuentran en los ejes coordenados cartesianos.



ADICIÓN DE VECTORES

La adición o suma de dos o más vectores es otro vector llamado **Resultante** (\vec{R})

Ejemplo: Sean los vectores \vec{A} , \vec{B} y \vec{C}



$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$$


$$\vec{R} = a\hat{i} + b\hat{j}$$

Donde su módulo de \vec{R} :

$$R = \sqrt{a^2 + b^2}$$


1

Determine los elementos del vector mostrado.



Resolución:

Los elementos del vector son: módulo y dirección.




Módulo : $5 \times 6\text{N} = 30\text{N}$

Dirección : $\theta = 180^\circ - 40^\circ$

$$\theta = 140^\circ$$


2

Determine el módulo y dirección de los vectores \vec{A} y \vec{B} , respectivamente.



Resolución:


vector "A"



Módulo : $A = 3u$

Dirección: $\theta = 90^\circ$


vector "B"



Módulo : $B = 3u$

Dirección : $\theta = 180^\circ$

Determine el vector \vec{F} en términos de los vectores unitarios \hat{i} y \hat{j} e indique su módulo.



RESOLUCIÓN

$$\vec{F} = (+3\hat{i} + 4\hat{j})u$$


$$F = \sqrt{3^2 + 4^2} u$$

$$F = \sqrt{9 + 16} u$$

$$F = \sqrt{25} u$$

$$F = 5 u$$

Determine el vector resultante de los vectores mostrados con su respectivo módulo.



RESOLUCIÓN

Determinación de los vectores

$$\vec{A} = +2\hat{i} \text{ u}$$

$$\vec{B} = -3\hat{j} \text{ u}$$

$$\vec{C} = +2\hat{i} \text{ u}$$

La Resultante \vec{R} es:

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$$

$$\vec{R} = (+4\hat{i} - 3\hat{j}) \text{ u}$$

El módulo de la resultante \vec{R} es:


$$R = \sqrt{4^2 + 3^2} \text{ u}$$

$$R = \sqrt{16 + 9} \text{ u}$$

$$R = \sqrt{25} \text{ u}$$

$$R = 5 \text{ u}$$

Determine el vector resultante de los vectores que se muestran.



RESOLUCIÓN

Determinación de los vectores

$$\vec{A} = (+2\hat{i} - \hat{j})u$$

$$\vec{B} = (-3\hat{i} + 3\hat{j})u$$


Su Resultante \vec{R} es:

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$$

$$\vec{R} = (-\hat{i} + 2\hat{j}) u$$

6

Jair y Anderson en el intento de jalar un bloque pesado ejercen fuerzas representadas por vectores mostrados, siendo ambas fuerzas no suficientes para desplazar al bloque. Determine el vector que representa a la fuerza resultante de ambas fuerzas con su respectivo módulo.



RESOLUCIÓN

$$\vec{J} = (-3\hat{i} + \hat{j})u$$

$$\vec{A} = (-4\hat{i} - \hat{j})u$$

Su resultante \vec{R}


$$\vec{R} = \vec{J} + \vec{A}$$

$$\vec{R} = (-7\hat{i})u$$


$$R = 7u$$

7

Juan desea ir de una ciudad A a otra ciudad B y para ello primero se desplaza desde A hasta C en línea recta y luego de igual forma de C a B. Hallar el desplazamiento resultante que realizó.



Resolución:



$$\bar{d} = (12\hat{i} + 9\hat{j})km$$