ALGEBRA Chapter 3

ISTSECONDARY

Ecuaciones







MOTIVATING STRATEGY

¿Cuál es la Ecuación mas antigua registrada?

El documento más antiguo en el que se presentan problemas

que se resuelven con ecuaciones es el papiro Rhind de 1650 a.C.

(en la imagen puede verse un fragmento).


Uno de esos problemas dice: "Un montón más la séptima parte

del montón es igual a 19. ¿Cuánto hay en el montón?"

Observa que en aquella época aún no se utilizaba la "x" para resolver

las ecuaciones. El lenguaje algebraico que ahora conocemos no existía.

Imagina el esfuerzo y la técnica que debían de tener para plantear y buscar soluciones a los problemas con ecuaciones.






ECUACIONES

Es una igualdad que se cumple para ciertos valores de sus incógnitas

Ejemplo:

$$\frac{2x-1}{5} = \frac{x}{2}$$

Elementos de una ecuación



ANOTACIÓN
Resolver una
ecuación significa
hallar el conjunto
solución.



ECUACIÓN DE PRIMER GRADO CON UNA INCÓGNITA

FORMA GENERAL: ax + b = 0; $a \neq 0$

Procedimiento para la resolución:

Trasposición de términos:

Las incógnitas deben estar en un solo miembro Y los términos independientes en el otro Lo que esta sumando pasa al otro miembro restando y viceversa

Despejar la incógnita

Lo que está multiplicando pasa al otro miembro dividiendo y viceversa.

Ejemplo:

Calcular el valor de x

$$2x + 5 = 14 - x$$

$$2x + x = 14 - 5$$

$$3x = 9$$

$$x = 3$$

01

Ejemplo

Resuelva e indique el conjunto solución

$$3(x+1)-5=28$$

Resolución

$$3(x+1) = 33$$
$$x+1 = 11$$
$$x = 10$$

$$C.S = \{10\}$$





Halle el valor de x en la ecuación

$$4x + 8 - 8x = 9x - 13 + x$$

RESOLUCIÓN

$$4x + 8 - 8x = 9x - 13 + x$$

$$-4x + 8 = 10x - 13$$

$$8 + 13 = 10x + 4x$$

$$21 = 14x$$

$$3$$

$$21$$

$$\frac{21}{14} = x$$

$$x=\frac{3}{2}$$





Determine el valor de x

$$2(9x-5)+4(2x-1)=2(7x+6)$$

RESOLUCIÓN

$$2(9x - 5) + 4(2x - 1) = 2(7x + 6)$$

$$18x - 10 + 8x - 4 = 14x + 12$$

$$26x - 14 = 14x + 12$$

$$26x - 14x = 12 + 14$$

$$12x = 26 \implies x = \frac{26}{12}$$



3

Determine el valor de x

$$\frac{6x}{4} - 8 = \frac{x}{2} + 4$$

RESOLUCIÓN

$$mcm(4;2) = 4$$

$$4\left(\frac{6x}{4}\right)-4\left(8\right)=4\left(\frac{x}{2}\right)+4\left(4\right)$$

$$6x - 32 = 2x + 16$$

$$6x - 2x = 16 + 32$$

$$4x = 48 \qquad \implies x = \frac{48}{4}$$

x = 12



Determine el valor de y



$$\frac{y-1}{2} - \frac{y}{10} = \frac{3y-1}{5} - 1$$

mcm(2;10;5) = 10

$$\frac{5}{10}\left(\frac{y-1}{2}\right) - 10\left(\frac{y}{10}\right) = \frac{2}{10}\left(\frac{3y-1}{5}\right) - 10\left(1\right)$$

$$5(y-1) - y = 2(3y-1) - 10$$

$$5y - 5 - y = 6y - 2 - 10$$

 $4y - 5 = 6y - 12$

$$-5+12 = 6y - 4y$$
 $7=2y$





Calcule el valor de x en

$$\frac{3x+7}{4} = \frac{x+2}{3}$$

RESOLUCIÓN

$$5x = -13$$

$$x=-\frac{13}{5}$$

HELICO | PRACTICE

En una empresa contratan 30 obreros los cuales reciben el mismo sueldo. Si se sabe que el sueldo total que recibieron entre los 30 obreros está representado por 1000x soles, donde x se obtiene resolviendo la ecuación

$$\frac{5x}{3} + \frac{2x}{5} + \frac{x}{2} = 77$$

¿Cuál es el sueldo de un obrero?

RESOLUCIÓN

$$\begin{array}{c}
10 \\
30 \left(\frac{5x}{3}\right) + 30 \left(\frac{2x}{5}\right) + 30 \left(\frac{x}{2}\right) = 30 \left(77\right) \\
50x + 12x + 15x = 30(77) \\
77x = 30(77) \\
x = 30
\end{array}$$

$$mcm(3; 5; 2) = 30$$

Sueldo de un obrero

$$\frac{Total\ sueldo}{N\'{u}mero\ de\ obr.} = \frac{1000(30)}{36}$$

S/. 1000





En un concurso de baile hay un premio, si sumas la <u>sexta parte</u>, su doceava parte y la <u>cuarta parte</u> del premio resulta ser 80 soles. ¿Cuánto será el premio?

RESOLUCIÓN

Premio : **12***x*

$$2x + x + 3x = 80$$
$$6x = 80$$
$$x = \frac{80}{6}$$

Piden : **12***x*

$$\frac{2}{12}\left(\frac{80}{6}\right)$$

160

El premio será de S/. 160