ARITHMETIC Chapter 6

5th of Secondary



REGLA DEL TANTO POR CIENTO





<u>INTRODUCCIÓN</u>

Veamos el siguiente ejemplo.

Carlos desea comprar una Tablet cuyo precio es de 1000 soles, si le aplican 2 descuentos sucesivos de 20% y 30%.¿Cuánto pagó por la Tablet?





¿QUE ES EL TANTO POR CIENTO (%)?

El tanto por ciento nos indica una comparación entre una parte y un todo considerando el todo como 100 y de esta tomar tantas partes como se requiera.

100 partes iguales (Todo)

1	1	1		1	1
100	100	100	•••	100	100

10 partes (El 10 por ciento)
$$\frac{10}{100}$$
 = 10%

35 partes (El 35 por ciento) $\frac{35}{100}$ = 35%

En general

El a por ciento =
$$\frac{a}{100}$$
 = a%

Algunas equivalencias

5% =
$$\frac{5}{100}$$
 = $\frac{1}{20}$ 75% = $\frac{75}{100}$ = $\frac{3}{4}$

$$40\% = \frac{40}{100} = \frac{2}{5}$$

$$100\% = \frac{100}{100} = 1$$



¿QUE ES PORCENTAJE?

Es el resultado que se obtiene al aplicar el tanto por ciento a una cantidad

Ejemplos

El 20% (80) =
$$\frac{20}{100}$$
 (80) = 16

El 75% (120) =
$$\frac{75}{100}$$
 (120) = 90

Es decir:

Observación

Toda cantidad es el 100% de sí misma

$$N = 100\% N$$

OPERACIONES CON PORCENTAJES



$$a\%N \pm b\%N = (a \pm b)\%N$$

$$N = \frac{30\%N}{50\%N} + = 100\%xN$$



2 Multiplicación

$$a \cdot (b \% N) = (a \cdot b) \% N$$

5x(10%N) = 50%N

2x(70%N) = 140%N

Además:

El a% del b% del c% de N es: $a\% \cdot b\% \cdot c\% \cdot N$

El 10% del 5% de N = 10%x5%xN

AUMENTOS Y DESCUENTOS SUCESIVOS:

1 DESCUENTOS SUCESIVOS

Sean los descuentos sucesivos D1 y D2

Du = (D1 + D2) -
$$\frac{D1.D2}{100}$$
)%

Ejemplo:

Sean los descuentos sucesivos del 20% mas 40%. Entonces:

$$Du = \left[20 + 40 - \frac{20.40}{100}\right]\% = 52\%$$





AUMENTOS SUCESIVOS

Sean los aumentos sucesivos A1 y A2

Au = (A1 + A2) +
$$(\frac{A1 \cdot A2}{100})$$
%

Ejemplo:

Sean los aumentos sucesivos del 20% mas 30%.

Entonces:

$$Au = \left[20 + 30 + \frac{20.30}{100}\right]\% = 56\%$$

APLICACIONES COMERCIALES

1. Si hay Descuento

$$P_V = P_F - D$$

Pv: Precio de venta.

Pr: Precio fijado.

D: Descuento o Rebaja.

NOTA:

El D se considera como un % de P_F a no ser que el problema indique lo contrario

2. Si hay Ganancia

$$P_V = P_C + G_B$$

Pc: Precio de costo.

GB: Ganancia Bruta.

NOTA:

La G_B se considera como un % de P_C a no ser que el problema indique lo contrario

Donde:

$$G_N = G_B - Gastos$$

GN: Ganancia Neta.



3. Si hay Perdida

$$P_V = P_C - P$$

Pc: Precio de costo.

P: Perdida.

NOTA:

La P se considera como un % de Pc a no ser que el problema indique lo contrario

Ejercicios:

1. Se vende un articulo en S/. 360 con un descuento del 20%. ¿Cuál fue su precio fijado?

Resolución

Por dato:

Sabemos:

$$P_V = P_F - D$$

Reemplazando:

$$360 = P_F - 20\%P_F$$

$$360 = 80\%P_{F}$$

$$\begin{array}{c} 90 & 4 \\ 360 = \frac{80}{100} P_{F} \implies P_{F} = 90 \times 5 \\ & \vdots \\ & P_{F} = S/.450 \end{array}$$

2. En cuanto se vendió un articulo que costo S/.480, ganado el 25%.

Resolución Sabemos:

Sabernos:
$$P_V = 125\%P_C$$

 $P_V = P_C + G_B$ 120

Reemplazando:
$$P_V = \frac{5}{4}x480$$

 $P_V = P_C + 25\%P_C$ $P_V = 5/600$

$$G_B = 25\%0$$
 $P_V = P_C + 25\%P_C$ $\therefore P_V = S/.600$

Resolución


$$P_V = P_C - P$$

$$P_V = 90\% P_C$$

$$D_V = \frac{9}{100} \times 600$$

$$P_V = P_C-10\%P_C$$
 : $P_V = S/.540$

∴
$$P_V = S/.540$$



OBS.-Los aumentos sucesivos tienen la misma forma general solo cambia el signo



- 1. Responda.
 - a) ¿Qué porcentaje de 750 es 30?
 - b) ¿De qué número es 1260 el 40% menos?

RESOLUCIÓN

a.
$$\frac{30}{750}$$
 x 100% = 4%

b.
$$60\%N = 1260$$

 $N = 2100$

Rpta: 4%; 2100

2. ¿A qué descuento único equivalen los descuentos sucesivos del 10 %, 20 % y 20 %?

RESOLUCIÓN

Sea el precio inicial: N Aplicando los descuentos:



N .
$$\frac{9}{10}$$
 . $\frac{4}{5}$. 80% = 57,6% N

El descuento único (DU) será:

Rpta: 42,4%

3. ¿A cómo debo vender lo que costó S/600 para ganar el 20% del costo?

RESOLUCIÓN

$$Pv = Pc + G$$

$$Pv = 600 + 20\% (600)$$

$$Pv = 120\% (600)$$

$$Pv = \frac{120}{100}\% (600)$$

$$Pv = 720$$

Rpta: 720

4. Se tiene una piscina circular, si se incrementa su altura en un 60 %. Calcule qué porcentaje hay que aumentar al radio de la piscina, para que su volumen aumente en un 150 %.

RESOLUCIÓN

Datos:
$$h \longrightarrow 160\%h$$

 $r \longrightarrow (100+x)\%r$
 $100\%V \longrightarrow 250\%V$

Sabemos:
$$V = \pi r^2 h$$

 $250\%V = \pi [(100+x)\%r]^2 (160\%h)$
 $250\%V = \pi \left[\frac{100+x}{100}\right]^2 / (160\%h)$
 $\frac{250}{160} = \left[\frac{100+x}{100}\right]^2$
 $\frac{5}{4} = \frac{100+x}{100}$
 $\therefore x = 25$

Rpta: 25%



5. El costo de un articulo es S/. 5000. ¿Qué precio se debe fijar para su venta sabiendo que al hacer un descuento del 25% aún se gana el 20% del costo?

RESOLUCIÓN

De los datos:

$$Pc = 5000$$

Sea: Pf el precio fijado

Se rebaja el 25% del Pf

$$Pv = Pc + Gan.$$

$$75\%$$
Pf = PC + 20%. PC $\frac{75}{100}$. Pf = $\frac{120}{100}$.5000

Rpta: 8000



6. Se vendieron dos celulares a S/. 600 cada uno. Si uno de ellos se gano el 25% y en el otro se perdió el 25%, determine si hubo pérdida o ganancia y de cuánto?

RESOLUCIÓN

De los datos tenemos:

$$Pv_{(1)} = Pv_{(2)} = 600$$

$$Gan_{(1)} = 25\%Pc_{(1)}$$
 Perd₍₂₎ = 25%Pc₍₂₎

Reemplazamos en el primer caso:

$$Pv_{(1)} = 600$$
 Pv = Pc + Gan.

600 =
$$Pc_{(1)}$$
 + 25% $Pc_{(1)} \rightarrow 600 = \frac{125}{100}$. $Pc_{(1)}$
 $Pc_{(1)} = 480$

Reemplazando en el segundo caso:

$$Pv_{(2)} = 600$$
 Pv = Pc - Pérdida.

600 =
$$Pc_{(2)}$$
 - 25% $Pc_{(2)} \rightarrow 600 = \frac{75}{100}$. $Pc_{(2)}$

$$Pc_{(1)} = 800$$

Al final reúne: $Pv_{(1)} + Pv_{(2)} = 1200$

Al inicio invierte: $Pc_{(1)}$ + $Pc_{(2)}$ = 1280

Rpta: pierde 80



7. En la FBP (Federación Peruana de Box) un boxeador decide retirarse cuando tenga un 90% de triunfos en su carrera. Si ha peleado 200 veces, obteniendo 170 triunfos, ¿Cuál es el mínimo número de peleas adicionales necesarias para que el boxeador se pueda retirar?

RESOLUCIÓN

De los datos tenemos:

 N° peleas = 200 N° triunfos = 170

Sea "n" el N° de peleas adicionales

Obs. para que n sea mínimo todos deben ser triunfos

Del dato:
$$170 + n = 90\%(200 + n)$$

 $170 + n = \frac{90}{100}.(200 + n)$

Rpta: 100