



# GEOMETRÍA

## Capítulo 18

**5th**  
SECONDARY


PIRÁMIDE Y CONO



 **SACO OLIVEROS**




**Las pirámides de Egipto son, de todos los vestigios legados por Egipto de la antigüedad, los más portentosos y emblemáticos monumentos de esta civilización y en particular, las tres grandes pirámides conocidas como las tumbas de los faraones, Keops, Kefrén y Micerino, todas de base cuadrada y cuya construcción se basó en el número áureo, también en este capítulo estudiaremos las formas geométricas de dichas pirámides, calcularemos su área y su volumen como se muestra en la figura.**





## PIRÁMIDE REGULAR

Es una pirámide que tiene por base, una región poligonal regular y el pie de su altura es el centro de la base.



- Área de la superficie lateral ( $A_{SL}$ )

$$A_{SL} = p(\text{base}) \cdot A_p$$

$p(\text{base})$ : semiperímetro de la base

- Área de la superficie total ( $A_{ST}$ )

$$A_{ST} = A_{SL} + A(\text{base})$$


$A(\text{base})$ : área de la base

- Volumen ( $V$ )

$$V = \frac{1}{3} \cdot A(\text{base}) \cdot h$$

## CONO CIRCULAR RECTO O CONO DE REVOLUCIÓN

Es el cono cuya base es un círculo y el pie de la altura es el centro de dicha base.




$$A_{SL} = \pi r g$$

$$A_{ST} = \pi r (g + r)$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot A_{(base)} \cdot h$$


## DESARROLLO DE LA SUPERFICIE LATERAL

Es un sector circular cuyo radio es la generatriz y el centro es el vértice del cono.



$$\Phi = 360^\circ \left( \frac{r}{g} \right)$$

1. Calcule el volumen de una pirámide triangular regular, si su altura mide  $2\sqrt{3}$  u y el circunradio de su base mide  $\sqrt{6}$  u.



- Piden: V  

$$V = \frac{1}{3} \cdot A_{(\text{base})} \cdot h \quad (h = 2\sqrt{3})$$
- Como la base es una región triangular regular, entonces O es el circuncentro  


$$AO = OC = OD = \sqrt{6}$$
- $\triangle AOD$ :  $AD = \sqrt{6} \cdot \sqrt{3}$   
 $AD = \sqrt{18}$
- Reemplazando en el teorema.

$$V = \frac{1}{3} \left( \frac{\sqrt{18}^2 \cdot \sqrt{3}}{4} \right) \cdot 2\sqrt{3}$$


$$V = 9 u^3$$



2. Calcule el volumen de una pirámide cuadrangular regular si su arista lateral de longitud 4 u forma  $30^\circ$  con la base.



- Piden:  $V$   


$$V = \frac{1}{3} \cdot A_{(\text{base})} \cdot h$$
- Se traza la altura  $\overline{EO}$
-   $\triangle EOC$  : Notable de  $30^\circ$  y  $60^\circ$
- Reemplazando en el teorema.

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{(4\sqrt{3})^2}{2} \cdot (2)$$

$$V = 16 u^3$$



3. Calcule el área de la superficie lateral de una pirámide cuadrangular regular cuya altura mide 12 u y arista básica mide 10 u.




- Piden:  $A_{SL}$        $A_{SL} = P_{(base)} \cdot A_p$
- Trazamos  $\overline{OM} \perp \overline{CD}$ .
- Se traza  $\overline{VM}$ .
- Por teorema de las 3 perpendiculares  $m\angle VMC = 90^\circ$  ( $\overline{VM}$ : Apotema)
- $\triangle VOM$  : T. de Pitágoras  
 $(VM)^2 = 12^2 + 5^2 \rightarrow VM = 13$
- Reemplazando en el teorema.

$$A_{SL} = \frac{(10 + 10 + 10 + 10) \cdot 13}{2}$$

$$A_{SL} = (20) \cdot 13$$

$$A_{SL} = 260 \text{ u}^2$$

#### 4. Calcule el área de la superficie lateral del cono circular recto .



- Piden:  $A_{SL}$

$$A_{SL} = \pi \cdot r \cdot g$$

- Por teorema de las proyecciones.

$$g^2 - 8^2 = (g - 2)^2 - 2^2$$

$$\cancel{g^2} - 64 = \cancel{g^2} - 4g + 4 - 4$$

$$4g = 64$$

$$g = 16$$


- Reemplazando en el teorema.

$$A_{SL} = \pi(4)(16)$$

$$A_{SL} = 64\pi u^2$$



5. Calcule el volumen del cono circular recto mostrado, si O es centro.



- Piden:  $V$

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

- Por teorema de las antiparalelas.

$$r^2 = (2)(6)$$

$$r^2 = 12$$


- Reemplazando en el teorema.

$$V = \frac{1}{3} \pi \cdot 12 \cdot 6$$

$$V = 24\pi u^3$$



6. En la figura se muestra una plomada de metal; la parte superior en forma de cilindro circular recto y la parte inferior en forma de cono circular recto. Calcule el valor de  $x$ , si el volumen de la parte cilíndrica es igual al cuádruple del volumen de la parte cónica



- Piden:  $x$
- Por dato:


$$V_{(\text{Cilindro})} = 4V_{(\text{Cono})}$$

$$\cancel{\pi} \cdot (\cancel{x})^2 (2x) = 4 \left[ \frac{\cancel{\pi} \cdot (\cancel{x})^2 (\cancel{3})}{\cancel{3}} \right]$$

$$2x = 4$$

$$x = 2 \text{ cm}$$

7. En la lámpara mostrada, calcule el área de la superficie curva si tiene forma de superficie lateral de un tronco de cono circular recto. Además, los diámetros de las circunferencias miden 12 cm y 28 cm.



- Piden:  $A_{SL}$

$$A_{SL} = \pi(r + R)g$$

$$A_{SL} = \pi(6 + 14).24$$

$$A_{SL} = \pi(20).24$$

$$A_{SL} = 480\pi \text{ u}^2$$