MATHEMATICAL REASONING

Chapter 10






OPERACIONES MATEMÁTICAS






HELICOMOTIVACIÓN



Describe lo que observas ...



HELICOTEORÍA



¿Qué es una operación matemática?

Es un proceso que consiste en la transformación de una o más cantidades en una cantidad llamada resultado bajo ciertas reglas o condiciones en la cual se define la operación. Toda operación matemática tiene un símbolo que la representa llamado operador matemático. Como ejemplos de operaciones matemáticas tenemos:

Adición
$$24 + 12 = 36$$

Sustracción $14 - 5 = 9$

Multiplicación $10 \times 8 = 80$


División $10 \div 2 = 5$



¿Qué es un operador matemático?



Es aquel símbolo que representa a una operación matemática. Nos permite reconocer la operación matemática a emplear con su respectiva regla de definición.



FINCO PRACTICA



Carlitos está estudiando para su examen de matemáticas y encuentra este problema propuesto en su libro :

Se define en Q

Halle el valor de E = 9 + 16.

Si el respondió correctamente el problema podría decir ¿Cuál fue su respuesta?

Resolución

$$9 = 9^2 + \sqrt{9} = 84$$

$$16 = 16^2 + \sqrt{16} = 260$$



Rpta.

344

Se define en \mathbb{R}

$$a*b = (a-b)^2$$

Halle el valor de E = (5*2)*7.

Resolución

$$E = 9 * 7$$

$$= (9 - 7)^{2}$$

$$= (2)^{2}$$

$$= 4$$



$$E = (5 * 2) * 7$$
 $E = 9 * 7$
 $E = 4$

Luis le esta ayudando a su hermana Noelia en su tarea semanal. Noelia le pregunta a Luis por este problema:

Se define en \mathbb{Z}

$$x * y = x^2 - 4x - 1$$

Halle el valor de
$$\mathbf{E} = \underbrace{9^*(9^*(9^*...))}_{20 \text{ operadores}}$$
. Podría decir, ¿cuánto es la respuesta correcta?

Si Luis al resolver el problema se $x * y = x^2 - 4x - 1$ equivoca por 3 unidades más.

Resolución

Si:
$$x * y = x^2 - 4x - 1$$

E = $9*(9*(9*(9*...))$
E = $9^2 - 4(9) - 1$

$$E = 81 - 36 - 1$$

$$E = 44$$

Tres unidades más: 47

El profesor de Razonamiento Matemático, está preparando su clase y como problema modelo va a proponer y resolver el siguiente problema en pizarra:

Se define en $\mathbb R$

$$\boxed{a-2} = 3a-1$$

Halle el valor de

$$E = \boxed{3} + \boxed{1}$$

Si Juanita es su mejor alumna y resolvió el problema antes que su profesor, podría decir, ¿cuál fue la respuesta que dio Juanita?

Resolución

$$= 3(5) - 1 = 14$$



$$= 3(3) - 1 = 8$$

$$=3(10)-1=29$$

$$E = \boxed{3} + \boxed{1}$$

$$= 14 + 29$$

Rpta.

43

Sobre un tablero de ajedrez escribió el siguiente ejercicio:

Se define en \mathbb{R}

$$a^2 * b^3 = 3a + 4b$$

Halle el valor de E = 16*27.

Resolución



$$\frac{1}{2}$$
 a = 4 y b = 3


José, en uno de sus viajes a Egipto, encuentra la siguiente inscripción en una de las pirámides que visitó:

$$(n) = n(n+1)$$
Resuelva (y) = 1806.


Si José toma un lápiz y papel y después de unos minutos pudo calcular el valor de y, podría usted decir, ¿cuál fue el valor de y que calculó José?

$$\mathsf{Si}: \ \widehat{(n)} = n(n+1)$$

Resuelva:





Resolución













Una extraña bacteria tiene la particularidad de **triplicarse por cada contacto con una gota de agua** y **se reduce a su mitad al estar cerca al fuego**. Si cierto día a David se le ocurre realizar una travesura, él tiene en un frasco 12 bacterias, el echa 1 gota en el recipiente y finalmente acerca dos veces el recipiente al fuego. Determine cuantas bacterias habrá después de hacer dicha travesura.

