

CHEMISTRY

Chapter 22


2nd
SECONDARY



ÓXIDOS




HELICOMOTIVACIÓN





FUNCIÓN ÓXIDO

Los óxidos son compuestos binarios que se forman cuando un metal o un no metal se combinan con el oxígeno.



ÓXIDO METÁLICO (ÓXIDO BÁSICO)

Son los óxidos formados por la combinación del oxigeno con metales. Estos elementos son generalmente sólidos a temperatura ambiental y poseen enlace iónico. Por reacción química con el H_20 dan origen a los hidróxidos.

FORMULACIÓN

$$M \stackrel{n+}{\longrightarrow} M_2 O_n$$



$$Na \stackrel{1+}{\smile} 0^{2-} \longrightarrow Na_2O_1$$

ÓXIDO NO METÁLICO (ÓXIDO ÁCIDO)

Los óxidos no metálicos son compuestos de bajo punto de fusión que se forman al reaccionar un no metal con el oxigeno. Se denominan también anhídridos.

FORMULACIÓN

$$E^{n+} \longrightarrow E_2O_n$$



$$Cl^{1+} + 0^{2-} \rightarrow Cl_2O_1$$

NOMENCLATURA

Constituye el conjunto de reglas mediante las cuales se nombran a los compuestos e iones. En química inorgánica se emplean tres sistemas: tradicional, stock y sistemática







$$K^{1+}$$
 $+$ 0^{2-} \rightarrow K_2O_1 \rightarrow K_2O_2 potasios 2 potasios (di) (mono)

Sistemática:

monóxido de dipotasio

stock:

óxido de potasio





Sistemática:

trióxido de dihierro

stock:

óxido de hierro (III)



Los óxidos son combinaciones de un elemento con el OXIGENO

. Un óxido básico es un compuesto que METALICO

METALICO

resulta de la combinación de un elemento ______con el oxígeno, por lo tanto su unión será iónica.

RESOLUCIÓN:

$$\begin{array}{c}
+1 \\
\text{Na} \\
\text{O}_{2}
\end{array} =
\begin{array}{c}
\text{Na}_{2}
\end{array}$$
(metal)
$$\begin{array}{c}
\text{Oxigeno}
\end{array}$$
(oxigeno)

Los óxidos metálicos son compuesto que resultan de combinar oxígeno generalmente con un metal.



Formule el óxido no metálico y nombre por la nomenclatura IUPAC

RESOLUCIÓN:

Sistemática:

dióxido de carbono

$$C^{4+} \xrightarrow{} C_2O_4 \xrightarrow{} CO_2$$



Complete el siguiente cuadro e indique el óxido con menor

atomicidad.

RESOLUCIÓN:



FÓRMULA	(N. IUPAC)	ATOMICIDAD
SO ₃	Trióxido de azufre	4
Cl ₂ O ₅	pentaóxido de dicloro	7
Br ₂ O ₅	Pentóxido de dibromo	7





Indique la fórmula del óxido de plomo (IV).

RESOLUCIÓN:

$$Pb^{4}+0^{2-}\rightarrow Pb_{2}O_{4}\rightarrow PbO_{2}$$



PREGUNT 5

Relacione.

- I. Pentaóxido de dicloro
- II. Óxido de estaño (IV)
- III. Trióxido de dicloro
- IV. Óxido de azufre (IV)
- V. Óxido de estaño (II)

RESOLUCIÓN:





El "sistema Stock de nomenclatura" fue propuesto en 1919 por Alfred Stock. Este sistema de nomenclatura se basa en nombrar a los compuestos escribiendo al final del nombre con números romanos, el estado de oxidación del elemento. Escribe el nombre Stock:

Au₂O: Oxido de oro (I)

PbO₂: Oxido de plomo (IV)

RESOLUCIÓN:

Nomenclatura STOCK: se nombra el elemento central con el prefijo correspondiente seguido del nombre del metal con su número de oxidación entre paréntesis con número romano, si es único no es necesario adicionarlo

La palabra anhídrido Tiene el prefijo 'An' que se refiere al equivalente "SIN", luego posee el sustantivo 'Hydros' que es sinónimo de AGUA, y tiene sufijo 'ido' que podría significar "QUE TIENE ASPECTO" y dándole sentido a la palabra al español se define como "Tiene aspecto de no tener agua." La fórmula de los anhídridos es del tipo X_2O (donde X es un elemento no metálico y O es oxígeno) De los siguientes óxidos, seleccione cuantos son óxidos ácidos:

Cu ₂ O	SO ₂	CO_2
SO ₃	FeO	HgO
SO ₃	FeO	HgO

RESOLUCIÓN:

No Metal + oxígeno → óxido ácido

 SO_2 CO_2 SO_3

Rpta 3