



ARITHMETIC

4th
SECONDARY

ASESORÍA TOMO VIII



 **SACO OLIVEROS**



¿Cuántas palabras con sentido o no se pueden formar con todas las letras de la palabra AMARRADA?

Resolución

Del dato tenemos:

AMARRADA

cada letra se encuentra

★ 2 veces el *R*

★ 4 veces el *A*

★ 1 vez el *M*

★ 1 vez el *D*

Permutación con repetición

$$Pr_{(2;4;1;1)}^8 = \frac{8!}{2! \times 4! \times 1! \times 1!}$$

$$Pr_{(2;4;1;1)}^8 = \frac{8 \times 7 \times \cancel{6}^3 \times 5 \times \cancel{4}}{\cancel{2} \times \cancel{4}}$$

piden: número de palabras

$$\therefore 840$$

RPTA:

840




A una reunión de amigos acuden 5 parejas de esposos. ¿De cuántas maneras pueden sentarse alrededor de una mesa redonda de modo que los esposos siempre se sienten juntos?

Resolución

Del dato tenemos:

5 parejas de esposos
(se sientan juntas)



Permutación circular

$$Pc_{(5)} = (5 - 1)!$$

$$Pc_{(5)} = 4! = 24$$

como son 5 parejas cada una se puede cambiar de lugar, entonces:

$$\rightarrow 24 \times 2! \times 2! \times 2! \times 2! \times 2!$$

piden: número de maneras
 $\therefore 768$

RPTA:

768




4 hombres y 3 mujeres deben sentarse en una fila de 7 asientos de modo que ningún hombre ocupe sitio par. ¿De cuántas maneras diferentes podrán sentarse?

Resolución

Del dato tenemos:

fila de 7 asientos



aplicando permutación lineal para los 4 hombres y 3 mujeres

➡ $\# \text{ maneras} = 4! \times 3!$

Donde:

$$\# \text{ maneras} = 24 \times 6$$

Piden: # maneras diferentes

$$\therefore \text{Total} = 144 \text{ maneras}$$

RPTA:

144

¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar 10 personas en una mesa redonda de 6 asientos si 4 personas están en espera?

Resolución

Debemos escoger
solo a 6 personas y

$$C_{\cancel{6}}^{10}$$

x

$$\frac{10 \cdot 9 \cdot \cancel{8} \cdot 7}{\cancel{4} \cdot 3 \cdot \cancel{2} \cdot 1}$$

x

$$210$$

x

Debemos ordenar
a las 6 personas

$$Pc(6)$$

$$5!$$

$$120 =$$

RPTA:

25200 maneras



Pamela tiene 7 frutas diferentes. ¿Cuántos jugos surtidos de diferentes sabores puede preparar?

Resolución

Puede preparar jugos surtidos con frutas de 2 en 2, de 3 en 3, así hasta de 6 en 6

$$\underbrace{C_0^7 + C_1^7 + C_2^7 + C_3^7 + C_4^7 + C_5^7 + C_6^7 + C_7^7}_{2^7 - 1 - 7}$$

N° de maneras: $2^7 - 1 - 7 = 120$

RPTA:

120 maneras



En una reunión hay 12 hombres y 7 mujeres, se desea formar grupos de 3 personas. ¿De cuántas maneras podrán hacerlo si deben de haber, por lo menos, 2 mujeres en el grupo?

Resolución

como no interesa el orden
aplicamos combinaciones

Del dato tenemos:
al menos dos mujeres

$$\begin{aligned} & \text{⊛ } C_2^7 \times C_1^{12} \\ & \frac{7!}{(7-2)!2!} \times \frac{12!}{(12-1)!1!} \end{aligned}$$

$$\frac{7 \cdot \cancel{6} \cdot \cancel{5}^3}{\cancel{2} \cdot \cancel{5}!} \times \frac{12 \cdot \cancel{11}}{1 \cdot \cancel{11}!} = 252$$

$$\text{⊛ además: } C_3^7 \times C_0^{12}$$

$$\frac{7!}{(7-3)!3!} \times \frac{12!}{(12-0)!0!}$$

$$\frac{7 \cdot \cancel{6} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{4}}{\cancel{3} \cdot \cancel{4}!} \times \frac{\cancel{12}}{1 \cdot \cancel{12}!} = 35$$

piden: número de maneras

$$252 + 35 = 287$$

RPTA:

287



Tres primas van a cenar con tres amigos. Si todos se sientan alrededor de una mesa circular con seis asientos, ¿cuál es la probabilidad de que las primas estén siempre juntas?

Resolución

$$\# \text{ casos posibles: } n(\Omega) = \text{Pc}(6) = 5! = 120$$

$$\# \text{ casos favorables: } n(A) = \text{Pc}(4) \times 3! = 3! \times 3! = 36$$

$$P_{(A)} = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{\cancel{36}}{\cancel{120}} = \frac{3}{10}$$

RPTA:

$$P(A) = 3/10$$



Se tiene 5 libros: 3 de aritmética y 2 de química ordenados en un estante. ¿Cuál es la probabilidad de que los libros de química sean separados por los 3 libros de aritmética?

Resolución

casos posibles $n(\Omega)$

Se ordenan 5 libros

$$n(\Omega) = 5!$$

➔ $n(\Omega) = 120$

Del dato tenemos:

Evento A: Los libros de química en los extremos



casos favorables $n(A)$

$$n(A) = 3! \times 2! \quad \text{➔} \quad n(A) = 12$$

Piden:

$$P(A) = \frac{12}{120} \quad \therefore P(A) = \frac{1}{10}$$

RPTA:

1/10



En una sección de 50 alumnos se desea formar una comisión de tres miembros. ¿Cuál es la probabilidad de que el alumno delegado Paolo Costa siempre integre la comisión?

Resolución

casos posibles $n(\Omega)$

Se escogen 3 alumnos de 50

$$n(\Omega) = C_3^{50} = \frac{50!}{(50-3)! 3!}$$

$$n(\Omega) = \frac{50 \cdot 49 \cdot \cancel{48} \cdot \cancel{47!}}{\cancel{47!} \cdot \cancel{6}}$$

$$n(\Omega) = 50 \cdot 49 \cdot 8$$

Evento A: el alumno Paolo es fijo

$$n(A) = C_2^{49} = \frac{49!}{(49-2)! 2!}$$

$$n(A) = \frac{49 \cdot \cancel{48} \cdot \cancel{47!}}{\cancel{47!} \cdot 2} = 49 \cdot 24$$

$$\text{Piden: } P(A) = \frac{\cancel{49} \cdot \cancel{24}}{50 \cdot \cancel{49} \cdot \cancel{8}} = \frac{3}{50}$$

RPTA: **3/50**



Se tiene un grupo de 7 hombres y 4 mujeres. Si se va a elegir una comisión de 3 personas, determine la probabilidad de que la comisión esté integrada al menos por 1 hombre.

Examen de admisión UNI 2018 - 1

Resolución

casos posibles $n(\Omega)$

Se escogen 3 personas de 11

$$n(\Omega) = C_3^{11} = \frac{11!}{(11-3)! 3!}$$

$$n(\Omega) = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot \cancel{8!}}{\cancel{8!} \cdot 6}$$

$$n(\Omega) = 165$$

Evento A: al menos 1 hombre

$$P_{(\text{al menos 1 hombre})} = 1 - \underbrace{P_{(\text{ningún hombre})}}$$

$$P_{(\text{al menos 1 hombre})} = 1 - P_{(\text{todas mujeres})}$$

$$P_{(\text{al menos 1 hombre})} = 1 - \frac{C_3^4}{165}$$

$$P_{(\text{al menos 1 hombre})} = 1 - \frac{4}{165} =$$

RPT
A:

161
165