

# TRIGONOMETRY

## Chapter 14

**5th**  
SECONDARY

**IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS  
AUXILIARES DEL ÁNGULO  
COMPUESTO**



 **SACO OLIVEROS**


Los fenómenos periódicos son aquellos que se **repiten** en el tiempo de forma idéntica.

Así tenemos fenómenos periódicos como el movimiento de rotación de la tierra , el sonido , la corriente alterna , la luz , las mareas , los latidos del corazón entre otros.

Para un mejor estudio de estos fenómenos , se usan a **las funciones trigonométricas seno y coseno**.

**Ejemplo:** La elongación de un resorte  $y$  (cm), se puede modelar por la ecuación:

$$y = 3\text{sen}x + 4\text{cos}x$$



¿Puedes calcular la máxima elongación del resorte?



**Rpta:** 5 cm



# IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS AUXILIARES

$$1. \quad \text{sen}(x + y) \cdot \text{sen}(x - y) = \text{sen}^2 x - \text{sen}^2 y$$

$$2. \quad \text{cos}(x + y) \cdot \text{cos}(x - y) = \text{cos}^2 x - \text{sen}^2 y$$

**Ejemplo:** Reducir la expresión

$$E = \text{sen}(30^\circ + \alpha) \cdot \text{sen}(30^\circ - \alpha) + \text{sen}^2 \alpha$$

**Resolución:**

$$E = \underbrace{\text{sen}(30^\circ + \alpha) \cdot \text{sen}(30^\circ - \alpha)} + \text{sen}^2 \alpha$$

$$\text{IA 1.} \quad \Rightarrow E = \text{sen}^2 30^\circ - \cancel{\text{sen}^2 \alpha} + \cancel{\text{sen}^2 \alpha} \Rightarrow E = (1/2)^2 \quad \therefore E = 1/4$$

$$3. \quad \tan x + \tan y + \tan(x + y) \cdot \tan x \cdot \tan y = \tan(x + y)$$

$$4. \quad \tan x - \tan y - \tan(x - y) \cdot \tan x \cdot \tan y = \tan(x - y)$$

### Ejemplo:

$$\text{Calcule } E = \tan 20^\circ + \tan 17^\circ + \frac{3}{4} \cdot \tan 20^\circ \cdot \tan 17^\circ$$

### Resolución:

$$E = \tan 20^\circ + \tan 17^\circ + \frac{3}{4} \cdot \tan 20^\circ \cdot \tan 17^\circ$$

$$E = \tan 20^\circ + \tan 17^\circ + \tan(20^\circ + 17^\circ) \cdot \tan 20^\circ \cdot \tan 17^\circ$$

$$\xrightarrow{\text{IA 3.}} E = \tan(20^\circ + 17^\circ) \Rightarrow E = \tan(37^\circ)$$



Recuerda :

$$\tan(37^\circ) = \frac{3}{4}$$

$$\therefore E = 3/4$$

5. Para x variable :

$$\underbrace{-\sqrt{a^2 + b^2}}_{\text{mínimo}} \leq a.\text{sen}x + b.\text{cos}x \leq \underbrace{\sqrt{a^2 + b^2}}_{\text{máximo}}$$

**Ejemplos:**

$$-5 \leq 3\text{sen}x + 4\text{cos}x \leq 5$$

$$-2 \leq \sqrt{3}\text{sen}x + \text{cos}x \leq 2$$

$$-13 \leq 12\text{sen}x - 5\text{cos}x \leq 13$$

**Importante:**  $-\sqrt{2} \leq \text{sen}x \pm \text{cos}x \leq \sqrt{2}$

**6.** Si:  $A + B + C = 180^\circ$   
 $\Rightarrow \tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$   
 $\Rightarrow \cot A \cdot \cot B + \cot B \cdot \cot C + \cot C \cdot \cot A = 1$

**7.** Si:  $x + y + z = 90^\circ$   
 $\Rightarrow \cot x + \cot y + \cot z = \cot x \cdot \cot y \cdot \cot z$   
 $\Rightarrow \tan x \cdot \tan y + \tan y \cdot \tan z + \tan z \cdot \tan x = 1$

**Ejemplo:** Calcule

$$E = \frac{\tan 40^\circ + \tan 60^\circ + \tan 80^\circ}{\tan 40^\circ \cdot \tan 60^\circ \cdot \tan 80^\circ}$$

**Resolución:**

$$E = \frac{\tan 40^\circ + \tan 60^\circ + \tan 80^\circ}{\tan 40^\circ \cdot \tan 60^\circ \cdot \tan 80^\circ} \dots (*)$$

**OBS:**  $40^\circ + 60^\circ + 80^\circ = 180^\circ$

Usando **IA 6.** en  $(*)$ , tenemos:

$$E = \frac{\tan 40^\circ \cdot \tan 60^\circ \cdot \tan 80^\circ}{\tan 40^\circ \cdot \tan 60^\circ \cdot \tan 80^\circ} \therefore E = 1$$

1 Reduzca  $F = \text{sen}(x + 45^\circ) \cdot \text{sen}(x - 45^\circ) + \cos^2 x$

**Resolución:**

$$\text{sen}(x + y) \cdot \text{sen}(x - y) = \text{sen}^2 x - \text{sen}^2 y$$

$$F = \text{sen}(x + 45^\circ) \cdot \text{sen}(x - 45^\circ) + \cos^2 x$$

$$F = \text{sen}^2 x - \text{sen}^2 45^\circ + \cos^2 x$$

$$\Rightarrow F = \underbrace{\text{sen}^2 x + \cos^2 x}_1 - \underbrace{\text{sen}^2 45^\circ}_{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} \Rightarrow F = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)$$


$$\therefore F = \left(\frac{1}{2}\right)$$

2

Desde la azotea de una casa de 10m de altura, se observa dos marcas en el suelo con ángulos de depresión  $\alpha$  y  $\beta$ . Las visuales generadas miden respectivamente  $10\sqrt{5}$  y  $10\sqrt{6}$  m; calcule:

$$30 \cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta)$$

**Resolución:**



$$30 \cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) = 30(\cos^2 \alpha - \sin^2 \beta)$$

$$= 30 \left( \left( \frac{20}{10\sqrt{5}} \right)^2 - \left( \frac{10}{10\sqrt{6}} \right)^2 \right)$$

$$= 30 \left( \frac{4}{5} - \frac{1}{6} \right)$$



**Rpta: 19**

$$\cos(x + y) \cdot \cos(x - y) = \cos^2 x - \sin^2 y$$



3 Efectúe:  $J = (\sqrt{3} + \tan 13^\circ)(\sqrt{3} + \tan 17^\circ)$

**Resolución:**

$$\tan x + \tan y + \tan(x + y) \cdot \tan x \cdot \tan y = \tan(x + y)$$

$$J = (\sqrt{3} + \tan 13^\circ)(\sqrt{3} + \tan 17^\circ).$$

$$\Rightarrow J = \sqrt{3}^2 + \sqrt{3}\tan 17^\circ + \sqrt{3}\tan 13^\circ + \tan 13^\circ \cdot \tan 17^\circ \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$$

$$J = 3 + \sqrt{3} \left[ \tan 17^\circ + \tan 13^\circ + \frac{1}{\sqrt{3}} \tan 17^\circ \cdot \tan 13^\circ \right] \tan 30^\circ$$

$$\Rightarrow J = 3 + \sqrt{3} [\tan 30^\circ] \quad J = 3 + \sqrt{3} \left( \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

∴

$$J = 4$$

4 Determine el mínimo valor de:

$$F = 2\operatorname{sen}x + \sqrt{2}\cos(45^\circ - x) + 3\cos x.$$

**Resolución:**

$$\rightarrow F = 2\operatorname{sen}x + \sqrt{2}(\cos 45^\circ \cos x + \operatorname{sen} 45^\circ \operatorname{sen} x) + 3\cos x$$

$$\rightarrow F = 2\operatorname{sen}x + \cancel{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\cancel{\sqrt{2}}} \cdot \cos x + \cancel{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\cancel{\sqrt{2}}} \cdot \operatorname{sen} x + 3\cos x$$

$$\rightarrow F = 2\operatorname{sen}x + \cos x + \operatorname{sen}x + 3\cos x$$

$$\rightarrow F = 3\operatorname{sen}x + 4\cos x$$

$$\underbrace{-\sqrt{a^2 + b^2}}_{\text{mínimo}} \leq a\operatorname{sen}x + b\cos x \leq \underbrace{\sqrt{a^2 + b^2}}_{\text{máximo}}$$

Nos piden  $F_{\min}$  :  $F_{\min} = -\sqrt{3^2 + 4^2}$

∴

$$F_{\min} = -5$$

5

Un cuerpo particular en el océano; tiene un cambio vertical en el agua debido a la acción de las olas (marea), dicho cambio está dado por:

$$y = 0,4 \left[ \sqrt{3} \operatorname{sen} \left( \frac{\pi t}{2} \right) + \cos \left( \frac{\pi t}{2} \right) \right]$$



Donde “y” está en metros y t en segundos, Calcule la altura máxima de la marea.

## Resolución:

$$y = 0.4 \left[ \sqrt{3} \operatorname{sen} \left( \frac{\pi t}{2} \right) + \cos \left( \frac{\pi t}{2} \right) \right]$$

$$\underbrace{-\sqrt{a^2 + b^2}}_{\text{mínimo}} \leq a \operatorname{sen} x + b \cos x \leq \underbrace{\sqrt{a^2 + b^2}}_{\text{máximo}}$$

$$L_{\text{máximo}} = 0.4 * \sqrt{\sqrt{3}^2 + 1^2}$$

$$L_{\text{máximo}} = 0.4 * \sqrt{4}$$

$$L_{\text{máximo}} = 0.4 * 2 = 0.8$$


∴

$$L_{\text{máximo}} = 0.8\text{m} = 80\text{cm}$$

6 Del gráfico, calcule el valor de  $\tan\theta$ .

**Resolución:**

$$\tan\alpha = \frac{3}{2} \quad \tan\beta = \frac{4}{3}$$



▲ ABC:

$$\alpha + \beta + \theta = 180^\circ$$

$$\tan\alpha + \tan\beta + \tan\theta = \tan\alpha \tan\beta \tan\theta$$

Si  $x + y + z = 180^\circ$ , se cumple:  
 $\tan x + \tan y + \tan z = \tan x \cdot \tan y \cdot \tan z$


$$\frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \tan\theta = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \tan\theta$$

$$\frac{17}{6} + \tan\theta = 2 \cdot \tan\theta$$



$$\tan\theta = \frac{17}{6}$$

- 7 En la carpintería del señor José, se tiene un trozo de madera ABCD, tal que  $BC = DE = 10$  cm;  $AB = 40$  cm y  $AE = 50$  cm (ver figura). Luego de hacer los cortes AC y AD, ¿puedes indicar el valor de  $19\cot\alpha$ .



### Resolución:

$$\text{Si } \alpha + \beta + \theta = 90^\circ$$

$$\text{Entonces: } \cot\alpha + \cot\beta + \cot\theta = \cot\alpha \cdot \cot\beta \cdot \cot\theta$$

$$\cot\alpha + 5 + 4 = \cot\alpha \cdot 5 \cdot 4$$

$$\cot\alpha + 9 = 20\cot\alpha$$

$$9 = 19\cot\alpha$$

$$\therefore 19\cot\alpha = 9$$

Si  $x + y + z = 90^\circ$ , se cumple:  
 $\cot x + \cot y + \cot z = \cot x \cdot \cot y \cdot \cot z$



**SACO**  
**OLIVEROS**