
ARITHMETIC Chapter 3






Teoría de conjuntos I






IDEA DE CONJUNTO



TEORÍA DE CONJUNTOS



Noción



DETERMINACION DE UN CONJUNTO

A Por extensión

$$A = \{ 4; 9; 16 \}$$

B Por comprensión

$$A = \{ x^2 / x \in \mathbb{Z}^+ \land 1 < x < 5 \}$$

RELACIÓN DE PERTENENCIA(∈)

Ejemplo

En el conjunto $A = \{4; 9; 16\}$, se observa:

$$4 \in A$$

16 **∈**A

CARDINAL DE UN CONJUNTO

Ejemplo

$$n(A) = 3$$

$$Q = \{a; e; i; o; u\}$$

$$n(Q) = 5$$

RELACIONES ENTRE CONJUNTO



INCLUSIÓN

Simbólicamente

$$A \subset B \longleftrightarrow \forall x \in A \rightarrow x \in B$$

Ejemplo

Sea el conjunto Q = $\{a; e; i; o; u\}$

Entonces se cumple:

IGUALDAD

Simbólicamente

$$A = B \leftrightarrow A \subset B \land B \subset A$$

Ejemplo

Si los conjuntos A y B son iguales

$$A = \{y + 3; 13\}$$
 $B = \{x - 5; 17\}$

Entonces se cumple:

$$y + 3 = 17$$
 $y = 14$ $y = 13 = x - 5$ $y = 14$ $y = 18 = x$





Dado el conjunto A = {a; b; {c}; {d}}, escriba verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

Resolución



La relación de pertenencia (€) es de elemento a conjunto, la de inclusión (⊂) es de subconjunto a conjunto.

- **a)** C ∈ A
- **b**) b ∈ A
- **c)** {d} ∈ A
- **d)** {a} **⊂** A
- e) {c} **⊂** A

- (**F**)
- (V)
- (**V**)
- (**V**)
- (**F**)

RPTA:

FVVVF





Halle el cardinal de W.

$$W = \{x / x \in \mathbb{Z}^+, x < 9\}$$



"La forma del elemento del conjunto W "

Resolución

Por dato:

$$x \in \mathbb{Z}^+, x < 9$$

$$x \in \mathbb{Z}^+$$
, $x < 9 \longrightarrow x : 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8$





$$\longrightarrow$$
 W = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8}

$$n(W) = 8$$





Si los conjuntos A y B son iguales

$$A = \{3x + 2; 17\}$$

$$B = \{4y - 3; 11\}$$

calcule x + y.

<u>Resolución</u>

Por dato:

$$A = B$$

$$*$$
 3x + 2 = 11

$$3x = 9$$

$$x = 3$$

$$4y = 20$$

$$y = 5$$

$$x + y = 3 + 5 = 8$$







Calcule la suma de los elementos de

B =
$$\{3x / x \in \mathbb{Z}, -4 < x < 8\}$$



"La forma del elemento del conjunto B "

Resolución

$$x \in \mathbb{Z}$$
, $-4 < x < 8$

$$x \in \mathbb{Z}, -4 < x < 8 \implies x : -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7$$

$$W = \{-9; -6; -3; 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21\}$$

Suma de







En el conjunto

$$C = \{2x / x \in \mathbb{Z}^+, x < 6\}$$

calcule la suma de elementos de C.

Resolución

Por dato:

$$x \in \mathbb{Z}^+, x < 6$$
 \longrightarrow $x : 1; 2; 3; 4; 5$

Suma de elementos : 2+4+6+8+10= 30





Hernando es un niño muy travieso, constantemente hace bromas a sus compañeros y fomente el desorden en el aula, en diversas ocasiones sus padres han tenido que acudir a la escuela por la misma razón sin embargo él es muy hábil en el curso de matemáticas y ayuda a sus compañeros a resolver algunas tareas, por estas acciones que los profesores siente gran aprecio por Hernando ya que además de ser muy activo e inquieto también demuestra ser muy solidario ,debido a que siempre termina primero los ejercicios de aritmética el profesor le pidió que escribiera en su cuaderno una lista de todos los números de dos cifras iguales, ¿Cuántos números escribirá en su cuaderno?

Resolution:

Luego:

$$n(H) = 9$$

HELICO PRACTICE





La tienda Smartphone realizo un pedido de celulares gamer de última generación ya que últimamente están teniendo gran demanda por los jóvenes aficionados a jugar juegos como Wild Rift y Free Fire, la característica que tiene este tipo de pedido es que la última cifra del número de serie de cada celular esta representada por el conjunto:

$$E=\{x+1/x \in Z^+, 3x < 18\}$$

Y Andrea la encargada de la atención al público y de surtir el mostrador con la variedad de celulares disponibles para la venta, por un descuido mezcla los celulares de este pedido con otros que son especiales para juegos en línea y por ello debe verificarlos de acuerdo a dicha serie, escriba Verdadero (V)o Falso (F)

según convenga.

a.
$$8 \in E$$
..... (F)

b.
$$\{3;6\}\subset E.....(V)$$

c.
$$1 \in E$$
..... (F)

d.
$$\{5\} \in E$$
..... (F)

Por dato:
$$x ∈ \mathbb{Z}^+$$
, $3x < 18$
 $x < 6$ $x : 1; 2; 3; 4; 5$
X+1 $E = \{2; 3; 4; 5; 6\}$
RPTA: FVFF