
TRIGONOMETRY Chapter 19





ÁNGULOS COTERMINALES





Helicomotivación


El Canadarm 2, es un brazo manipulador robótico de la Estación Espacial Internacional. Este manipulador es operado controlando los ángulos de sus articulaciones.

Para obtener la posición final del astronauta en el extremo del brazo, se requiere un uso repetido de las razones trigonométricas de esos ángulos que se forman por los varios movimientos que se realizan.



ÁNGULOS COTERMINALES

Son aquellos ángulos trigonométricos que tienen el mismo lado inicial, vértice y lado final (terminal). Solo se diferencian en su medida.




De la figura: θ y ω son las medidas de dos ángulos coterminales.





Siendo α y β las medidas de dos ángulos coterminales, se verifica lo siguiente:







Indique cuáles de los siguientes pares de ángulos son coterminales.

I. 350° y -70°

II. 780° y 60°

III. 510° y 170°



Para dos ángulos coterminales cuyas medidas son x e y, se cumple:

$$x - y = 360^{\circ} \text{ n; } n \in \mathbb{Z}$$

RESOLUCIÓN

I. 350°- (-70°) = 350°+70° = 420°

No son ángulos coterminales.

II. 780°- 60° = 720° = 2(360°)

Sí son ángulos coterminales.

III. 510° - 170° = 340°

No son ángulos coterminales.

 En la opción II encontramos ángulos coterminales.



 $P = 15sen\alpha - 8cot\alpha$



Para dos ángulos coterminales cuyas medidas son α y 53° se cumple:

R. T.
$$(\alpha) = R. T. (53^{\circ})$$

RESOLUCIÓN

Como α y 53° son coterminales, entonces:

$$sen\alpha = sen53^{\circ}$$

$$\cot \alpha = \cot 53^{\circ}$$

Reemplazamos en P:

$$P = 15\left(\frac{4}{5}\right) - 8\left(\frac{3}{4}\right)$$

$$P = 12 - 6$$



Si los ángulos θ y α son coterminales, reduzca

$$M = \frac{8\cot\alpha}{\cot\theta} - \frac{3\sec\theta}{\sec\alpha} + 2$$



Para dos ángulos coterminales cuyas medidas son θ y α se cumple:

$$R.T.(\theta) = R.T.(\alpha)$$

RESOLUCIÓN

Como θ y α son coterminales, entonces:

$$\cot \theta = \cot \alpha$$


$$sec\theta = sec\alpha$$

Reemplazamos en M:

$$\mathbf{M} = \frac{8\cot\theta}{\cot\theta} - \frac{3\sec\theta}{\sec\theta} + 2$$

$$M = 8 - 3 + 2$$





Efectúe
$$E = \sqrt{3} \sec \beta - \cot^2 \beta$$

RESOLUCIÓN

Del gráfico, β y 30° son ángulos coterminales, por lo tanto:

$$sec\beta = sec30^{\circ}$$

$$\cot \beta = \cot 30^{\circ}$$

Reemplazamos en E:

$$E=\sqrt{3}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)-\left(\sqrt{3}\right)^2=2-3$$



Siendo θ y β ángulos coterminales, reduzca:

$$F = (3sen\theta + 4sen\beta)csc\theta$$

Para dos ángulos coterminales cuyas medidas son θ y β , se cumple:

$$R.T.(\theta) = R.T.(\beta)$$



RESOLUCIÓN

Como θ y β son coterminales, entonces:

$$sen\theta = sen\beta$$


Reemplazamos en F:

$$F = (3sen\theta + 4sen\theta) csc \theta$$

$$F = 7 sen \theta csc \theta$$



David compró un terreno en forma de rectángulo, tal como se muestra en la figura



Si α y 45° son las medidas de dos ángulos coterminales, ¿cuál es el área de dicho terreno?

RESOLUCIÓN

Como a y 45° son coterminales, luego

$$sec \alpha = sec45^{\circ}$$

$$\cot \alpha = \cot 45^{\circ}$$

$$L_1 = 4\sqrt{2}sec45^\circ = 8m$$

$$\sqrt{2}$$

Así:

$$L_2 = 3(tan45^\circ) + 9\sqrt{2}(cos45^\circ)$$

$$L_{2} = 3(tan45^{\circ}) + 9\sqrt{2}(cos45^{\circ})$$

$$L_{2} = 3(1) + 9\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 12m$$

Calculamos: Área del terreno = $L_1 \times L_2$

Área del terreno $= 96m^2$



Como parte de un reto, una profesora planteó el siguiente ejercicio en pizarra para sus alumnos

 α es la medida de un ángulo en posición normal cuyo lado final pertenece al

tercer cuadrante y csc
$$\alpha = -\frac{\sqrt{13}}{3}$$
.

Si α y β son coterminales y

$$cotβ = \frac{k-1}{k+2}$$
. Calcule el valor de k .

La respuesta de 4 alumnos fueron las siguientes

> Alejandro: 5

➤ Carlos : 7

➤ Juamar :-8

➤ Micaela :-6

Quien respondió correctamente

RESOLUCIÓN

Como $\alpha \in IIIC$ entonces $\Rightarrow x < 0$; y < 0

$$\csc \alpha = \frac{r}{y} = \frac{\sqrt{13}}{-3}$$
 $r = \sqrt{13}$; $y = -3$

$$r = \sqrt{13}$$
; $y = -3$

Radio vector:
$$x^2 + y^2 = r^2$$



$$x^2 + (-3)^2 = \sqrt{13}^2$$

$$x^2 + 9 = 13$$

$$x^2 = 4$$

$$x=2$$
; $x=-2$

$$x=-2$$
 , $x \in IIIC$

Como α y β son coterminales, luego

$$R. T. (\alpha) = R. T. (\beta)$$

$$\cot \alpha = \cot \beta$$

$$\cot \alpha = \cot \beta = \frac{x}{y}$$

$$\cot \beta = \frac{x}{y} = \frac{2}{3} \times \frac{k-1}{k+2}$$

$$2k + 4 = 3k - 3$$

$$3 + 4 = 3k - 2k$$



Carlos respondió correctamente