

CHEMISTRY Chapter 04





Tabla Periódica Moderna



¿ ... Y en relación a qué se clasifican los elementos químicos?


"... El **Li, Na y K** reaccionan con el agua para producir su respectivo hidróxido e hidrógeno"







... ¿Será el único elemento que reacciona con agua?





El Li, Na y K se encuentran en una misma columna de la tabla periódica.

ANTECEDENTES



... el químico ruso Dimitri Mendeléiev publicó su primera tabla periódica donde ordenó los elementos según su propiedades físicas y químicas, y en especial la valencia en función periódica a sus pesos atómicos.





ELEMENTO	MENDELEIEV
44	Eka-boro: Eb
68	Eka-aluminio: Ea
72	Eka-silicio: Es
100	Eka-manganeso: Em
184 – 195	Divi-manganeso: Dm
208	Eka-teluro: Et


NOMBRE ACTUAL		
Escandio		
Galio		
Germanio		
Tecnecio		
Renio		
Polonio		



... Al éxito de la tabla periódica de **Mendeliev** surgieron dificultades como, ¿Donde iría el argón? ¿Acaso en el lugar de potasio...?



... un joven físico inglés, Henry Moseley. Descubrió una relación entre lo que el llamó número atómico y la frecuencia de los rayos X que se generaban al bombardear un elemento con electrones de alta energía.




... Con esto se enuncia la "ley periódica": Si los elementos se colocan según aumenta su número atómico, se observa una variación periódica en sus propiedades físicas y químicas.

TABLA PERIÓDICA MODERNA



Basándose en la ley periódica y las configuraciones electrónicas, El químico Suizo Alfred Werner diseñó la tabla periódica moderna.








PERIODO

- Son las 7 filas horizontales y están determinados por el mayor nivel de energía de la configuración electrónica del elemento.
- Los elementos de una mismo periodo tienen propiedades diferentes.




PERIODO	N° elementos
1	2
2	8
3	8
4	18
5	18
6	32
7	32

Ej. Cada uno de estos elementos tienen cuatro (4) niveles energéticos.



GRUPO

- Son las columnas de la tabla periódica.
- Tradicionalmente hay ocho grupos A y ocho grupos B.
- Según la IUPAC son 18 grupos.
- Cada grupo contiene elementos con propiedades químicas semejantes.






Grupo A

- Son denominados elementos representativos, están constituidos por metales y no metales.
- Sus electrones externos o de su última capa están ubicados en orbitales s y p.


GRUPO TRADICIONAL (IUPAC)	DENOMINACIÓN	TERMINACIÓN ELECTRÓNICA
I A (1)	Metales Alcalinos (excepto H)	ns¹
II A (2)	Metales alcalinos térreos	ns²
III A (13)	Boroides o térreos	ns² np¹
IV A (14)	Carbonoides	ns² np²
∨ A (15)	Nitrogenoides	ns² np³
VI A (16)	Anfígenos o Calcógenos	ns² np⁴
VII A (17)	Halógenos	ns² np⁵
VIII A (18)	Gases Nobles	ns² np ⁶





Grupo B

 Están constituidos solo por metales y se les denomina elementos de transición.
 Debido a que se consideran como tránsito entre los elementos metálicos de alta reactividad y elementos de menor carácter metálico.



IB (11) Familia del cobre (metales de acuñación) IIB (12) Familia del zinc (metales puente) IIIB (3) Familia del escandio IVB (4) VB (5) VIIB (6) VIIB (7) Familia del manganeso Familia del Fe, Co y Ni (Ferromagnéticos) TERMINACIÓN ELECTRÓNICA TerMINACIÓN TERMINA			
IIB (11) (metales de acuñación) Familia del zinc (metales puente) IIB (3) Familia del escandio IVB (4) Familia del titanio VB (5) Familia del vanadio VIB (6) Familia del cromo VIIB (7) Familia del Fe, Co y Ni (Ferromagnéticos) (metales de acuñación) ns² (n - 1)d¹ ns² (n - 1)d¹ ns² (n - 1)d² ns² (n - 1)d⁵ ns² (n - 1)d⁵ ns² (n - 1)d⁵ ns² (n - 1)d⁵		DENOMINACIÓN	
(metales puente) IIIB (3) Familia del escandio IVB (4) VB (5) Familia del vanadio VIB (6) VIB (7) Familia del manganeso Familia del Fe, Co y Ni (Ferromagnéticos) (metales puente) ns² (n - 1)d¹ ns² (n - 1)d¹ ns² (n - 1)d² ns² (n - 1)d² ns² (n - 1)d³ ns² (n - 1)d⁵ ns² (n - 1)d⁵ ns² (n - 1)d⁵	IB (<mark>11</mark>)		ns¹ (n - 1)d¹º
IVB (4) Familia del titanio VB (5) Familia del vanadio VIB (6) Familia del cromo VIIB (7) Familia del manganeso Familia del Fe, Co y Ni (Ferromagnéticos) (Serromagnéticos) Familia del titanio ns² (n - 1)d² ns² (n - 1)d⁵ ns² (n - 1)d⁵ ns² (n - 1)d⁵ ns² (n - 1)d⁵	IIB (<mark>12</mark>)		ns² (n - 1)d ¹⁰
VB (5) Familia del vanadio $ns^2 (n-1)d^3$ VIB (6) Familia del cromo $ns^1 (n-1)d^5$ VIIB (7) Familia del manganeso $ns^2 (n-1)d^5$ VIIIB (8,9 y 10) Familia del Fe, Co y Ni (Ferromagnéticos) $ns^2 (n-1)d^6$	IIIB (<mark>3</mark>)	Familia del escandio	ns <mark>²</mark> (n - 1)d ¹
VIB (6) Familia del cromo $ns^1 (n-1)d^5$ VIIB (7) Familia del manganeso $ns^2 (n-1)d^5$ VIIIB (8,9 y 10) Familia del Fe, Co y Ni (Ferromagnéticos) $ns^2 (n-1)d^6$	IVB (<mark>4</mark>)	Familia del titanio	ns <mark>²</mark> (n - 1)d <mark>²</mark>
VIIB (7) Familia del manganeso $ns^2 (n-1)d^5$ VIIIB (8,9 y 10) Familia del Fe, Co y Ni (Ferromagnéticos) $ns^2 (n-1)d^6$	VB (<mark>5</mark>)	Familia del vanadio	ns <mark>²</mark> (n - 1)d <mark>³</mark>
VIIIB (8,9 y 10) Familia del Fe, Co y Ni (Ferromagnéticos) ns² (n - 1)d ⁶ ns² (n - 1)d ⁷	VIB (6)	Familia del cromo	ns¹ (n - 1)d ⁵
VIIIB (8,9 y 10) Familia del Fe, Co y Ni (Ferromagnéticos) ns² (n - 1)d7	VIIB (<mark>7</mark>)	Familia del manganeso	ns <mark>²</mark> (n - 1)d ⁵
	VIIIB (<mark>8,9 y 10</mark>)		ns <mark>²</mark> (n - 1)d ⁷

 Sus electrones más externos se ubican en orbitales d o f.




CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS SEGÚN SUS PROPIEDADES

METALES

A temperatura ambiente son sólidos (excepto el Hg que es líquido), maleables y dúctiles.

Son buenos conductores eléctricos y térmicos.

Tienden a perder electrones (se oxidan), presentándose como cationes.





NO METALES

A temperatura ambiente pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos.

Son malos conductores térmicos y eléctricos, excepto el grafito (C) que es un buen conductor eléctrico.

Tienden a ganar electrones (se reducen), presentándose como aniones.



Azufre (S)




SEMIMETALES

Todos son sólidos a temperatura ambiente


Se les utiliza en la fabricación de circuitos electrónicos, como transistores, chis y microchips de computadoras, etc.

De los semimetales, son el germanio (Ge) y el silicio (si) los más utilizados.



División de la tabla periódica en bloques






UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS EN LA T.P.A.



Grupo A Terminación electrónica en "s" o "p"


N° grupo = número de electrones del mayor nivel (electrones de valencia)





Grupo B Terminación electrónica en "d"

e- (s) + e- (d)	Grupo	
8, 9 o 10	VIIIB	
11	IB	
12	IIB	





Periodo: 4 Familia : IIIB

mayor nivel

... si termina en "f" el grupo sería IIIB.



Periodo: 6 Familia : IIIB



En 1913, Henry Moseley haciendo trabajos de investigación determinó que las propiedades de los elementos químicos dependen de _______.

RESOLUCIÓN

Su número atómico (Z)



Con relación a la tabla periódica moderna, escriba verdadero (V) o falso (F) según corresponda

- a. Los elementos químicos con propiedades químicas semejantes se encuentran ordenados en un mismo periodo.
- b. El cuarto periodo contiene 32 elementos.
- c. Los elementos químicos se encuentran ordenados según el número atómico creciente.

RESOLUCIÓN

a. Falso

Se encuentran ordenados en un mismo grupo

b. Falso

El cuarto periodo contiene **18** elementos químicos.

c. Verdadero


En la tabla periódica moderna los elementos se ordenan en función al **número atómico** creciente



Determine el periodo y grupo del elemento con número atómico Z = 19.

RESOLUCIÓN

Realizando la C.E.:



Periodo: 4


Grupo: IA (1)



Si un elemento pertenece al tercer periodo y al grupo VIA, determine el número atómico (Z) del elemento.

RESOLUCIÓN

De los datos se tiene:






¿A qué familia pertenece el elemento con número atómico Z = 33?

RESOLUCIÓN

Realizando la C.E.:




Periodo: 4

Grupo: VA (15)

Nitrogenoides

El grupo de los anfígenos o calcógenos es también llamado familia del oxígeno y es el grupo conocido antiguamente como VIA, y actualmente el grupo 16 (según la IUPAC) en las siguientes elementos: oxígeno (O), azufre (S), selenio (Se), teluro (Te), polonio (Po) y livermorio (Lv). El nombre de anfígeno en español deriva de la propiedad de algunos de sus elementos de formar compuestos con carácter ácido o básico. Aunque todos ellos tienen seis electrones de valencia (última capa s²p⁴), sus propiedades varían de no metálicas a metálicas en cierto grado, conforme aumenta su número atómico. El oxígeno y el azufre se utilizan abiertamente en la industria y el telurio y el selenio en la fabricación de semiconductores. ¿Cuál es el número atómico del anfígeno que pertenece al cuarto periodo?.



$$Z = #e^- = 34$$

En la actualidad, la tabla periódica, se conoce como la tabla periódica larga, y su uso generalizado, en ella los elementos están ordenados en forma creciente de su número atómico, además de regirse por la ley periódica de Moseley. La estructura de la tabla periódica se conforma de filas y columnas. En sentido horizontal se forman siete periodos. En sentido vertical se encuentran agrupados elementos que periódicamente repiten sus propiedades, forman así los grupos o familias. ¿Qué familia presenta la configuración electrónica terminal ... ns² np⁵?

- A) Alcalino
- Halógeno
- C) Boroide
- D) Anfígeno

RESOLUCIÓN

C.E.: ... ns2np5

Grupo: VII A (17) Halógenos