



ALGEBRA

Chapter 21

3th
SECONDARY

**INECUACIONES DE
SEGUNDO GRADO**




 **SACO OLIVEROS**

MOTIVATING STRATEGY

Fue un matemático inglés nacido en la ciudad de Oxford en el año 1560 y falleció el 2 de junio de 1621 en Londres. Fue el creador de notaciones y símbolos que se utilizan en álgebra tales como: $>$ (mayor que) y $<$ (menor que). Además observó los satélites de Júpiter y las manchas solares.

La vida de Thomas Harriot sobresale notablemente en diferentes campos. Viaja a las Américas y realiza un trabajo etnográfico; en la astronomía observa la luna y dibuja mapas de sus descubrimientos; además se convierte en un matemático prolífico y se le atribuye la teoría de la refracción.





INECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO

Una inecuación de segundo grado con una incógnita (*ecuación cuadrática*), es aquella desigualdad condicional que reducida a su más simple expresión tiene la forma:

$$ax^2 + bx + c > 0$$

$$ax^2 + bx + c < 0$$

$$ax^2 + bx + c \geq 0$$

$$ax^2 + bx + c \leq 0$$


, $a \neq 0$

Para su resolución utilizaremos el criterio de los **PUNTOS CRÍTICOS**.

RESOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN CUADRÁTICA


La solución de la inecuación de segundo grado depende del sentido de la desigualdad.

$$(x - a)(x - b) \geq 0$$



$$x \in \langle -\infty; a] \cup [b; +\infty \rangle$$


$$(x - a)(x - b) \leq 0$$



$$x \in [a; b]$$




$$(x - a)(x - b) > 0$$



$$x \in \langle -\infty; a \rangle \cup \langle b; +\infty \rangle$$

$$(x - a)(x - b) < 0$$



$$x \in \langle a; b \rangle$$



REGLA PRÁCTICA:

<i>Puntos críticos abiertos</i>	<i>Puntos críticos cerrados</i>	
$<$	\leq	$-$
$>$	\geq	$+$

PROPIEDAD:

Para que $ax^2 + bx + c > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$

se debe cumplir:

$$a > 0 \quad \wedge \quad \Delta = b^2 - 4ac < 0$$

Problema 1

Resuelva

$$3x^2 + 10x + 1 \geq 3x + 7$$


Resolución:

$$3x^2 + 10x + 1 \geq 3x + 7$$

$$3x^2 + 7x - 6 \geq 0$$

$$\begin{array}{c} 3x^2 + 7x - 6 \geq 0 \\ \begin{array}{ccc} 3x & & -2 \\ & \nearrow & \searrow \\ x & & +3 \end{array} \end{array}$$

$$(3x - 2)(x + 3) \geq 0$$



$$\therefore x \in \langle -\infty; -3] \cup \left[\frac{2}{3}; +\infty \right)$$

Problema 2

Halle el conjunto solución de

$$(x-2)(2x+3) > (x+6)(x+2)$$

Resolución:


$$(x+6)(2x+3) > (x+6)(x+2)$$

$$2x^2 + 3x + 12x + 18 > x^2 + 8x + 12$$

$$x^2 + 7x + 6 > 0$$

$$\begin{array}{c} x \quad \quad \quad +6 \\ x \quad \quad \quad +1 \end{array}$$

$$(x+6)(x+1) > 0$$



$$\therefore x \in \langle -\infty; -6 \rangle \cup \langle -1; +\infty \rangle$$

Problema 3

Determine el conjunto solución de la inecuación

$$(3x - 2)^2 \geq (2x - 3)^2$$

Resolución:

$$(3x - 2)^2 \geq (2x - 3)^2$$


$$9x^2 - 12x + 4 \geq 4x^2 - 12x + 9$$

$$5x^2 - 5 \geq 0$$

$$5(x^2 - 1) \geq 0$$

$$x^2 - 1 \geq 0$$

$$(x + 1)(x - 1) \geq 0$$



$$\therefore x \in \langle -\infty; -1] \cup [1; +\infty \rangle$$

Problema 4

Resuelva

$$x^2 \leq 10x$$


sabiendo que la suma de los valores enteros de x representa la edad del profesor Victor. Si dentro de 25 años se jubilará el profesor, ¿a los cuántos años se jubilará?

Resolución:

$$x^2 \leq 10x$$

$$x^2 - 10x \leq 0$$

$$x(x - 10) \leq 0$$



$$x \in [0; 10]$$

Edad del profesor Victor:

$$0 + 1 + 2 + \dots + 8 + 9 + 10 = \frac{10 \times 11}{2} = 55 \text{ años}$$

∴ El profesor Victor se jubilará a los 80 años.

Problema 5

Halle el conjunto solución de la inecuación

$$\frac{x^2 - 8}{4} + \frac{x(x + 2)}{2} \leq 3$$

Resolución:

$$4 \left(\frac{x^2 - 8}{4} \right) + 4 \left(\frac{x(x + 2)}{2} \right) \leq 4(3) \quad \text{mcm}(4, 2) = 4$$


$$(x^2 - 8) + 2x(x + 2) \leq 12$$

$$x^2 - 8 + 2x^2 + 4x \leq 12$$

$$3x^2 + 4x - 20 \leq 0$$

$$\begin{array}{ccc} 3x & & +10 \\ & \nearrow & \searrow \\ x & & -2 \end{array}$$

$$(3x + 10)(x - 2) \leq 0$$



$$\therefore x \in \left[-\frac{10}{3}; 2 \right]$$

Problema 6

Mateo desea comprar un automóvil, por tal motivo pide un préstamo al banco de crédito, si se sabe que el menor valor entero de m que verifica a:

$$2x^2 - 12x - 7 > -m, \forall x \in \mathbb{R}$$

Representa la cantidad de meses de pago, además la cuota mensual a pagar es de s/ 1753 ¿Cuál fue el precio del automóvil?

RECUERDA:

Para que $ax^2 + bx + c > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ se debe cumplir:

$$\wedge \Delta = b^2 - 4ac < 0$$

Resolución:

$$2x^2 - 12x - 7 > -m, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$2x^2 - 12x + (m - 7) > 0$$

positivo

Calculando el discriminante: $\Delta = b^2 - 4ac < 0$

$$\Delta = (-12)^2 - 4(2)(m - 7) < 0$$

$$144 - 8m + 56 < 0$$

$$200 < 8m$$

$$25 < m \Rightarrow m > 25$$

$$\therefore 26 \times 1753 = 45,578 \text{ soles}$$

Problema 7

Los alumnos del tercer grado de la sede San Luis pertenecientes al colegio saco oliveros se presentan a un concurso de danza, al culminar las presentaciones se procede a la premiación, si el mínimo valor entero de b que verifica a:
 $x^2 - 4x + 2b > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ resulta ser el puesto obtenido por la sede San Luis, ¿Qué tipo de medalla obtuvieron al final de la premiación?

RECUERDA:

Para que $ax^2 + bx + c > 0, \forall x \in \mathbb{R}$
se debe cumplir:
 $\wedge \Delta = b^2 - 4ac < 0$

Resolución:



$$1x^2 - 4x + 2b > 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$\xrightarrow{\text{positivo}}$

Calculando el discriminante: $\Delta = b^2 - 4ac < 0$

$$\Delta = (-4)^2 - 4(1)(2b) < 0$$

$$16 - 8b < 0$$

$$16 < 8b$$

$$2 < b \Rightarrow b > 2 \quad b_{\text{mín}} = 3$$

\therefore Obtuvieron medalla de bronce