
ARITHMETIC Chapter 10

1st SECONDARY Session I

Sustracción





MOTIVATING STRATEGY







SUSTRACCIÓN

Es la operación inversa a la adición, dados dos números enteros llamados minuendo (M) y sustraendo (S), nos permite encontrar un tercer número llamado diferencia (D).

Ejm

$$65 - 38 = 27$$

$$M - S = D$$

En otras bases

Orden 1
$$(8+2)-6=$$

Orden 2
$$(8+5)-7=$$

Orden 3
$$4 - 3 =$$

HELICO THEORY



Propiedades

Suma de los términos

Ejm 1

> En la siguiente sustracción

$$65 - 28 = 37$$

> Si sumamos los términos

$$65 + 28 + 37 = 130 = 2(65)$$

➤ En general:

$$M + S + D = 2M$$

Resta notable

Ejm 2

En base 10
$$762$$
 — En base $7634_{(7)}$ — 267 — $436_{(7)}$ — 495 — $165_{(7)}$

$$4+5=9=10-1 \land 1+5=6=7-1$$

En general:

$$\overline{abc}_{(n)} - \overline{cba}_{(n)} = \overline{xyz}_{(n)}$$

$$x + z = y = n - 1$$





Calcule la diferencia entre el menor número de cuatro cifras impares diferentes y el mayor número par de tres cifras diferentes.

Resolución:

menor número de cuatro cifras impares:

mayor número par de tres cifras diferentes:

1357

986

371

RPTA: 371







En una sustracción el minuendo aumenta en 30 y el sustraendo disminuye en 20 y la nueva diferencia es 110. Calcule la diferencia inicial.

Resolución

$$M - S = D$$

$$(M + 30) - (S - 20) = 110$$

 $M + 30 - S + 20 = 110$
 $M - S + 50 = 110$
 $D + 50 = 110$
 $\therefore D = 60$







La suma de los tres términos de una sustracción es 386. Calcula el minuendo.

Resolución

Se tiene que: M + S + D = 386

2M = 386

M = 193

Luego:

$$M + S + D = 2M$$

RPTA:

193





Al sumar los tres términos de una sustracción se obtuvo 620. Si el sustraendo es el cuádruple de la diferencia, calcule el valor de la diferencia.

Resolución

$$M + S + D = 2M$$

$$620 = 2M$$

$$M = 310$$

Dato:
$$S = 4D$$

Sabemos que:

$$\mathbf{M} - \mathbf{S} = \mathbf{D}$$
$$\mathbf{M} = \mathbf{S} + \mathbf{D}$$

Reemplazamos:

$$M = 4D + D$$
$$310 = 5D$$
$$D = 62$$





Si se cumple la siguiente igualdad $abc - cba = \overline{xy3}$, calcule el valor de xy.

Resolución

Se tiene que :

$$\overline{abc} - \overline{cba} = \overline{xy3}$$

Ordenando:

$$\overline{abc}$$
 –



cha

$$\overline{xy3}$$

$$\rightarrow$$
 y = 9

$$\rightarrow$$
 x + 3 = 9

$$x = 6$$

$$\therefore x.y = 54$$

En general se cumple

$$\frac{\overline{abc}}{\overline{cba}}$$
-
$$\overline{xyz}$$

$$\mathbf{x+z=9}$$





Isabella es cantante de música pop y en una de sus presentaciones en concierto donde asistieron $3527_{(8)}$ personas, por una falla en el fluido eléctrico muchos de los asistentes decidieron retirarse, luego de haberse retirado $1354_{(8)}$ se observa que aún continúan esperando $\overline{abcd}_{(8)}$ asistentes. Halle (a+b)(c+d).

Resolución

Personas asistentes:

. •

Personas esperando:

 $3527_{(8)}$

Personas que se retiran: $1354_{(8)}$

 $\overline{a\ b\ c\ d}_{(8)}$

* * * *

2153

Piden: (a + b) . (c + d)

 $(2+1) \cdot (5+3)$

 $(3) \cdot (8) = 24$


RPTA: 24




André es un escalador con más de 10 años de experiencia que decidió ir al Parque Nacional Joshua Tree de California para escalar las pendientes rocosas que hay allí, si ya lleva ascendiendo \overline{abc} m y le falta solo \overline{cba} m para llegar a la cima que está a 1151 m, debido a una mala pisada cae y desciende \overline{cba} m estando ahora a $\overline{2xy}$ m del punto de partida. Calcule la altura de cimple \overline{cba} or \overline{cba} m

Resolución







RPTA: 724