




TRIGONOMETRY

Chapter 5

2nd
SECONDARY



RAZONES TRIGONOMÉTRICAS
DE ÁNGULOS AGUDOS II

 **SACO OLIVEROS**



MOTIVATING STRATEGY

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS EN EL TRIÁNGULO RECTÁNGULO

Prof. Abel Esteban Ortega Luna


<http://matematicaabelortega.blogspot.com/>

HELICO THEORY


RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS AGUDOS II

I) Para el estudio de las razones trigonométricas es necesario establecer correctamente la posición relativa de los catetos.

Con respecto al $\angle \alpha$




Con respecto al $\angle \beta$





II) Es el cociente que se establece entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo con respecto a un ángulo agudo.



Con respecto al $\angle \alpha$

$$\cot \alpha = \frac{\text{cateto adyacente al } \angle \alpha}{\text{cateto opuesto al } \angle \alpha}$$

$$\sec \alpha = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cateto adyacente al } \angle \alpha}$$


$$\csc \alpha = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cateto opuesto al } \angle \alpha}$$

$$H^2 = CO^2 + CA^2$$



HELICOPRACTICE 1

Del gráfico, efectúe $E = \sec\theta - 1$



RECORDAR



$$\sec\theta = \frac{H}{CA}$$

Resolución:



No es necesario calcular el cateto opuesto.

Calculamos:

$$E = \sec\theta - 1$$

$$E = \frac{41}{40} - \frac{1}{1}$$

$$E = \frac{41 - 40}{40}$$


$$\therefore E = \frac{1}{40}$$





HELICOPRACTICE 2

De la figura, efectúe $L = \csc^2 \theta + \cot^2 \theta$



RECORDAR



$$H^2 = CO^2 + CA^2$$

$$\csc \theta = \frac{H}{CO}$$

$$\cot \theta = \frac{CA}{CO}$$

Resolución:

$$H^2 = 4^2 + 5^2$$

$$H = \sqrt{16 + 25} \Rightarrow H = \sqrt{41}$$

Calculamos:

$$L = \csc^2 \theta + \cot^2 \theta$$

$$L = \left(\frac{\sqrt{41}}{4} \right)^2 + \left(\frac{5}{4} \right)^2$$

$$L = \frac{41}{16} + \frac{25}{16}$$

$$L = \frac{66}{16}$$

$$\therefore L = \frac{33}{8}$$



HELICOPRACTICE 3

Si $3\csc\alpha - 7 = 0$, donde α es un ángulo agudo, efectúe $T = \cot^2\alpha - 1$

Resolución:

Del dato:

$$3\csc\alpha - 7 = 0$$


$$3\csc\alpha = 7 \Rightarrow \csc\alpha = \frac{7}{3} = \frac{H}{CO}$$

RECORDAR



$$H^2 = CO^2 + CA^2$$

$$\cot\alpha = \frac{CA}{CO}$$



Teorema de Pitágoras:

$$7^2 = 3^2 + CA^2$$

$$49 = 9 + CA^2$$

$$CA^2 = 40$$

$$CA = \sqrt{40}$$

Calculamos:

$$T = \cot^2\alpha - 1$$

$$T = \left(\frac{\sqrt{40}}{3}\right)^2 - 1$$

$$T = \frac{40}{9} - \frac{1}{1}$$

$$T = \frac{40 - 9}{9}$$

$$\therefore T = \frac{31}{9}$$







HELICOPRACTICE 4

Dado $\sec\alpha = 2$, siendo α un ángulo agudo, efectúe $M = \csc\alpha \cdot \tan\alpha$

Resolución:

Del dato:

$$\sec\alpha = \frac{2}{1} = \frac{H}{CA}$$



$$CO = \sqrt{3}$$

RECORDA



$$H^2 = CO^2 + CA^2$$

$$\csc\alpha = \frac{H}{CO}$$

$$\tan\alpha = \frac{CO}{CA}$$

Teorema de Pitágoras:

$$2^2 = CO^2 + 1^2$$

$$4 = CO^2 + 1$$

$$CO^2 = 3 \Rightarrow CO = \sqrt{3}$$

Calculamos:

$$M = \csc\alpha \cdot \tan\alpha$$

$$M = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{1}\right)$$


$$\therefore M = 2$$





HELICOPRACTICE 5

Del gráfico, calcule el valor de x si $\cot\theta = \frac{5}{3}$



RECORDAR



$$\cot\theta = \frac{CA}{CO}$$

Resolución:

Del dato: $\cot\theta = \frac{5}{3} \dots\dots(1)$

Del gráfico, se observa

$$\cot\theta = \frac{4x + 3}{3x} \dots\dots(2)$$

Igualando (1) y (2)


$$\frac{5}{3} = \frac{4x + 3}{3x}$$

$$15x = 12x + 9$$

$$15x - 12x = 9$$


$$3x = 9$$

$$\therefore x = 3$$



HELICOPRACTICE 6

Un pájaro que se encuentra a 24m de altura observa un insecto y se dirige hacia él, tal como se muestra en la figura. Determine la distancia “d” entre el insecto y dicha ave. Considere $\sec\beta = \frac{13}{12}$



Resolución:

Del dato:

$$\sec\beta = \frac{13}{12} \dots\dots(1)$$

Del gráfico, se observa

$$\sec\beta = \frac{d}{24} \dots\dots(2)$$

Igualando (1) y (2)

$$\frac{13}{12} = \frac{d}{24} \Rightarrow d = \frac{13 \times \cancel{24}^2}{\cancel{12}_1}$$

$$\therefore d = 26m$$





HELICOPRACTICE 7

Un constructor metálico ha diseñado una plancha en forma triangular tal como se muestra en la figura. Si la hipotenusa mide 75 cm y $\cot A = \frac{4}{3}$. Determine el perímetro de la plancha diseñada en centímetros.

Resolución:

Del enunciado:

$$\cot A = \frac{4k}{3k} = \frac{CA}{CO} \Rightarrow \text{Diagrama de un triángulo rectángulo ABC con hipotenusa AB = 75 cm, cateto AC = 60 cm, y cateto BC = 45 cm. El ángulo A está en el vértice A.$$

RECORDAR



$$H^2 = CO^2 + CA^2$$

Teorema de Pitágoras:

$$(H)^2 = (3k)^2 + (4k)^2$$

$$(H)^2 = 9k^2 + 16k^2$$

$$(H)^2 = 25k^2$$

$$\Rightarrow H = 5k$$

Del dato:

$$H = 75 \text{ cm}$$

$$5k = 75 \text{ cm}$$

$$k = 15 \text{ cm}$$

Calculamos el perímetro del triángulo rectángulo:

$$2p = 45 \text{ cm} + 60 \text{ cm} + 75 \text{ cm}$$

$$\therefore 2p = 180 \text{ cm}$$

