



ALGEBRA

Chapter 11

5th of
SECONDARY

ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO



 **SACO OLIVEROS**

HELICOMOTIVATION

Helicomotivación



Algunas aplicaciones

- En el campo de la economía se usan las ecuaciones cuadráticas para representar modelos económicos de oferta y demanda
- En el campo de la física para determinar el movimiento parabólico.
- En el ámbito militar lo utilizan en la artillería de cañones para hallar las trayectorias de las balas

HELICO THEORY

ECUACIÓN CUADRÁTICA

Forma general :

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Donde:

✓ x es la incógnita o variable

✓ $a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$

Resolución de la ecuación :

1.- Por factorización:

- Resolver la ecuación :

$$x^2 - x - 6 = 0$$

$$\begin{aligned}(x - 3)(x + 2) &= 0 \\ = 0 & \quad = 0\end{aligned}$$

$$x = 3 \vee x = -2$$

$$\therefore C.S. = \{-2; 3\}$$



2.- Por la fórmula de Carnot

Siendo las raíces : $x_1 \wedge x_2$

$$x_{1;2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- Resolver la ecuación $\overset{a}{2}x^2 - \overset{b}{3}x - \overset{c}{4} = 0$

$$x_{1;2} = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4(2)(-4)}}{2(2)}$$

$$x_{1;2} = \frac{3 \pm \sqrt{41}}{4}$$

$$\therefore C.S. = \left\{ \frac{3 + \sqrt{41}}{4}; \frac{3 - \sqrt{41}}{4} \right\}$$

DISCRIMINANTE

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Ejemplo:

***Halle el discriminante de:**

$$x^2 - 4x + 2 = 0$$

$$a = 1 \quad b = -4 \quad c = 2$$

$$\Delta = (-4)^2 - 4(1)(2)$$

$$\Delta = 8$$

NATURALEZA DE LAS RAÍCES

- CASO I : La ecuación tiene raíces reales y diferentes si:

$$\Delta > 0$$

- CASO II : La ecuación tiene raíces reales e iguales si:

$$\Delta = 0$$

- CASO III : La ecuación tiene raíces complejas y conjugadas si:

$$\Delta < 0$$

PROPIEDAD DE LAS RAÍCES

“ x_1 ” y “ x_2 ” raíces de la ecuación

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad , a \neq 0$$

1.- Suma de Raíces

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

2.- Producto de Raíces

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

3.- Suma de Inversas

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = -\frac{b}{c}$$

FORMACIÓN DE UNA ECUACIÓN CUADRÁTICA EN x



Siendo : “ x_1 ” y “ x_2 ” las raíces de la ecuación cuadrática

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + (x_1x_2) = 0$$

Ejemplo:

Forme la ecuación cuadrática cuyas raíces sean 7 y 3

$$x^2 - (7 + 3)x + (7)(3) = 0$$

$$x^2 - 10x + 21 = 0$$

PROPIEDADES PARTICULARES



Sea $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$

1.- Raíces asimétricas u opuestas

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = 0$$

$$b = 0$$

2.- Raíces reciprocas

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = 1$$

$$a = c$$

HELICO PRACTICE

PROBLEMA 1



Resolver:

$$(3x - 1)(x + 2) + x = 22$$

Resolución

POR DISTRIBUTIVA

$$3x^2 + 6x - x - 2 + x = 22$$

$$3x^2 + 6x - 24 = 0$$

$$(\div 3) \quad x^2 + 2x - 8 = 0$$

$$\begin{array}{ccc} x & & +4 \\ x & & -2 \end{array}$$

$$(x + 4)(x - 2) = 0$$

$$x + 4 = 0 \quad \vee \quad x - 2 = 0$$

$$x_1 = -4 \quad \vee \quad x_2 = 2$$

$$CS = \{ -4; 2 \}$$

PROBLEMA 2



Si x_1 y x_2 son las raíces de la ecuación:

$$2x^2 - (7n - 8)x + n + 4 = 0$$

Halle el valor de n^3 si se cumple: $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = 3$

Resolución

$$2x^2 - (7n - 8)x + (n + 4) = 0$$

$$a = 2$$

$$b = -(7n - 8)$$

$$c = n + 4$$

Por dato $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = 3$


Por Propiedad $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{-b}{c}$

$$\frac{-b}{c} = 3$$

$$\frac{-(- (7n - 8))}{n + 4} = 3$$

$$7n - 8 = 3(n + 4)$$

$$n = 5$$



$$n^3 = 125$$

PROBLEMA 3



Si la ecuación en x :

$$3kx^2 + 7x = x^2 + 2k - 1$$

Posee raíces recíprocas, indique el valor que adopta k

Resolución

Dando forma a la ecuación cuadrática:

$$3kx^2 - x^2 + 7x - 2k + 1 = 0$$

$$(3k - 1)x^2 + 7x + (-2k + 1) = 0$$

Dato: La ecuación posee raíces recíprocas

$$a = c$$

$$\Rightarrow 3k - 1 = -2k + 1$$

$$5k = 2$$

$$k = 2/5$$

$$k = 2/5$$

PROBLEMA 4



Forme la ecuación de segundo grado si sus raíces son:

$$7 + 2\sqrt{3} \quad y \quad 7 - 2\sqrt{3}$$

Resolución

Formación:

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 = 0$$

Sea: $x_1 = 7 + 2\sqrt{3}$

$$x_2 = 7 - 2\sqrt{3}$$

→ $x_1 + x_2 = 7 + 2\sqrt{3} + 7 - 2\sqrt{3}$

$$x_1 + x_2 = 14$$

→ $x_1 \cdot x_2 = (7 + 2\sqrt{3})(7 - 2\sqrt{3}) = 7^2 - (2\sqrt{3})^2$

$$x_1 \cdot x_2 = 37$$

Reemplazando:

$$x^2 - 14x + 37 = 0$$

PROBLEMA 5



Obtenga el valor de n si la ecuación:

$$(n + 4)x^2 - (2n + 2)x + n - 1 = 0$$

Tiene raíces iguales

Resolución

$$(n + 4)x^2 - (2n + 2)x + n - 1 = 0$$

$$a = n + 4$$

$$b = -2(n + 1)$$

$$c = n - 1$$

RAICES IGUALES $\Delta = 0$

$$b^2 - 4ac = 0$$

➡ $b^2 = 4ac$

$$(-2(n + 1))^2 = 4(n + 4)(n - 1)$$

$$\cancel{4}(n^2 + 2n + 1) = \cancel{4}(n^2 + 3n - 4)$$

$$2n + 1 = 3n - 4$$



\therefore

$$n = 5$$

PROBLEMA 6

En el 2003 la edad de la prof. Nelia era $4T$; si x_1 y x_2 son las raíces de: $x^2 - 5x + 7 = 0$. Además: $T = \frac{x_1^3 + x_2^3}{x_1^2 + x_2^2 - 6}$ ¿Cuántos años tiene Nelia?

Resolución

$$\underbrace{(x_1 + x_2)}_5^2 = x_1^2 + x_2^2 + 2\underbrace{x_1 x_2}_7$$

$$25 = x_1^2 + x_2^2 + 14$$

$$11 = x_1^2 + x_2^2$$

$$\underbrace{(x_1 + x_2)}_5^3 = x_1^3 + x_2^3 + 3\underbrace{x_1 x_2}_7 \underbrace{(x_1 + x_2)}_5$$

$$125 = x_1^3 + x_2^3 + 105$$

$$20 = x_1^3 + x_2^3$$

Reemplazando en T

$$T = \frac{20}{11 - 6} = 4$$

EN 2003	EN 2023
16	36

∴

36 años



PROBLEMA 7



Una caja de base cuadrada y sin tapa ha de construirse de una pieza cuadrada de hojalata al cortar un cuadrado de 3 metros de cada esquina y doblar los lados. Si la caja tiene un volumen de 48 m^3 , determine la medida del lado de la pieza de hojalata antes de cortar.

Resolución

Lado del cuadrado: " x "



$$\text{Dato: } Vol = 48$$

$$(x - 6)(x - 6)\cancel{3} = \cancel{4}8$$

$$(x - 6)^2 = 16$$

$$x - 6 = 4$$

$$x = 10$$