



TRIGONOMETRY

TOMO 3 y 4

5th
SECONDARY

ADVISORY



 **SACO OLIVEROS**



1. Si $\text{sen}\theta = -9/41$, además $\theta \in \langle 270^\circ; 360^\circ \rangle$, halle el valor de $M = \text{csc}\theta + \cot\theta$


RESOLUCIÓN

- Como $\theta \in \langle 270^\circ; 360^\circ \rangle$

$\theta \in \text{IVC} \Rightarrow x(+), y(-), r(+)$

- Además:

$$\text{sen}\theta = \frac{-9}{41} = \frac{y}{r}$$



Luego: $y = -9$ y $r = 41$

Sabemos: $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

$$41 = \sqrt{x^2 + (-9)^2} \Rightarrow x = 40$$

Piden: $M = \text{csc}\theta + \cot\theta$

$$M = \frac{41}{-9} + \frac{40}{-9}$$

$$M = -9$$



2. Si $\beta \in \text{IIIC}$, además $\tan(270^\circ - \beta) = 0,75$
 Reduzca: $E = \csc(270^\circ - \beta) + \tan(180^\circ + \beta)$

RESOLUCIÓN

$$E = \underbrace{\csc(\overbrace{270^\circ - \beta}^{\text{IIIC}})}_{-\sec\beta} + \underbrace{\tan(\overbrace{180^\circ + \beta}^{\text{IIIC}})}_{\tan\beta}$$

$$T = -\sec\beta + \tan\beta \dots (*)$$

Del dato:

$$\tan(\overbrace{270^\circ - \beta}^{\text{IIIC}}) = 0,75$$

$$\cot\beta = \frac{3}{4}$$

$$\cot\beta = \frac{-3}{-4} = \frac{x}{y}$$

Por radio vector:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$r = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} \quad r = 5$$

Reemplazando en (*):

$$T = -\frac{r}{x} + \frac{y}{x}$$

$$T = -\frac{5}{-3} + \frac{-4}{-3} = \frac{-5-4}{-3}$$

$$T = \frac{-9}{-3}$$

$$\therefore T = 3$$



3. Se cumple que $\tan(11\pi + x) = 3$

Efectúe: $K = \cos\left(\frac{15\pi}{2} - x\right) \cdot \sec(26\pi - x)$

si x es un ángulo agudo.

RESOLUCIÓN

$$K = \cos\left(\overset{\text{PAR}}{15\frac{\pi}{2} - x}\right) \cdot \sec(26\pi - x)$$

$$K = \underbrace{\cos\left(\overset{\text{IIC}}{3\frac{\pi}{2} - x}\right)}_{-\text{sen}x} \cdot \underbrace{\sec(2\pi - x)}_{\sec x}$$

$$K = -\text{sen}x \cdot \sec x \dots (*)$$

Del dato:




IMPAR

$$\tan(11\pi + x) = 3$$

$$\underbrace{\tan(\overset{\text{IIC}}{\pi + x})}_{\tan x} = 3$$

$$\tan x = 3$$

$$\tan x = \frac{3}{1}$$



Reemplazamos en (*):

$$K = -\text{sen}x \cdot \sec x$$


$$K = -\frac{3}{\sqrt{10}} \cdot \frac{\sqrt{10}}{1}$$

$$\therefore K = -3$$




4. En la circunferencia trigonométrica mostrada. Halle el área de la región triangular AMN.

RESOLUCIÓN



Calculamos el área S :



Entonces:

$$S = \frac{\sqrt{2} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right)}{2}$$



5. Si se cumple que: $\text{sen}x - \text{cos}x = a$ y $\text{sen}x \cdot \text{cos}x = b$ determine una relación entre m y n independiente de x.

RESOLUCIÓN

$$\text{sen}x - \text{cos}x = a$$

$$(\text{sen}x - \text{cos}x)^2 = a^2$$

$$\text{sen}^2x - 2\text{sen}x\text{cos}x + \text{cos}^2x = a^2$$

$$\text{sen}^2x + \text{cos}^2x - 2\text{sen}x\text{cos}x = a^2$$

$$1 - \underbrace{2\text{sen}x\text{cos}x}_{b} = a^2$$

$$\therefore 1 - 2b = a^2$$





6. Si se cumple que $\text{sen}x + \text{cos}x = \frac{2}{3}$, calcule
 $E = (1 - \text{sen}x)(1 - \text{cos}x)$

RESOLUCIÓN

$$E = (1 - \text{sen}x)(1 - \text{cos}x)$$

$$2E = 2 \underbrace{(1 - \text{sen}x)(1 - \text{cos}x)}$$

$$2E = (1 - \text{sen}x - \text{cos}x)^2$$

$$2E = \left(1 - \underbrace{(\text{sen}x + \text{cos}x)}_{\frac{2}{3}}\right)^2$$

$$2E = \left(1 - \frac{2}{3}\right)^2$$

$$2E = \left(\frac{1}{3}\right)^2$$

$$\therefore E = \frac{1}{18}$$





7. Calcule el valor de:

$$E = \frac{\csc 2730^\circ}{\operatorname{sen} 4005^\circ}$$

RESOLUCIÓN

$$\begin{array}{r} 2730^\circ \\ 2520^\circ \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 360^\circ \\ 7 \end{array}$$

210°

$$\begin{array}{r} 4005^\circ \\ 3960^\circ \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 360^\circ \\ 11 \end{array}$$

45°

$$E = \frac{\csc 210^\circ}{\operatorname{sen} 45^\circ}$$

IIC

$$E = \frac{\csc(180^\circ + 30^\circ)}{\operatorname{sen} 45^\circ}$$

$$E = \frac{-\csc 30^\circ}{\operatorname{sen} 45^\circ}$$

$$E = \frac{-2}{\frac{1}{\sqrt{2}}}$$

$$E = \frac{-2}{\frac{1}{\sqrt{2}}}$$


$$\therefore E = -2\sqrt{2}$$





8. De la circunferencia trigonométrica mostrada, determine el área de la región triangular sombreada AOP.

RESOLUCIÓN



Calculamos el área S:

$$S = \frac{1 * \text{sen}\theta}{2} \quad \theta = \frac{5(180^\circ)}{6} = 150^\circ$$

$$S = \frac{1 * \text{sen}150^\circ}{2}$$

$$S = \frac{1 * \text{sen}(\overbrace{180^\circ - 30^\circ}^{\text{IIC}})}{2}$$

$$S = \frac{1 * \text{sen}30^\circ}{2}$$

$$S = \frac{1 \left(\frac{1}{2} \right)}{2}$$

$$\therefore S = \frac{1}{4}$$





9. Si: $\tan^2 \alpha = 2\tan^2 x + 1$, halle el valor de $y = \cos^2 \alpha + \sin^2 x$, en términos de α

RESOLUCIÓN

$$\tan^2 \alpha = 2\tan^2 x + 1$$

$$\underbrace{1 + \tan^2 \alpha}_{\sec^2 \alpha} = 2\tan^2 x + 1 + 1$$

$$\sec^2 \alpha = 2\tan^2 x + 2$$

$$\sec^2 \alpha = 2(\underbrace{\tan^2 x + 1}_{\sec^2 x})$$

$$\sec^2 \alpha = 2\sec^2 x$$

$$\frac{1}{\cos^2 \alpha} = \frac{2}{\cos^2 x}$$

$$\cos^2 x = 2\cos^2 \alpha$$

$$1 - \sin^2 x = \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha$$

$$\underbrace{1 - \cos^2 \alpha}_{\sin^2 \alpha} = \cos^2 \alpha + \sin^2 x$$

$$\therefore \cos^2 \alpha + \sin^2 x = \sin^2 \alpha$$





10. Si se cumple que $\sec x \csc x = 3$, calcule: $F = \tan^3 x + \cot^3 x$

RESOLUCIÓN

$$\sec x \csc x = 3$$

$$\tan x + \cot x = 3$$

$$(\tan x + \cot x)^2 = 3^2$$

$$\underbrace{\tan^2 x + \cot^2 x}_7 + \underbrace{2\tan x \cot x}_1 = 9$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 + b^2 - ab)$$

$$F = \tan^3 x + \cot^3 x$$

$$F = \underbrace{(\tan x + \cot x)}_3 \underbrace{(\tan^2 x + \cot^2 x - \tan x \cot x)}_{7-1}$$

$$\therefore F = 18$$

