



ALGEBRA

CHAPTER 5

5th
OF
SECONDARY

COCIENTES NOTABLES



 **SACO OLIVEROS**



MOTIVATING STRATEGY

 **SACO OLIVEROS**¹



Michael Francis Atiyah

Matemático del siglo XX

La Matemática no solo se desarrollo en el pasado, también se sigue desarrollando en la actualidad, siendo uno de esos autores:

Michael Francis Atiyah es un matemático británico nacido en 1929 que pasa por ser unos de los matemáticos más importantes del siglo XX y de lo que llevamos del XXI. Sus contribuciones se centran principalmente en Geometría y Topología, siendo las más importantes la creación, de la denominada en Topología **teoría K** y muy relacionado con el número de soluciones independientes en ecuaciones diferenciales.



HELICO THEOR Y



COCIENTES NOTABLES

I) Definición

Son aquellos cocientes que se pueden obtener en formas directas sin la necesidad de efectuar la operación de división.

Forma general

$$\frac{x^n \pm y^n}{x \pm y}$$

n: Número de términos
del C.N.

Además: $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$



$$\frac{x^n - y^n}{x - y}$$

$$\frac{x^n - y^n}{x + y}$$

$$\frac{x^n + y^n}{x + y}$$

$$\frac{x^n + y^n}{x - y}$$



II) CASOS DE COCIENTES NOTABLES (Si la división es exacta)

$$\frac{x^n - y^n}{x - y} = x^{n-1} + x^{n-2} \cdot y + x^{n-3} \cdot y^2 + \dots + y^{n-1}$$

Para todo “n”
entero positivo

$$\frac{x^n - y^n}{x + y} = x^{n-1} - x^{n-2} \cdot y + x^{n-3} \cdot y^2 - \dots - y^{n-1}$$

Para todo “n”
PAR

$$\frac{x^n + y^n}{x + y} = x^{n-1} - x^{n-2} \cdot y + x^{n-3} \cdot y^2 - \dots + y^{n-1}$$

Para todo “n”
IMPAR



III) PROPIEDAD

$$\text{Sea: } \frac{x^a \pm y^b}{x^p \pm y^q}$$

Genera cociente notable si:

$$\frac{a}{p} = \frac{b}{q} = n \text{ (\# términos del C.N)}$$

IV) TÉRMINO DE LUGAR k : (t_k)

CASO 1: $\frac{x^a - y^b}{x^p - y^q}$



$$t_k = +(x^p)^{n-k} \cdot (y^q)^{k-1}$$

$$K = 1, 2, 3, \dots, n$$

Término de lugar k o posición k

**CASO 2 :**

$$\frac{x^a - y^b}{x^p + y^q}$$

CASO 3 :

$$\frac{x^a + y^b}{x^p + y^q}$$

Cálculo del Término Central (Tc)

Sea: $\frac{x^n \pm y^n}{x \pm y}$

Si n es impar  Lugar(Tc) = K = $\frac{n+1}{2}$

$$T_c = T_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}$$

Para ambos casos:

$$t_k = (\textit{signo})(x^p)^{n-k} \cdot (y^q)^{k-1}$$

+ si **k** es **IMPAR**

- si **k** es **PAR**



HELICO PRACTIC E



PROBLEMA 1 Indique el número de términos en el cociente notable: $\frac{x^{10n+4} - y^{13n+7}}{x^3 - y^4}$

Resolución

El nº de términos = $\frac{10n + 4}{3} = \frac{13n + 7}{4} \dots \dots \alpha$

$4(10n + 4) = 3(13n + 7)$

$40n + 16 = 39n + 21$

$n = 5$

Reemplazando: $n = 5$ en α ,

$n^\circ \text{términos} = \frac{10(5) + 4}{3}$

$n^\circ \text{términos} = 18$

$\therefore n^\circ \text{términos} = 18$



PROBLEMA 2 Indique el grado absoluto del término de lugar 18 en el cociente notable:

$$\frac{x^{40} - y^{200}}{x^2 + y^{10}}$$

Resolución

$$n = \frac{40}{2} \Rightarrow \boxed{n = 20}$$

$$t_{18} = ? \Rightarrow \boxed{k = 18}$$

Estamos en el **2^{do} caso** de C.N

$$\Rightarrow t_{18} = (\textit{signo})(x^2)^{n-k}(y^{10})^{k-1}$$

Como k es **PAR**

$$\Rightarrow \boxed{\textit{signo es -}}$$

$$\Rightarrow t_{18} = -(x^2)^{20-18}(y^{10})^{18-1}$$

$$\Rightarrow t_{18} = -x^4 y^{170}$$

Piden: G.A

$$\therefore G.A = 174$$



PROBLEMA 3 ¿Qué lugar ocupa en el desarrollo del cociente notable: $\frac{x^{160}-y^{280}}{x^4-y^7}$ el término de grado absoluto 252 ?

Resolución

$$n = \frac{160}{4} \Rightarrow \boxed{n = 40}$$

$$\Rightarrow t_k = (\textit{signo})(x^4)^{n-k}(y^7)^{k-1}$$

Estamos en el **1^{er} caso** de C.N

El **signo** siempre es +, así k sea **PAR** o **IMPAR**

$$\Rightarrow t_k = (x^4)^{40-k}(y^7)^{k-1}$$

$$\Rightarrow t_k = (x)^{160-4k}(y)^{7k-7}$$

$$\Rightarrow 160 - 4k + 7k - 7 = 252 \text{ (Dato)}$$

$$\Rightarrow 3k = 99$$

$$\Rightarrow k = 33$$

\therefore Ocupa el lugar 33



PROBLEMA 4 Halle el término central en el desarrollo del cociente notable: $\frac{x^{5p+1} + y^{5p-6}}{x^{p-1} + y^{p-2}}$

Resolución

$$\frac{x^{5p+1} + y^{5p-6}}{x^{p-1} + y^{p-2}} = \frac{x^{21} + y^{14}}{x^3 + y^2}$$

$$N^{\circ} \text{ de términos}(n) = \frac{5p+1}{p-1} = \frac{5p-6}{p-2} = 7$$

$$(5p+1)(p-2) = (p-1)(5p-6)$$

$$5p^2 - 9p - 2 = 5p^2 - 11p + 6$$

$$2p = 8$$

$$\Rightarrow p = 4$$

$$\text{Lugar}(T_c) = \frac{n+1}{2}$$



sabemos $n = 7$

$$k = \text{Lugar}(T_c) = 4$$

$$T_k = (\text{signo})(x^3)^{n-k}(y^2)^{k-1}$$

K es Par, el signo es $(-)$

$$T_4 = -(x^3)^{7-4}(y^2)^{4-1}$$

$$T_4 = -x^9 y^6$$

$$T_c = -x^9 y^6$$

$$\therefore T_c = -x^9 y^6$$



PROBLEMA 5 En el cociente notable: $\frac{(x+1)^{20} - (x-1)^{20}}{4x}$, determine el valor numérico del séptimo término para $x=2$

Resolución

$$\frac{(x+1)^{20} - (x-1)^{20}}{4x} = \frac{(x+1)^{20} - (x-1)^{20}}{(x+1)^2 - (x-1)^2}$$

recuerda:

$$(x+1)^2 - (x-1)^2 = 4x$$

(Identidad legendre)

Cálculo de T_7



$$n = 10$$

$$k = 7$$



$$T_k = (\text{signo})[(x+1)^2]^{n-k}[(x-1)^2]^{k-1}$$

$$T_7 = +[(x+1)^2]^{10-7}[(x-1)^2]^{7-1}$$



$$T_7 = (+)(x+1)^6(x-1)^{12}$$



$$V.N(T_7) \text{ para } x = 2$$

$$V.N(T_7) = (3)^6(1)^{12}$$

$$\therefore V.N = 729$$



PROBLEMA 6 El número de veces que postuló el alumno Ricardo a la UNI está dado por la cantidad de términos que tiene el cociente de: $\frac{x^{68} + x^{66} + x^{64} + \dots + x^2 + 1}{x^{12} + x^{10} + x^8 \dots + x^2 + 1}$
 ¿Cuántas veces postuló Ricardo?

Resolución

$$\frac{x^{68} + x^{66} + x^{64} + \dots + x^2 + 1}{x^{12} + x^{10} + x^8 \dots + x^2 + 1} = \frac{\frac{x^{70} - 1}{\cancel{x^2 - 1}}}{\frac{x^{14} - 1}{\cancel{x^2 - 1}}} = \frac{x^{70} - 1}{x^{14} - 1} \Rightarrow N^\circ \text{ de términos} = \frac{70}{14}$$

$N^\circ \text{ de términos} = 5$

Recuerda

$$\frac{x^{20} - 1}{x^4 - 1} = x^{16} + x^{12} + x^8 + x^4 + 1$$

$$N^\circ \text{ de términos} = \frac{20}{4} = 5$$

\therefore Ricardo postuló 5 veces

PROBLEMA 7

Al desarrollar el cociente notable: $\frac{x^{ab}-y^b}{x^a-y}$, se tiene qu el grado absoluto del quinto término es 95 y los grados absolutos de los términos disminuyen de 6 en 6. Si el precio de un polo deportivo es $(ab-36)$ dólares, pero en oferta de verano se hace un descuento del 30%.¿Cuál es el precio de oferta del polo deportivo?

**Resolución**

Propiedad:

Dado:

$$\frac{x^m \pm y^n}{x^p \pm y^q}$$

Si genera un C.N, se cumple:
Los G.A de los términos aumentan o disminuyen a una razón constante (r)

$$r = q - p$$

Del dato

$$r = -6 = 1 - a$$

$$a = 7$$

Calculo del T_5

$$n = b$$

$$k = 5$$

$$T_5 = + (x^a)^{b-5} (y)^{5-1}$$

$$T_5 = + (x^7)^{b-5} y^4$$

$$GA(T_5) = 95$$

$$7(b - 5) + 4 = 95$$

$$b = 13$$

el precio del polo es:

$$(7)(13) - 36 = 55$$

Descuento 30%

$$0,30(55) = 16,5$$

Precio de oferta: $55 - 16,5$

∴ Precio de oferta: \$ 38,5