


# PHYSICS Chapter 09

2nd SECONDARY



**MRU II** 





#### Tiempo de encuentro $(t_E)$

Sebastián está a 180m de Alexa y los dos van al encuentro uno del otro con velocidades de 4m/s y 5m/s respectivamente.

Calcula:

- a)El tiempo de encuentro.
- b)Distancia que recorrió Alexa.


#### Tiempo de Alcance $(t_A)$



Hoy estudiaremos casos especiales del MRU, donde podremos responder preguntas como el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance que se presentan de situaciones reales.




## Tiempo de encuentro $(t_E)$





### Tiempo de Alcance $(t_A)$




$$t_A = \frac{d}{V_1 - V_2}$$





Los autos que se muestran realizan MRU. Determine luego de qué tiempo se cruzarán.



Resolución:

Como los autos van al encuentro:

$$t_E = \frac{d}{V_A + V_B}$$

$$T_E = \frac{70 \text{ m}}{4\text{m/s} + 3\text{m/s}}$$


$$t_E = 10 \text{ s}$$





¿Cuánto tiempo tardará un ave que vuela en línea recta con una rapidez constante de 4 m/s, en cruzar totalmente un tren de 180 m de longitud, que viaja con velocidad constante de módulo 5 m/s en dirección contraria al ave?

#### Resolución:



Terminarán de cruzarse cuando se encuentre la parte posterior del tren con la paloma

$$t_E = \frac{d}{V_{ave} + V_{tren}}$$


$$t_E = \frac{180 \ m}{4m/s + 5m/s}$$

$$t_E = 20 \mathrm{s}$$





A partir del instante mostrado que distancia recorre el móvil A para dar alcance al móvil B, si ambos realizan un M.R.U.



#### Resolución:

Se trata de un tiempo de alcance:

$$t_A = \frac{d}{V_A - V_B}$$

$$t_A = 7 s$$

$$\mathbf{d} = \boldsymbol{v}.\boldsymbol{t}$$


$$d_A = 6\frac{m}{s} \times 7s$$

$$d_A = 42 m$$





Jorge y Freddy pasan simultáneamente por A y B con 4 m/s y 6 m/s respectivamente. Determine L si se cruzan luego de 10 segundos en D. (Jorge y Freddy se desplazan con MRU)



Como Jorge y Freddy van al encuentro:

$$t_E = \frac{d}{V_{Jorge} + V_{Freddy}}$$

$$10s = \frac{40m + L}{4m/s + 6m/s}$$


$$10s = \frac{40m + L}{10 \text{ m/s}}$$

$$L=60m$$





Si los autos experimentan MRU de tal manera que el auto A es 4 m/s más rápido que el auto B. Determine luego de que tiempo el auto B es alcanzado por A, desde el instante mostrado.



#### Resolución:


Se trata de un tiempo de alcance:

$$t_A=25\,\mathrm{s}$$



Jair emite un grito para llamar a Steven que venga corriendo en línea recta hacia él con una rapidez constante de 5 m/s, si Steven escucha el grito de Jair luego de 1 s. ¿Qué tiempo corre Steven para llegar a Jair?

(Vsonido = 340 m/s)



Resolución:

Calculemos primero la distancia entre Jair y Steven:

$$\mathbf{d} = v.t$$


Reemplazando:

$$d=340\frac{m}{s} \times 1s$$

$$d=340\ m$$



# Ahora calculemos el tiempo que le toma a Steven llegar hasta Jair:



$$t = \frac{d}{v}$$

Reemplazando:

$$\mathsf{t} = \frac{340\,m}{5\,m/s}$$


$$t = 68 \, s$$





Dos autos pasan por una calle, separados 50m, a una velocidad constante de 15 m/s. Un tercer auto pasa por la misma calle, en el mismo sentido que los dos primeros, a una velocidad de 20m/s. ¿Cuál es el intervalo que separa a los dos rebases del tercer auto por el primero y el segundo, respectivamente?

#### Resolución:



#### Entre C y B:

$$t = \frac{d}{v_C - v_R}$$

$$t = \frac{50m}{20\frac{m}{s} - 15\frac{m}{s}}$$

$$t = \frac{50m}{5\frac{m}{S}} = 10s$$