

# TRIGONOMETRY

## Chapter 2

Razones trigonométricas  
de ángulos notables





# TRIGONOMETRY

## índice

---

01. MotivatingStrategy >

02. HelicoTheory >

03. HelicoPractice >

04. HelicoWorkshop >

Video: ¿Cómo es el triángulo notable de  $45^\circ$  y  $45^\circ$ ?



# MOTIVATING STRATEGY

# ¿ CÓMO ES EL TRIÁNGULO RECTÁNGULO NOTABLE DE $45^\circ$ y $45^\circ$ ?

www.pizarravirtual.com



**Tema:**

**Geometría** ¿ CÓMO ES EL TRIÁNGULO RECTÁNGULO NOTABLE DE  $45^\circ$  y  $45^\circ$  ?

**Triángulo especial  $45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$   
NIVEL BASICO-video 1**



Realizado por: Marzini David Izaguirre Molina

Material Digital






Resumen



# HELICO THEORY

# ¿ CÓMO OBTENEMOS LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS AGUDOS NOTABLES?

Las obtenemos a partir de triángulos rectángulos notables básicos (cuando  $k = 1$ ) ; los cuales poseen proporciones fijas y muy conocidas entre las longitudes de sus lados con respecto a sus ángulos agudos interiores.





Luego aplicamos las definiciones de las razones trigonométricas del ángulo agudo.

$$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$$

$$\csc 60^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

	sen	cos	tan	cot	sec	csc
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	2
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	2	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$
37°	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{5}{3}$
53°	$\frac{4}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{5}{4}$

## Resolución de Problemas



Problema 01



Problema 02



Problema 03



Problema 04



Problema 05



# HELICO PRACTICE







Calcule

$$E = (\sin 30^\circ + \cos 60^\circ) \cdot \tan 37^\circ$$

## RECORDEMOS

$\text{sen}\alpha$	$\text{cos}\alpha$	$\text{tan}\alpha$	$\text{cot}\alpha$	$\text{sec}\alpha$	$\text{csc}\alpha$
$\frac{\text{CO}}{\text{H}}$	$\frac{\text{CA}}{\text{H}}$	$\frac{\text{CO}}{\text{CA}}$	$\frac{\text{CA}}{\text{CO}}$	$\frac{\text{H}}{\text{CA}}$	$\frac{\text{H}}{\text{CO}}$



$$E = (\sin 30^\circ + \cos 60^\circ) \cdot \tan 37^\circ$$

$$E = \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \cdot \frac{3}{4}$$


$$E = \left( \frac{2}{2} \right) \cdot \frac{3}{4}$$

Respuesta

$$\therefore E = \frac{3}{4}$$



Calcule  $\cot\theta$



Por lo tanto:

$$x + 3 = 2x + 1$$


$$x = 2$$

Calculando  $\cot\theta$

$$\cot\theta = \frac{5x - 3}{x + 3}$$

$$\cot\theta = \frac{5(2) - 3}{(2) + 3}$$

**RECORDEMOS**




Respuesta


$$\therefore \cot\theta = \frac{7}{5}$$



Del gráfico, calcule:  $\tan \beta$



Del gráfico, por  $\triangle$  notable  $45^\circ$ :



Calculando  $\tan \beta$

Respuesta

$$\therefore \tan \beta = \frac{1}{4}$$



Diego desea comprar un terreno en forma rectangular cuyas dimensiones son A y B (en metros). Si se sabe que el metro cuadrado cuesta \$ 100. Determine el precio del terreno.

$$A = 4(\sec 37^\circ + \sen^2 60^\circ)$$

$$B = 2 \tan 45^\circ + 5 \cos 53^\circ$$

Calculando las dimensiones del terreno:

$$A = 4(\sec 37^\circ + \sen^2 60^\circ)$$

$$A = 4 \left[ \frac{5}{4} + \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 \right]$$

$$A = 4 \left[ \frac{5}{4} + \frac{3}{4} \right]$$

$$A = 8 \text{ metros}$$

$$B = 2 \cdot \tan 45^\circ + 5 \cdot \cos 53^\circ$$

$$B = 2 (1) + 5 \left( \frac{3}{5} \right)$$

$$B = 2 + 3$$

$$B = 5 \text{ metros}$$

Calculando el área del terreno:

5 m.



8 m.

$$S = b \times h$$

$$S = (8 \text{ m}) \times (5 \text{ m})$$


Respuesta

$$\therefore S = 40 \text{ m}^2$$



Pedro decide dibujar un triángulo equilátero con la condición que la altura sea  $2\sqrt{3}$ . Dé como respuesta el valor del lado de dicho triángulo.

Graficamos:



Del  $\triangle ABH$ :

$$k\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

$$k = 2$$

Respuesta

∴ Lado del triángulo equilátero = 4

### RECORDEMOS

