


# GEOMETRÍA

Capítulo 21



PLANO CARTESIANO







René Descartes nace el 31 de marzo de 1596 cerca de Poitiers.


Fundamentó su pensamiento filosófico en la necesidad de tomar un "punto de partida" sobre el que edificar todo el conocimiento. En su faceta matemática que le lleva a crear la Geometría Analítica, también comienza tomando un punto de partida: dos rectas perpendiculares entre sí, que se cortan en un punto denominado "origen de coordenadas", ideando así las denominadas coordenadas cartesianas.



Es el plano determinado por dos rectas perpendiculares que se dividen en cuatro cuadrantes y su

### intersección se llama origen. (ordenadas) II C (+)A(a;b)X (abscisas) (+)a III C IV C


#### **Distancia entre dos puntos**



$$\mathbf{d} = \sqrt{(\mathbf{x_1} - \mathbf{x_2})^2 + (\mathbf{y_1} - \mathbf{y_2})^2}$$

## Coordenadas del punto medio de un segmento

El punto medio del  $\overline{PQ}$  es el punto M(x;y) que divide en dos segmentos  $\overline{PM}$  y  $\overline{MQ}$  de igual longitud.




$$X = \frac{X_1 + X_2}{2}$$

$$y = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

#### División de un segmento en una razón dada

Sean  $A(x_1; y_1)$  y  $B(x_2; y_2)$  los extremos de  $\overline{PQ}$ , las coordenadas del punto R(x; y)




$$X = \frac{m.X_1 + n.X_2}{m + n}$$

$$y = \frac{m.y_1 + n.y_2}{m + n}$$




#### Cálculo de áreas en el plano cartesiano





#### 1. Halle la distancia entre los puntos A(3 ;- 3) y B(- 5; 3).



#### Resolución:

- Piden: d
- Distancia entre dos puntos

$$\mathbf{d} = \sqrt{(-5-3)^2 + (3-(-3))^2}$$


$$\mathbf{d} = \sqrt{(-8)^2 + (6)^2}$$

$$\mathbf{d} = \sqrt{100}$$

$$d = 10u$$



#### 2. Determine las coordenadas del punto P.



#### Resolución

- Piden: P(a;b)
- Por teorema:


$$a = \frac{4(1) + 3(15)}{3 + 4} = \frac{49}{7} = 7$$

$$\mathbf{b} = \frac{4(8) + 3(1)}{3 + 4} = \frac{35}{7} = 5$$

P(7;5)



3. Determine las coordenadas del punto medio del segmento que tiene por extremos los puntos A (13; – 2) y B (11; – 8).



#### Resolución

- Piden: M (x; y)
- Por Coordenada del Punto Medio

$$x = \frac{11+13}{2} = \frac{24}{2} = 12$$

$$y = \frac{(-8) + (-2)}{2} = \frac{-10}{2} = -5$$

$$M(12;-5)$$



## 4. Calcule el área de la región rectangular OABC.

#### Resolución



Por Coordenada del Punto Medio

$$m=\frac{10+2}{2}=6$$

$$n = \frac{2+6}{2} = 4$$

Por teorema:

$$S = (6)(4)$$

$$S = 24 u^2$$



5. Según la aplicación del Google maps se puede observar el plano del distrito de Jesús María, si Alonso se ubica en el punto A que esta ubicado en el cruce de la Av. Brasil con la Av. San Felipe y desea trasladarse en línea recta hasta el punto B que esta ubicado en el cruce de la Av. Brasil con la Av. Talara. ¿Qué distancia recorre Alonso?



- Piden: d
- Distancia entre dos puntos

$$d = \sqrt{(12-8)^2 + (20-6)^2}$$


$$\mathbf{d} = \sqrt{(4)^2 + (14)^2}$$

$$d = \sqrt{212}$$

$$\mathbf{d} = 2\sqrt{53}\mathbf{u}$$




#### 6. Calcule el área de la región triangular ABC.





#### 7. Calcule el perímetro de la región cuadrada ABCD.



#### Resolución

Piden:  $2p_{ABCD}$  $2p_{ABCD} = 4\ell$  ... (1)

Se traza AC

$$d = \sqrt{(6-5)^2 + (8-1)^2}$$

$$d = \sqrt{(1)^2 + (7)^2}$$

$$d = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

- ADC: Notable de 45° y 45° ... (2)
- Reemplazando 2 en 1.

$$2p_{ABCD} = 4(5)$$

$$2p_{ABCD} = 20 u$$