


BIOLOGY Tomo 3 y 4

ASESORIA
DE
2DO
SECUNDARIA







Corresponde a la principal propiedad de las células musculares.

- A) Penetrabilidad
- B) Contractibilidad
- C) Transmisibilidad
- D) Conductividad
- E) Tenacidad

RESPUESTA: B

Las células musculares presentan especialización en cuanto a desarrollar proteínas contráctiles actina y miosina.



Las células nerviosas que tienen función fagocitaria son


- A) las células de Schawnn.
- B) los oligodendrocitos.
- C) las células neuronales.
- D) los astrocitos.
- E) las microglias.

RESPUESTA: e

Las neuroglias que tienen origen en el mesodermo y constituyen parte de las células con capacidad fagocítica son las microglias.

PROPUSO el sistema binomial.

A) Margulis
B) Raimondi
C) Linneo
D) Whittaker
E) Woese



RESPUESTA: c

El gestor de las bases de la actual taxonomía es el naturalista sueco Carl von Linneo, quien propuso el sistema binomial (género-especie).


Es la unidad básica de la taxonomía.

- A) Reino
- B) Familia
- C) Género
- D) Especie
- E) Dominio

RESPUESTA: D

La especie indica la unidad básica de una población.







Coníferas, cicadáceas, ginkgos y gnetofitas se denominan en conjunto A) plantas afines a helechos.

B) gimnospermas.

C) angiospermas.

D) dicotiledóneas.

E) plantas vasculares sin semilla.

RESPUESTA: B

Los gimnospermas se engloban junto a los angiospermas dentro del grupo de las espermatofitas. Se derivan en siete clases, de los cuales tres se han extinguido.

Los estróbilos son estructuras características de

- A) musgos.
- B) helechos.
- C) coníferas.
- D) equisetos.
- E) licopodios.

RESPUESTA: c

Las coníferas reciben dicho nombre por la forma de sus fibras agrupadas en conos y estróbilos.



Son celentéreos de agua dulce las (los)

- A) Hidras
- B) Anémonas
- C) Corales
- D) Ascon
- E) Sicon



RESPUESTA: A

La hidra es un género de hidrozoos hidroides de la familia Hydridae propias de las aguas dulces (estanques de agua, lagos, arroyos en regiones templadas y tropicales).



Es un parásito carente de aparato digestivo.

- A) Oxiuro
- B) Alicuya
- C) Tenia
- D) Lombriz
- E) Triquina

RESPUESTA: c

La tenia no tiene tubo digestivo, está adaptada al parasitismo. Absorbe el alimento por las microvellosidades de la epidermis.



Son platelmintos de vida libre.

- A) Las ascaris
- B) Las lombrices de tierra
- C) Los nematodos
- D) Las dugesias
- E) Las filarias

RESPUESTA: d

Los platelmintos son conocidos como gusanos planos, ya que no presentan cavidades internas (acelomados) la mayoría son parasitos, a excepción de los turbelarios (dugesia) viva en medios acuáticos y son de pequeño tamaño.

Es un parásito externo el (la)

A) tenia.

B) ascaris.

C) pulga.

D) oxiuro.

E) fasciola.



RESPUESTA: c

Parásito es aquel que se alimenta de otro ser vivo y a la vez le causa daño (huésped), los parásitos que se encuentran en el interior de su huésped son conocidos como endoparásitos y los que se encuentra en la superficie externa de su huésped son exoparásitos.