GEOMETRÍA

Capítulo 9



4st

SECONDARY

Segmentos proporcionales

SACO OLIVEROS

1. PROPORCIÓN ÁUREA

También llamada **sección áurea**, se halla presente en la naturaleza, el arte y la arquitectura.

Los griegos la conocieron en **el estudio del cuerpo humano** y la utilizaron, en la escultura y la arquitectura y la definieron como una característica fundamental en su estética.

GEOMETRÍA, ESCALA Y PROPOCIÓN EN EL TIEMPO





$$\frac{a}{b} = \frac{a+b}{a} = \varphi \text{ (Phi)} = \mathbf{1.61803399...}$$

SEGMENTOS PROPORCIONALES

Razón geométrica de dos segmentos

Es el cociente que se obtiene al dividir las longitudes de dos segmentos que tienen la misma unidad de medida.

Ejemplo:



$$\frac{AB}{CD} = \frac{\cancel{10}cm}{\cancel{15}cm} \Rightarrow \frac{AB}{CD} = \frac{2}{3}$$

$\frac{2}{3}$: razón geométrica de $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$

Segmentos proporcionales

Si la razón geométrica de 2 segmentos es igual a la de otros dos, dichos pares de segmentos son proporcionales.





$$\frac{AB}{CD} = \frac{\cancel{6}}{\cancel{8}} = \boxed{\frac{3}{4}} \qquad \frac{MN}{PQ} = \frac{\cancel{9}}{\cancel{12}} = \boxed{\frac{3}{4}}$$

$$\boxed{\frac{AB}{CD} = \frac{MN}{PQ}} \Rightarrow$$ Son proporcionales

SEGMENTOS PROPORCIONALES

Teorema de Tales



Si: $\overleftrightarrow{L_1} \parallel \overleftrightarrow{L_2} \parallel \overleftrightarrow{L_3}$

$$\frac{a}{b} = \frac{m}{n}$$

Corolario de Tales



Si: $\overleftrightarrow{L_1} \parallel \overline{AC}$

$$\frac{a}{b} = \frac{m}{n}$$

Teorema de la Bisectriz

T. de la Bisectriz Interior



$$\frac{a}{b} = \frac{m}{n}$$

T. de la Bisectriz Exterior



$$\frac{a}{b} = \frac{m}{n}$$

Teorema del Incentro

I: Incentro del △ABC



$$\frac{m}{n} = \frac{a+c}{b}$$

Teorema de Menelao



$(a)(b)(c) = (m)(n)(p)$

Teorema de Ceva



$(a)(b)(c) = (m)(n)(p)$

1. En la figura , $\overleftrightarrow{L_1}$ // $\overleftrightarrow{L_2}$ // $\overleftrightarrow{L_3}$. Halle el valor de *x.*





Resolución

- Piden x

$$\frac{x+4}{4} = \frac{5}{x-4}$$

$$(x+4)(x-4) = 20$$

$$x^2 - 4^2 = 20$$

$$x^2 = 36$$

$$\boxed{x = 6}$$

 SACO OLIVEROS

2. En la figura, halle el valor de x.





Resolución

- Piden x

$$\frac{m}{6} = \frac{5}{10} \longrightarrow m = 3$$

- Es ◺ notable de 37° y 53°

$$\boxed{x = 37°}$$

3. En un triángulo ABC, AB = 8, BC = 12 y AC = 10. Luego se traza la bisectriz interior $\overline{BD}$. Calcule AD.





- Piden AD = x

$$\frac{\cancel{8}^{\,2}}{\cancel{12}_{\,3}} = \frac{x}{10 - x}$$

$$20 - 2x = 3x$$

$$20 = 5x$$

$$\boxed{x = 4}$$

4. En un triángulo ABC, AB = 6, BC = 4 y AC = 3. Luego se traza la bisectriz exterior del ángulo exterior en B, la cual interseca a la prolongación de $\overline{AC}$ en E. Calcule CE.



Resolución



- Piden x

$$\frac{\cancel{6}^{\,3}}{\cancel{4}_{\,2}} = \frac{x+3}{x}$$

$$3x = 2x + 6$$

$$\boxed{x = 6}$$

5. En un triángulo rectángulo ABC, recto en B, se trazan las cevianas interiores $\overline{AD}$, $\overline{BE}$ y $\overline{CF}$, las cuales se intersecan en un punto. Si AF = 4, FB = 2, BD = 3 y AE = 2(EC), calcule m<BAC.

Resolución



- Piden m<BAC = x

Teorema de Ceva

$(\cancel{4})(3)(\cancel{a}) = (\cancel{2})(b)(\cancel{2a})$

$3 = b$



ΔABC: Notable de 45° y 45°

$\boxed{x = 45°}$

6. En la figura se observa una torre de alta tension de manera que los borras metálicas $\overline{AD}$, $\overline{BE}$ y $\overline{CF}$ son paralelas, BC=AB + 1; DE = 6 y EF = 8. Calcule AB.







Resolución

- Piden AB = x

$$\frac{x}{x+1} = \frac{\cancel{6}^{\,3}}{\cancel{8}_{\,4}}$$

$$4x = 3x + 3$$

$$\boxed{x = 3}$$

7. En la figura se muestra el piso de una piscina donde en el punto I se encuentra el punto de succión del agua, el cual equidista de las paredes de la piscina. Halle la distancia de I a B si BD = 10 m.

I es el incentro △ABC

Resolución

- Piden la distancia de I a B = x





Teorema del Incentro



$$\frac{m}{n} = \frac{a+c}{b}$$

Por teorema del Incentro

$$\frac{x}{10-x} = \frac{15+12}{18}$$

$$\frac{x}{10-x} = \frac{\cancel{27}^{\,3}}{\cancel{18}_{\,2}}$$

$$2x = 30 - 3x$$

$$5x = 30$$

$$\boxed{x = 6 \text{ m}}$$