



ALGEBRA

Chapter 15

3th
SECONDARY

Números Complejos



 **SACO OLIVEROS**

MOTIVATING STRATEGY



***Benoit Mandelbrot** publicó en 1975 su primer ensayo sobre fractales.*



Su dimensión es fraccionaria.



Su construcción se basa en la iteración de un número complejo, es decir se hace una operación y ésta se repite con el resultado....

$$z \mapsto z^2 + C \quad (\text{conjunto de Mandelbrot}).$$



NÚMEROS COMPLEJOS

UNIDAD IMAGINARIA (i):

$$i = \sqrt{-1} \text{ ; se llama unidad imaginaria} \Rightarrow i^2 = -1$$

Ejemplos: ➤ $\sqrt{-9} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{-1} = 3i$

➤ $\sqrt{-25} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{-1} = 5i$

➤ $\sqrt{-3} = \sqrt{3} \cdot \sqrt{-1} = \sqrt{3}i$



POTENCIAS DE i :

$$i^1 = i$$

$$i^5 = i$$

$$i^2 = -1$$

$$i^6 = -1$$

$$i^3 = -i$$

$$i^7 = -i$$

$$i^4 = 1$$

$$i^8 = 1$$

$$i^{4k} = 1$$

$$i^{4k+1} = i$$

$$i^{4k+2} = -1$$

$$i^{4k+3} = -i$$

Ejemplo:

$$i^{254} = (i^4)^{63} \cdot i^2 = 1(-1) = -1$$

Teorema:

$$i + i^2 + i^3 + i^4 + \dots + i^{4k} = 0$$



NÚMEROS COMPLEJOS

Un número complejo z es un par ordenado de números reales a y b , escrito como:

$$z = (a, b)$$

El conjunto de números complejos se denota por \mathbb{C} :

$$\mathbb{C} := \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$$

a es la **parte real** de z : $\text{Re}(z) : a$

b es la **parte imaginaria** de z : $\text{Im}(z) : b$



FORMA BINOMIAL DE z :

Un número complejo $z = (a, b)$ se escribe comúnmente como:

$$z = a + bi \quad / \quad i = \sqrt{-1}$$

$i = \sqrt{-1}$; se llama unidad imaginaria

a es la **parte real** de z :

$$\text{Re}(z): a$$

b es la **parte imaginaria** de z : $\text{Im}(z): b$

$$i = (0, 1)$$



PROPIEDADES

$$z = a + bi \quad / \quad i = \sqrt{-1}$$

- ✓ Si $a = 0$, $b = 0$, se dice que z es un **COMPLEJO NULO** $\Rightarrow z = (0, 0) = 0$
- ✓ Si $a = 0$, se dice que z es un **IMAGINARIO PURO** $\Rightarrow z = (0, b) = bi$
- ✓ Si $b = 0$, z se comporta como un **NÚMERO REAL** $\Rightarrow z = (a, 0) = a$

IGUALDAD DE COMPLEJOS:


$$\text{Si: } (x_1, y_1) = (x_2, y_2) \Rightarrow x_1 = x_2 \quad \wedge \quad y_1 = y_2$$



EL PLANO COMPLEJO **(PLANO Z, DE ARGAND O DE GAUSS):**

$$z = (a, b) = a + bi \quad / \quad i = \sqrt{-1}$$

Eje
imaginario



Módulo:

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Argumento:

$$\theta = \text{Arg}(z) = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$$



PROPIEDADES

$$z = a + bi \quad / \quad i = \sqrt{-1}$$

➤ Conjugado de Z:

$$\bar{z} = a - bi$$

➤ Opuesto de Z:

$$op(z) = z^* = -a - bi$$

OPERACIONES BÁSICAS:

Sean: $z_1 = a + bi$
 $z_2 = c + di$

• Adición: $z_1 + z_2 = (a + c) + (b + d)i$

• Multipliación:

$$z_1 z_2 = (a + bi)(c + di)$$

$$z_1 z_2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

• División: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{a + bi}{c + di} \times \frac{c - di}{c - di}$

$$\frac{z_1}{z_2} = \left(\frac{ac + bd}{c^2 + d^2} \right) + \left(\frac{bc - ad}{c^2 + d^2} \right) i$$

HELICO PRACTICE

CHAPTER 15

Efectúe

PROBLEMA 1

$$M = \sqrt{-49} + \sqrt{-100} + \sqrt{-9} + 5\sqrt{-144}$$

Resolución:

$$M = \sqrt{-49} + \sqrt{-100} + \sqrt{-9} + 5\sqrt{-144}$$

$$M = \sqrt{49} \cdot \sqrt{-1} + \sqrt{100} \cdot \sqrt{-1} + \sqrt{9} \cdot \sqrt{-1} + 5\sqrt{144} \cdot \sqrt{-1}$$

$$M = 7i + 10i + 3i + 5 \cdot 12i$$

$$M = 7i + 10i + 3i + 60i$$

$$\therefore M = 80i$$

Recordemos:UNIDADIMAGINARIA

$$i = \sqrt{-1}$$

Problema 2

Siendo $i = \sqrt{-1}$

Calcule

$$P = i^{79} + i^{99} - i^{51} + i^{82} + i^{41}$$

Recordemos:

POTENCIAS DE i :

$$i^{4k} = 1$$

$$i^{4k+2} = -1$$

$$i^{4k+1} = i$$

$$i^{4k+3} = -i$$

Resolución:



$$P = i^{79} + i^{99} - i^{51} + i^{82} + i^{41}$$

$$\triangleright i^{79} = i^{76+3} = i^{4k+3} = -i$$

$$\triangleright i^{99} = i^{96+3} = i^{4k+3} = -i$$

$$\triangleright i^{51} = i^{48+3} = i^{4k+3} = -i$$

$$\triangleright i^{82} = i^{80+2} = i^{4k+2} = -1$$

$$\triangleright i^{41} = i^{40+1} = i^{4k+1} = i$$

$$P = (-i) + (-i) - (-i) + (-1) + (i)$$

$$P = -i - i + i - 1 + i$$

$$\therefore P = -1$$



Problema 3

Reduzca

$$F = \frac{3i^{259} + 5i^{3593}}{20i^{4775} + 4i^{8749}}; \quad (i = \sqrt{-1})$$

Recordemos:

POTENCIAS DE i :

$$i^{4k} = 1$$

$$i^{4k+2} = -1$$

$$i^{4k+1} = i$$

$$i^{4k+3} = -i$$

Resolución:

$$F = \frac{3i^{259} + 5i^{3593}}{20i^{4775} + 4i^{8749}}$$

- $i^{59} = i^{56+3} = i^{4k+3} = -i$
- $i^{93} = i^{92+1} = i^{4k+1} = i$
- $i^{75} = i^{72+3} = i^{4k+3} = -i$
- $i^{49} = i^{48+1} = i^{4k+1} = i$

$$F = \frac{3(-i) + 5(i)}{20(-i) + 4(i)} = \frac{\cancel{2i}}{\cancel{-16i}}$$

$$\therefore F = -\frac{1}{8}$$



Problema 4

Si

$$z_1 = 4 + 7i$$

$$z_2 = -2 + 3i$$

$$\text{EFECTÚE: } z = \overline{z_1} + z_2^*$$

Resolución:

Recordemos:

Sea: $z = a + bi$

Conjugado de z :

$$\overline{z} = a - bi$$

Opuesto de z :

$$z^* = -a - bi$$

$$z = \overline{z_1} + z_2^*$$

$$z = (4 - 7i) + (2 - 3i)$$

$$z = (6 - 10i)$$

\therefore *la parte Real de $z = 6$*



Problema 5

Efectúe

$$P = (3 + i)^2 - i(6 + 5i)$$

Resolución:

$$P = \underbrace{(3 + i)^2}_{\text{Binomio al cuadrado}} - \underbrace{i(6 + 5i)}_{\text{Distributiva}}$$

$$P = 3^2 + 2(3)(i) + i^2 - 6i + 5i^2$$

$$P = 9 + \cancel{6i} + \underbrace{i^2}_{-1} - \cancel{6i} + 5\underbrace{i^2}_{-1}$$

$$P = 9 + (-1) - 5$$

$$P = 3$$

$$\therefore P = 3$$

Recordemos:

TRINOMIO CUADRADO PERFECTO

(Binomio al cuadrado):

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

POTENCIAS DE i :

$$i^{4k} = 1$$

$$i^{4k+2} = -1$$

$$i^{4k+1} = i$$

$$i^{4k+3} = -i$$



Problema 6

Si $z_1 = 5 - 2i$
 $z_2 = -3 + 2i$

al efectuar

$$T = \bar{z}_1 \cdot z_2^* + 1 + 4i$$

cuyo valor de T en soles es el precio de un galón de pintura para pintar 2 pizarras; ¿cuánto costará pintar 40 pizarras?

Recordemos: Sea: $z = a + bi$

Conjugado de z : $\bar{z} = a - bi$

Opuesto de z : $z^* = -a - bi$

Resolución:

$$T = \bar{z}_1 \cdot z_2^* + 1 + 4i$$

$$T = (5 + 2i)(3 - 2i) + 1 + 4i$$

$$T = 15 - 10i + 6i - 4i^2 + 1 + 4i$$

(-1)

$$T = 15 - 10i + 6i + 4 + 1 + 4i$$

$$T = 20$$

(Precio de 1 galón de pintura en soles).

➔ Para pintar 40 pizarras se requieren 20 galones.

$$\therefore \text{Pintar 40 pizarras costará } 20 \times 20 = S/. 400$$

Problema 7

Un docente de la facultad de sistemas hace una encuesta a sus estudiantes acerca de que país tiene la velocidad más rápida de internet si las alternativas fueron

N°	Países
1	Rusia
2	EE.UU
3	Corea del sur

Al finalizar la clase el docente menciona que la respuesta se obtienen al calcular $|z| - 2$, sabiendo que $z = \frac{5(1+i)}{2-i} + 2 + i$, ¿Cuál es el país con la velocidad más rápida de internet?

Resolución:

$$z = \frac{5(1+i)}{2-i} + 2 + i$$

$$z = \frac{5(1+i)}{(2-i)} \cdot \frac{(2+i)}{(2+i)} + 2 + i$$

$$z = \frac{5(2+i+2i+i^2)}{4-i^2} + 2 + i$$

$$z = \frac{5(2+i+2i-1)}{4+1} + 2 + i$$

$$z = \frac{5(1+3i)}{5} + 2 + i$$

$$z = 1 + 3i + 2 + i$$

$$z = 3 + 4i$$

Recordemos: MÓDULO DE Z:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Nos piden: $|z| - 2$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} - 2$$

$$|z| = \sqrt{3^2 + 4^2} - 2$$

$$|z| = \sqrt{25} - 2$$

Rpta: Corea del Sur