

Álgebra Linear I – Prof. José Luiz Neto – Resumo_A3

Livro de preparação do resumo: Álgebra Linear → Boldrine/Costa e Figueiredo/Wetzler (BOLDRINI, J. L. et al. Álgebra Linear. 3 ed. São Paulo: Harbra, 1986) e <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Apostila+de+Matrizes%2C+Determinantes+e+Sistemas+2008>, acessado em 30/07/2020.

Matrizes

Transposta de uma Matriz. Propriedades. A álgebra das matrizes quadradas: potência de matrizes quadradas e cálculo de $p(A)$, onde p é polinômio e A é uma matriz quadrada.

1) Transposta de uma Matriz (muito importante)

Transposição: Dada uma matriz $A = [a_{ij}]_{m \times n}$, podemos obter uma outra matriz $A' = [b_{ij}]_{n \times m}$, cujas linhas são as colunas de A , isto é, $b_{ij} = a_{ji}$. A' é denominada *transposta* de A .

1.3.4 Exemplos

Exemplo 1:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}_{3 \times 2} \quad A' = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$$

Nota: Prefiro denotar a transposta da matriz A com A^T e não com A^t .

Exemplo:

$$\text{Se } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}_{3 \times 2} \quad \text{então } A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}_{2 \times 3}.$$

Importante!

$$AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}_{3 \times 2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 5 & 11 & 17 \\ 11 & 25 & 39 \\ 17 & 39 & 61 \end{pmatrix}.$$

Nota: AA^T é uma matriz simétrica. Isto sempre ocorre?

Propriedades - Veja no livro texto.

2)A álgebra das matrizes quadradas: potência de matrizes quadradas e cálculo de $p(A)$, onde p é polinômio e A é uma matriz quadrada.

Importante! 1)Fazer potência de matrizes quadradas se resume em fazer produto de matrizes. 2)Enquanto que calcular $p(A)$, onde p é polinômio e A é uma matriz quadrada, se resume em fazer produtos de matrizes e adição de matrizes, simultaneamente. Este dois assuntos já foram apresentados.

Lembrando:

$$A^0 = I_n$$

$$A^1 = A$$

$$A^2 = A \cdot A$$

.....

$$A^k = A \cdot A^{k-1} = A^{k-1} \cdot A$$

Exemplo:

$$\text{Seja } A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Então } A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercício:

$$\text{Se } p(x) = x^2 + 2x - 11 \text{ e } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Mostre que } p(A) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

O que isto significa?