

# Uvod

V prvem letniku smo spoznali, kako lahko zveznost funkcije v neki točki karakteriziramo z zaporedji. Funkcija  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  je zvezna v točki  $a \in \mathbb{R}$  natanko tedaj, ko za vsako zaporedje  $(a_n)$ , ki konvergira proti  $a$ , zaporedje  $(f(a_n))$  konvergira proti  $f(a)$ . Podobno lahko z zaporedji karakteriziramo funkcijsko limito: število  $L \in \mathbb{R}$  je limita funkcije  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  v točki  $a \in \mathbb{R}$  natanko tedaj, ko za vsako zaporedje  $(a_n)$  s členi različnimi od  $a$ , ki konvergira proti  $a$ , zaporedje  $(f(a_n))$  konvergira proti  $L$ . Po definiciji funkcija  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  odvedljiva v  $a$ , če obstaja limita

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

v tem primeru tej limiti pravimo odvod funkcije  $f$  v točki  $a$ . Ker funkcijsko limito znamo opisati z zaporedji, lahko rečemo, da je  $f$  odvedljiva v  $a$ , natanko tedaj, ko obstaja število  $L \in \mathbb{R}$ , da za vsako zaporedje  $(a_n)$  s členi različnimi od  $a$ , ki konvergira proti  $a$ , zaporedje  $(\frac{f(x)-f(a_n)}{x-a_n})$  konvergira proti  $L$ . Sedaj smo uspeli pojma zveznosti in odvedljivosti funkcije opisati samo s pojmom konvergence zaporedja. Če bi znali tudi kako drugače definirati, kdaj dano zaporedje konvergira, bi dobili drugačni definiciji zveznosti in odvedljivosti. Točno s tem se bomo ukvarjali v tej predstavitvi. Najprej se bomo naučili, kaj je to Cesaro konvergenca zaporedja, s pomočjo tega bomo dobili novi definiciji zveznosti in odvedljivosti, nato pa bomo ugotovili katere funkcije so zvezne oziroma odvedljive po tej novi definiciji.

## 1 Cesaro konvergenca

Naj bo  $(a_n)$  realno zaporedje. Temu zaporedju lahko priredimo novo zaporedje, katerega  $n$ -ti člen je enak  $\bar{a}_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$ . Temu novemu zaporedju bomo rekli zaporedje aritmetičnih sredin zaporedja  $(a_n)$  in ga označili z  $(\bar{a}_n)$ .

**Definicija 1.** Realno zaporedje  $(a_n)$  Cesaro konvergira, če konvergira njeno zaporedje aritmetičnih sredin  $(\bar{a}_n)$ .

Oznaka  $a_n \rightarrow a$  naj pomeni, da zaporedje  $(a_n)$  konvergira proti  $a$ , oznaka  $a_n \rightsquigarrow a$  pa, da zaporedje Cesaro konvergira proti  $a$ .

V prvem letniku smo se pri analizi naučili, da iz  $a_n \rightarrow a$  sledi  $a_n \rightsquigarrow a$ . Obratno seveda ne velja, saj zaporedje  $(-1)^n$  Cesaro konvergira proti 0, ne konvergira pa v običajnem smislu. Ker je pojem Cesaro konvergence zelo pomemben za nadaljevanje, si oglejmo še nekaj primerov.

### 1.1 Primeri

1. Poiščimo primer omejenega zaporedja, ki ni Cesaro konvergentno. Prvi člen naj bo enak 2. Naslednjih nekaj členov bo enakih  $-2$ . Takih členov mora biti dovolj, da bo aritmetična sredina padla pod  $-1$ . Nato spet dodajmo dovolj členov enakih 2, da bo aritmetična sredina narasla nad 1. S ponavljanjem take konstrukcije dobimo omejeno zaporedje, ki ni Cesaro konvergentno, saj zaporedje aritmetičnih sredin nekako oscilira med  $-1$  in 1.

2. Naj bo  $m \in \mathbb{N}$  in  $a_1, a_2, \dots, a_m \in \mathbb{R}$ . Zanima nas, kdaj zaporedje  $a_1, a_2, \dots, a_m, a_1, a_2, \dots$  Cesaro konvergira proti 0. Naj bo  $A := a_1 + a_2 + \dots + a_m$ . Ker za vse  $k \in \mathbb{N}$  velja  $\bar{a}_{km} = A$ , je enakost  $A = 0$  potreben pogoj za  $a_n \rightsquigarrow 0$ . Naj bo torej  $A = 0$ . Zaporedje delnih vsot zaporedja  $(a_n)$  je potem periodično, zato je omejeno. Sledi, da zaporedje aritmetičnih sredin konvergira proti 0. Torej  $(a_n)$  konvergira proti 0 natanko tedaj, ko velja  $A = 0$ .

## 2 Cesaro zveznost

Sedaj se lahko končno lotimo Cesaro zveznosti.

**Definicija 2.** Funkcija  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  je Cesaro zvezna v točki  $a \in \mathbb{R}$ , če za vsako zaporedje  $(a_n)$ , ki Cesaro konvergira proti  $a$ , zaporedje  $(f(a_n))$  Cesaro konvergira proti  $f(a)$ . Pravimo, da je  $f$  zvezna, če je zvezna v vsaki točki  $a \in \mathbb{R}$ .

Da si bomo lažje predstavljali, katere funkcije so Cesaro zvezne, si najprej ogledimo kakšen primer.

**Zgled 1.** Pokazati želimo, da je vsaka funkcija oblike  $f(x) = Ax + B$ , kjer sta  $A, B \in \mathbb{R}$ , Cesaro zvezna. (TODO)

**Izrek 1.** Naj bo  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  funkcija. Naslednje trditve so ekvivalentne.

1. Funkcija  $f$  je Cesaro zvezna v točki 0.
2. Funkcija  $f$  je Cesaro zvezna.
3. Funkcija  $f$  je oblike  $f(x) = Ax + B$  za neki realni števili  $A, B \in \mathbb{R}$ .

**Dokaz.** (1)  $\rightarrow$  (3) : Naj bo funkcija  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definirana s predpisom  $g(x) = f(x) - f(0)$ . Potem je  $g$  Cesaro zvezna v točki 0 in velja  $g(0) = 0$ . Naj bo  $a \in \mathbb{R}$  poljubno realno število. Ker zaporedje  $a, -a, a, -a, a, \dots$  Cesaro konvergira proti 0 in je  $g$  Cesaro zvezna v 0, zaporedje  $g(a), g(-a), g(a), g(-a), \dots$  Cesaro konvergira proti  $g(0) = 0$ . Potem mora veljati  $g(a) + g(-a) = 0$  oziroma  $g(-a) = -g(a)$ . Naj bosta zdaj  $b, c \in \mathbb{R}$  poljubni realni števili. Spet zaporedje  $b, c, -(b+c), b, c, -(b+c), \dots$  Cesaro konvergira k 0, zato zaporedje  $g(b), g(c), g(-(b+c)), g(b), \dots$  Cesaro konvergira proti  $g(0) = 0$ . Sledi  $g(b) + g(c) + g(-(b+c)) = 0$  oziroma  $-(g(b) + g(c)) = g(-(b+c))$ . Upoštevamo še, da je velja  $g(-a) = -g(a)$  za vsak  $a \in \mathbb{R}$  in dobimo  $g(b) + g(c) = g(b+c)$ . Torej je  $g$  aditivna.

Naslednji cilj je pokazati, da velja  $g(\lambda x) = \lambda g(x)$  za vse  $\lambda \in \mathbb{Q}$  in  $x \in \mathbb{R}$ . Za primer ko je  $\lambda \in \mathbb{N}$  to sledi neposredno iz aditivnosti. Ker velja tudi  $g(0) = 0$  in  $g(-a) = -g(a)$ , to velja celo za vse  $\lambda \in \mathbb{Z}$ . Naj bo zdaj  $\frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$  poljubno racionalno število. Velja  $mg(x) = g(mx) = g(n\frac{m}{n}x) = ng(\frac{m}{n}x)$  oziroma  $\frac{m}{n}g(x) = g(\frac{m}{n}x)$ , kar smo želeli dokazati.

Pokažimo zdaj, da je  $g$  zvezna. Naj bo  $(x_n)$  poljubno zaporedje, da je  $x_n \rightarrow 0$ . Poiščimo zaporedje  $(y_n)$ , katerega zaporedje aritmetičnih sredin je enako  $(x_n)$ . Očitno mora biti  $y_1 = x_1$ . Denimo, da smo že definirali  $y_1, \dots, y_n$  in da velja  $x_k = \bar{y}_k$  za vse  $k \leq n$ . Da bo veljalo tudi

$x_{n+1} = \bar{y}_{n+1}$  oziroma  $x_{n+1} = \frac{y_1 + \dots + y_{n+1}}{n+1}$ , moramo vzeti  $y_{n+1} = (n+1)x_{n+1} - (y_1 + \dots + y_n)$ . Tako definirano zaporedje  $(y_n)$  res zadošča  $x_n = \bar{y}_n$  za vse  $n \in \mathbb{N}$ . Ker je  $x_n \rightarrow 0$ , je  $y_n \rightsquigarrow 0$  po definiciji, zato iz Cesaro zveznosti funkcije  $g$  v 0 sledi  $g(y_n) \rightsquigarrow g(0) = 0$ . Iz tega, kar smo pokazali v prejšnjih odstavkih, sledi

$$g(x_n) = g(\bar{y}_n) = g\left(\frac{y_1 + \dots + y_n}{n}\right) = \frac{g(y_1) + \dots + g(y_n)}{n} \rightarrow 0.$$

Torej je  $g$  zvezna v 0. Ker je  $g(x_0 + x) = g(x_0) + g(x)$ , je zvezna tudi v vsaki drugi točki  $x_0 \in \mathbb{R}$ .

Naj bo  $A = g(1)$ . Zevezni funkciji  $g$  in  $x \mapsto Ax$  se ujemata na  $\mathbb{Q}$ , ki je gosta podmnožica v  $\mathbb{R}$ , torej sta enaki. Če vzamemo  $B = f(0)$ , velja  $f(x) = Ax + B$  za vse  $x \in \mathbb{R}$ . S tem je implikacija dokazana.

(3)  $\rightarrow$  (2) : To smo pokazali v zgornjem zgledu.

(2)  $\rightarrow$  (1) : Če je  $f$  Cesaro zvezna, je po definiciji Cesaro zvezna tudi v točki 0. □

### 3 Cesaro odvedljivost