4 Math101 opgaver til 4. gang

4.1 Udregn følgende tal

$$3^3$$
, 2^{-1} , $\left(\frac{1}{-1}\right)^3$, $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$, 123^0 .

4.2 Udregn følgende tal

$$\log_2(128)$$
, $\log_{10}(100)$, $\log_5\left(\frac{1}{25}\right)$, $\ln(e^3)$, $\log_{123}(1)$.

4.3 Udregn f
ølgende tal

$$\sin(\frac{\pi}{4}) + \cos(\frac{\pi}{4}), \qquad \tan(\frac{\pi}{3}) + \cos(\frac{\pi}{6}), \qquad \frac{\sin(\frac{\pi}{6}) + \cos(\frac{\pi}{3})}{\sin(\frac{2\pi}{3})}.$$

4.4 Udregn følgende tal

$$\log_{10}(4) + \log_{10}(250), \quad \log_{10}(25) - \log_{10}(5) + \log_{10}(2), \quad \log_{3}(54) + \log_{3}\left(\frac{1}{2}\right)$$

4.5 Udregn følgende

$$\cos(-\frac{5\pi}{4}), \qquad \sin(\frac{5\pi}{3}), \qquad \tan(-\frac{5\pi}{4}), \qquad \cos(\frac{8\pi}{3}).$$

4.6 Reducer f
ølgende

$$\ln(\sqrt{2}) + \ln(2), \quad \log_{10}(5^{3/2}) + \frac{1}{2}\log_{10}(5) + \log_{10}(4), \quad \frac{1}{4}\log_{5}(4^{2} + 3^{2}).$$

4.7 Udregn følgende tal


$$3^{\log_3(1)}, \qquad e^{1+\ln(3)}, \qquad 10^{-\log_{10}(7)}, \qquad 7^{1-\log_7(9)}, \qquad 4^{-\log_2(3)}.$$

4.8 Udregn

$$\cos(\frac{13\pi}{3}), \qquad \tan(\frac{12\pi}{6}), \qquad \sin(-\frac{10\pi}{4}), \qquad \tan(\frac{15\pi}{5}).$$

4.9 Løs ligningerne

$$e^x = 3$$
, $\ln(x) = 4$, $\ln(2x - 4) = \ln(8) + \ln(4)$, $3\log_{10}(x) = \log_{10}(27)$.




Figur 3: Opgave 4.11

4.10 Bestem to forskellige løsninger til ligningerne

$$\sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \cos(x - \pi) = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad 2\cos^2(x) + 5\cos(x) + 2 = 0.$$

- 4.11 I denne opgave beviser vi nogle af de eksakte værdier for sinus og cosinus til vinklerne $\frac{\pi}{6}$ og $\frac{\pi}{6}$.
 - 4.11(a) Vis at $\sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$ ved at regne på trekanten i Figur 3. (Hint: Hvad kan man sige om sidelængderne i trekanten?)
 - 4.11(b) Brug idiotformlen $(\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1)$ til at vise at $\cos(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
 - 4.11(c) Vis at $\sin(\frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. (Hint: $\sin(\frac{\pi}{3}) = \sin(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}) = 2\sin(\frac{\pi}{6})\cos(\frac{\pi}{6})$)
 - 4.11(d) Brug idiot
formlen til at vise at $\cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}.$
- 4.12 I denne opgave beviser vi nogle af de eksakte værdier for sinus og cosinus til vinklen $\frac{\pi}{4}$.
 - 4.12(a) Vis at $\sin(\frac{\pi}{4})=\frac{\sqrt{2}}{2}$ ved at regne på trekanten i Figur 4.(Hint: Pythagoras)
 - 4.12(b) Brug idiot formlen til at vise at $\cos(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$



Figur 4: Opgave 4.12