

# Projete Orthogonal

Delhomme Fabien

10 mars 2022

## Table des matières

<b>I Définitions</b>	<b>1</b>
<b>II Pourquoi ce point existe ?</b>	<b>1</b>
<b>III Approche géométrique</b>	<b>2</b>
<b>IV Trigonométrie</b>	<b>2</b>
IV.1 Définitions . . . . .	2
<b>V Le chemin difficile : trouver les coordonnées d'un projeté.</b>	<b>3</b>
V.1 Première étape, trouver l'équation de la droite $(AB)$ . . . . .	3
V.2 Calculer la distance entre $C$ et un point $M$ de la droite. . . . .	3
V.3 Rappeler que $M \in (AB)$ . . . . .	3

## I Définitions


On considère  $M$  un point du plan, et  $\Delta$  une droite du plan, qui ne passe pas par  $M$ .

On peut donner plusieurs définitions équivalentes au projeté orthogonal.



### Projeté orthogonal d'un point sur une droite

Le projeté orthogonal d'un point  $M$  sur une droite  $\Delta$  est le point  $M'$  tel que la distance  $MM'$  est minimale.



## II Pourquoi ce point existe ?

La distance entre un point  $M'$  qui appartient à la droite  $\Delta$  et le point  $M$  est une fonction qui dépend de la position de  $M'$  sur la droite.

Mais cette fonction ressemble à une parabole, puisque si l'on connaît les coordonnées de  $M$  et de  $M'$ , on sait que :

$$MM'^2 = (x_{M'} - x_M)^2 + (y_{M'} - y_M)^2$$

Autrement dit, la fonction  $M' \mapsto MM'^2$  ressemble à une parabole (il y a des carrés dans la formule, ce n'est pas un argument suffisant, c'est un argument que l'on appelle «heuristique», qui repose sur l'intuition plutôt que de la formalisation pure. Mais vous pouvez me faire confiance ici, cela fonctionne bien)! Donc, cette parabole admet un point minimale atteint pour un certain point  $M'_0$ , qui est le projeté orthogonal de  $M$  sur la droite  $\Delta$ .

La puissance de feu des mathématiques en action! Ce raisonnement se retrouve dans de très nombreux domaines, notamment... Dans les algorithmes de deep learning (!).

### III Approche géométrique



#### Projeté orthogonal d'un point sur une droite


| Le projeté d'un point  $M$  sur une droite  $\Delta$  est le point  $M'$  tel que l'angle entre  $\Delta$  et  $M'M$  est droit.



#### Proposition

| Les deux définitions sont équivalentes! C'est-à-dire que trouver le point  $M'$  tel que la distance entre  $M'M$  est le minimum revient à tracer la perpendiculaire à la droite  $\Delta$  qui passe par  $M$ !

Remarquez l'angle droit formé sur la figure ci-contre (qui a la même configuration que la figure précédente.)



### IV Trigonométrie


#### IV.1 Définitions



#### Définition du cosinus d'un angle

| On considère un triangle **rectangle** ABC rectangle en A. Alors, on définit la fonction cos de l'angle  $\widehat{ABC}$  par :


$$\cos(\widehat{ABC}) = \frac{AB}{BC} = \frac{\text{Adjacent}}{\text{Hypoténuse}}$$



## V Le chemin difficile : trouver les coordonnées d'un projeté.

On considère le problème suivant. On connaît  $A(2, 3)$  et  $B(4; 5)$  les coordonnées de deux points dans le plan. Soit  $C(4, 6)$  un point qui n'est pas sur la droite  $(AB)$  (ça se voit, puisque  $C$  a la même abscisse que  $B$ , mais pas la même ordonnées). Comment calculer les coordonnées de  $I$  le projeté de  $C$  sur la droite  $(AB)$  ?

Si on demande à l'ordinateur de représenter la situation, voici ce que l'on obtient :



### V.1 Première étape, trouver l'équation de la droite $(AB)$

On a déjà vu avec le chapitre sur le déterminant comment déterminer une équation de droite. Ici, elle est simple, puisque l'on remarque que l'ordonnée des points  $A$  et  $B$  est égale à 1 ajouté aux abscisses de ces points. Donc si  $(x; y)$  représente les coordonnées d'un point sur  $(AB)$ , on a :

$$(AB) \quad : \quad x - y = -1$$

### V.2 Calculer la distance entre $C$ et un point $M$ de la droite.

D'après les formules déjà vues en cours, on peut calculer entre le point  $C$  et un point  $M = (x; y)$ . On va calculer cette distance au carré pour éviter d'être embêté avec d'éventuelles racines carrées :

$$\begin{aligned} CM^2 &= \|CM\|^2 = (x - 4)^2 + (y - 6)^2 \\ &= x^2 + y^2 - 8x - 12y + 52 \end{aligned}$$

### V.3 Rappeler que $M \in (AB)$

On rappelle que l'on sait que  $x - y = -1$  pour  $M(x; y) \in (AB)$ , donc, on peut remplacer chaque  $y$  par  $x + 1$  dans la formule suivante :

$$CM^2 = x^2 + y^2 - 8x - 12y + 52$$

Et on obtient :

$$CM^2 = x^2 + (x + 1)^2 - 8x - 12(x + 1) + 52$$


Finalement, après développement et simplification (il y a donc quelques lignes de calculs qu'il faut compléter) :

$$CM^2 = 2x^2 - 18x + 41 = 2 \times (x^2 - 9x + 20, 5)$$

On peut donc poser  $f$  la fonction :

$$f(x) = x^2 - 9x + 20,5$$

Et il s'agit de trouver le minimum de cette fonction. Si on représente cette fonction par ordinateur, on observe la courbe suivante :



On voit que le minimum semble être atteint en  $x = 4,5$ . Pour le démontrer, on calcule alors :

$$\begin{aligned} f(x) - f(4,5) &= x^2 - 9x + 20,5 - 0,25 \\ &= x^2 - 9x + 20,25 \\ &= (x - 4,5)^2 \end{aligned}$$

Car il se trouve que  $f(4,5) = 0,25$  et  $4,5^2 = 20,25$ . Donc  $f(x)$  est un nombre toujours plus grand que le nombre  $f(4,5)$  car  $(x - 4,5)^2$  est un nombre toujours positif !

Donc le minimum est atteint en  $x = 4,5$ , ce qui est l'abscisse du point  $I$ , projeté orthogonal de  $C$  sur la droite  $(AB)$ . Le point  $I$  est donc de coordonnées  $I = (4,5; 5,5)$ .