

MathDaily

编辑部发表专用

MathDaily 编辑部

Pulchritudo in virtute est

MathDaily 期刊

第 1 卷第 58 期 • 模法集结号出品

问题

Solve

设函数 $z = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足

$$4 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 12 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + 5 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

确定常数 b 的值, 使上式在变换 $u = x - 2y, v = x + by$ 下, 可简化为

$$\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0.$$

解:

将 z 视为 u, v 的函数, 利用链式法则计算偏导数:

一阶偏导数:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -2 \frac{\partial z}{\partial u} + b \frac{\partial z}{\partial v}.$$

二阶偏导数 (记 $z_{uu} = \frac{\partial^2 z}{\partial u^2}, z_{uv} = \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v}, z_{vv} = \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$):

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= z_{uu} + 2z_{uv} + z_{vv}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= -2z_{uu} + (b-2)z_{uv} + bz_{vv}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= 4z_{uu} - 4bz_{uv} + b^2z_{vv}. \end{aligned}$$

代入原方程:

$$4(z_{uu} + 2z_{uv} + z_{vv}) + 12(-2z_{uu} + (b-2)z_{uv} + bz_{vv}) + 5(4z_{uu} - 4bz_{uv} + b^2z_{vv}) = 0.$$

合并同类项得:

$$(-16 - 8b)z_{uv} + (4 + 12b + 5b^2)z_{vv} = 0.$$

要使方程简化为 $z_{uv} = 0$, 需

$$\begin{cases} 4 + 12b + 5b^2 = 0, \\ -16 - 8b \neq 0. \end{cases}$$

$$5b^2 + 12b + 4 = 0$$

得

$$b = -\frac{2}{5}$$

或

$$b = -2$$

当 $b = -2$ 时, $-16 - 8b = 0$, 不满足条件;

当 $b = -\frac{2}{5}$ 时, $-16 - 8b = -\frac{64}{5} \neq 0$, 满足条件。

故所求常数为

$$b = -\frac{2}{5}.$$

□

声 明

声明一 本期刊发布唯一目的是练习 LaTeX 排版能力, 对于所选题目, 均已在“参考文献”处标注来源。如有侵权, 请联系 email:<mathdaily1@outlook.com> 删除。

声明二 本期刊发布时间: 周一至周五晚上 8 点, 周末及节假日不发布, 其它发布时间敬请关注公众号: MFJJH

声明三 我们欢迎任何人与我们交流数学与 LaTeX 排版相关的内容, 欢迎指正错误, 请联系 email:<mathdaily1@outlook.com> 或在公众号 ‘MFJJH’ 后台留言。



模法集结号