


B. Exemple de radio avec entorse grave de cheville

Radiographie de la cheville droite

Incidence de face

Incidence de profil

**Critères d'Ottawa****Radiographies à réaliser si un critère :**

- Âge inférieur à 18 ans ou supérieur à 55 ans
- Douleur palpation malléole interne
- Douleur palpation malléole externe
- Douleur base du 5ème métatarsien
- Douleur os naviculaire
- Incapacité de mise en charge immédiate ou dans le service d'urgence, sur 4 pas

Entorse grave de cheville

B. Exemple de radio avec luxation antéro-inférieure de l'épaule

Radiographie de l'épaule gauche

Incidence de face

Perte de contact entre la tête humérale et la glène scapulaire
Glène vide, tête humérale se projetant sous le processus coracoïde
Superposition de la tête et du rebord inférieur de la glène

Recherche de trait de fracture associé

- encoche de Hill-Sachs (fracture par impaction du tubercule majeur)
- fracture du rebord antéro-inférieur de la glène (lésion de Bankart).



Luxation antéro-inférieure de l'épaule gauche


Fractures fréquentes de l'adulte et du sujet âgé

- A. Connaître l'indication, l'objectif et la sémilogie de base des examens d'imagerie devant une fracture de l'extrémité supérieure du fémur
- A. Connaître la classification de Garden
- A. Exemple de radiographie de la hanche droite de face d'une fracture du col fémoral

Radiographies de hanche droite de face (4 patients distincts)




Garden I



Fracture incomplète, avec préservation de la corticale médiale, non déplacée, avec impaction des travées céphaliques en valgus



Garden II



Fracture complète, non déplacée




Garden III



Fracture complète, déplacée avec un déplacement partiel avec varisation des travées céphaliques par rapport aux travées cervicales



Garden IV



Fracture complète avec déplacement complet ; les travées osseuses céphaliques et cervicales sont parallèles

A. Exemple de radiographie du poignet avec fracture de Pouteau-Colles

B. Connaître les formes cliniques des fractures de l'EIR

Radiographies de poignet gauche

Incidence de face



Incidence de profil

Fracture de l'extrémité inférieure du radius
(flèches)

- Extra-articulaire
- Avec déplacement dorsal du fragment distal
- Et horizontalisation de la ligne bistyloïdienne

Fracture de Pouteau-Colles

A. Généralités sur les fractures : connaître les fractures typiques de l'enfant

**Radiographie du bras
Incidence de face**



Fracture en motte de beurre

Fracture diaphyso-métaphysaire des os longs, fracture –tassement sans solution de continuité

**Radiographie du bras
Incidence de profil**



Fracture plastique

Courbure plastique de l'ensemble de l'os sans trait de fracture

**Radiographie du poignet
Incidence de profil**



Fracture en bois vert

Atteinte d'un seul versant de la corticale, diaphysaire

**Radiographie de la jambe
Incidence de face**




Fracture en cheveux

Trait fin et spiroïde, diaphysaire, typique à l'apprentissage de la marche

A. Généralités sur les fractures : connaître les fractures typiques de l'enfant**Radiographies du genou
Incidences de face et de profil**

Fracture métaphyso-épiphysaire
distale du fémur droit, type 2



Classification de Salter et Harris des fractures
métaphyso-épiphysaires