


Modif. Quantitatif

Par délétion



→ Récepteur ErbB = EGFR ; c-Ha = v. Ha
↓

Famille Erb (3 lettres = version d'0)

EGFR = Erb B1 → ligand EGF



HER2 = Erb B2 → pas de ligand, Récepteur pro-actif dominant

Prolifération cellulaire (EGF = contrôle extrinsèque)

Par amplification de gènes oncogènes




Survivabilité des protéines de transduction = mutation ponctuelle



Proto-Oncogènes → oncogènes (gain de fonction ; dominant ; altération ; somatique)


Modif. Quantitatif

Amplification génique



alt. h. - monoclonale ; HER2 = X ovaries postménopausées

Insertion d'un promoteur viral



↑ Transcription du proto-oncogène

Virus AVL (leucémie aviaire)

Translocation

Lymphome de Burkitt




MYC = Stimule la prolifération

! altération EGFR, HER2 ≈ X

Modif. Qualitatif

Leucémie Myéloblastique Chronique (LMC)



Protéine chimerique = Assemblage BCR/ABL

regule une activité Tyrosine - Kinase propre (active par défaut)



Prolifération cellulaire + I* Apoptose

Chromosomes numérotés

Anti-oncogènes (mutation vers une perte de fonction ; nécessit. 2 allèles touchés ; casuel ou germlinal)

Cycle cellulaire : gène Rb et P53 → **Gate de phase**

$G0 \rightarrow G1 \{CDK4-Gc D\} \rightarrow \text{Passage à la phase S} \{CDK2-Gc E\} ; \{CDK1-Gc A\} \rightarrow G2 \{CDK1-Gc A\} \rightarrow \{CDK1-Gc B\} \rightarrow \text{Mitose}$



P53 muté → Transcription Anomalie génétique

Mutation du système MMR = Miss MMR Repair

