


Domains Histaminergique





Δ Il n'y a pas d'agents des récepteurs Histaminergiques autres que l'Histamine


Histamine - libération Spécifique:

1^{re} Exposition = Pas de dégranulation

2^{de} Exposition




Phase de Sensibilisation = Phase Silencieuse




Histamine libération non spécifique (indépendant IgE)

- Impact métabolique
- Venues
- Choc Allergique
- Système du Complément


H1 - Principal { Vasodilatation, Bronchoconstriction




H2 - Principal



H3 { Pré-Synaptique $\rightarrow$ 1^{re} Libération histamine, Post-Synaptique $\rightarrow$ 1^{re} des autres neurotransmetteurs



H4 Myo⁺ vers le cœur



Mastocytes; PN Eosinophil; DC; LTC₄; C₄

Plus (brûle/irrite) $\rightarrow$ contraction

Endothélium $\rightarrow$ Vasodilatation + Perméabilité

Glandes Endocrines $\rightarrow$ $\nrightarrow$ (affecte H₁/H₂/ATP)

Cerveau $\rightarrow$ Tachycardie

Antagonisme H1 Première Génération (Pas Sélectif)

Pour la DHE et autres $H_1 \rightarrow \textcircled{E1}$: Effet Anticholinergiques
 - Sédation

Diphéhydramine : AGARAX $\rightarrow$ mal des transports

Hydroxyzine : ATARAX $\rightarrow$ anxiété / stress

Antagonisme H1 2^{ème} Génération (Antagonisme Sélectif H1 et Compétitif)

L'absence des $\textcircled{E1} \rightarrow$ effets anticholinergiques

Pas ou peu de sédation / pas de contre-indication


"-ine" Cétirizine ; Lorazétidine

Antagonisme H2 $\rightarrow$ Sécrétion Acide Gastric

Aliment dans l'estomac

cellules entérochromaffines libère

Cellule G : $\text{gastrine} \rightarrow \text{R-CCK des ECL} \rightarrow \text{histamine ECL} \xrightarrow{I^o \text{ inhibe}} H_2$ Cellule Pariétale



$\textcircled{INDC}$ R60; ulcère gastrique

Cimétidine $\rightarrow \textcircled{E1}$ Gynécisme / confusion mentale