


Le Complément

→ Protéines plasmatisques aidant la réaction immunitaire innée

DAF C3b5 = Protection de Sang contre le complément


Voié Classique

Complexe immuno-circulant (Ag-Ac)
Fragment Fc



Voié des Lectines

Motif Sacu Carbohydre → Protéine MBL



Voié Alternative

Facteur H, I
Protein Bb



I° pour l'immunité Path. immunitaire; Mais
 ↓ C1-inhibiteur = C1-inhibiteur Angiotensinogène
 ↓ C3a, C4a, C5a = Hémophagocytose Phagocytose Neutrophile
 Hémolyse constante

DAF C3b5

C5 convertase { C2, C4b, C3b / C3b, Bb, C3b }

Opsonisation C4
 Trois convertibles, en plus
 sur un site de récepteur: Pathogène
 Cellule de Soi
 → Inflammation

C6; C7; C8; C9
 C5b6; C5; C5
 C5b6 - Protéine S

Complexe d'Attaque Membranaire CAM

Lyses Osmotique → Phagocytose

Inflammatoire

Mastocytes + PN Basophile

degranulation

Anaphylatoxines

Vasodilatation

↑ Permabilité

Diapédèse

↑ Activation lymphocyte T (immunité adaptative)

+ Chimie Attraction

Récepteurs du Complément: "CR"

Macrophage, NK, Kpff - CR3... C3b = Activation Phagocytose

Immunoglobulines (Ig)


→ Glycoprotéines se lient de manière non covalente / réversible / très spécifique à son Antigène

MLR: BCR

Solubles: immunité humide

Chains Légiers: K α / λ ou κ / λ


Chains Lourds: V α /V β ou μ / δ
C: constant



FAB = 1° à l'Antigène

FC = Fragment constant

Récepteurs aux Fc



- IgG: • FC γ R I (CD64)
- FC γ R II (CD32)
- FC γ R III (CD16)

NK; Polynucléaires δ Mastocytes (macrophages)

• Fc ϵ R (Récepteur Neutrophile)

Epitope: Partie de l'IgG qui se lie à l'antigène (déterminant antigénique) et qui fait passer le message de l'antigène

Antigène: Partie de l'IgG qui est dégradée par les cellules = 1/1000 de la taille de l'IgG


IgA: • Fc α R I (macrophages)

IgE: • Fc ϵ R I / II (basophiles / mastocytes)

Monomère; réponse mémoire




monomère; Mastocytes / Basophiles; affinité élevée



monomère; < 1% des Ig




IgM



Pentamère (5); Ac "naturel" (humaine réponse)


Besoin d'adjuvant; - spécifique



Picots J = Chaine J: Petite glycoprotéine permettant de lier 1/1 Ig

dimères; sécrétion des muqueuses; très glycosylés; δ induit par TGF- β ; ne sont pas pro-inflammatoires

Part Fragment Fc



Affinité → Force 1° à 1 épitope - 1 protéine


Avallité → Force globale d'un Ag avec tous les épitopes % reconnus

MALT = Système Immunitaire Associé aux Muqueuses

- 1^{er} ligne de contact
- 600 m² à 80% de immunitaire

Ag étrangers non pathogènes (Ag alimentaire / flore commensale)

→ Tolérance pour le système immunitaire



NALT = Glande de Waldeyer


→ Surface ORL : amygdales (amandales latérales / Pharyngotonsilles / Linguales)

GALT

→ Tube digestif (plaques de Leger)

BALT

→ Tractus respiratoire



Lymphocytes T Intraépithéliaux

entre les & épithéliaux = 1^{er} ligne de défense → ^{Régime Régulé} LT CD8 ; TCR $\gamma\delta$ (= reconnaît Ag de type lipidiques...)

γ pas variable δ variable ag. dépendant

cytotoxiques
et infiltrés en endorgues

\$ anti-inflammatoire IL10; TGF- β → Maintien Homéostasie Muqueuse