


Phases de la douleur

- Transduction → conversion de la douleur en message électrique
- Transmission → relais médullaires
- Modulation → Thalamus (Mn & l'information)
- Réception → cortex cérébral

Les Antalgiques

- Excès de Nociception → Antalgiques
- Neuropathies → Anticonvulsifs / Anti-dépresseurs
- Psychogènes → Psychothérapie



Palais 1: Non opioïdes (pas d'effets toxico-mécaniques = Pas de dépendance)

- Paracétamol
 - Antalgiques + Antalgiques (Par Anti-inflammatoires)
 - INDC Antalgiques de 1^{re} intention (en chg de forme orales)
 - Associé avec AINS, opioïdes, corticoïdes
 - Dose 1g x 3/24h
 - 15mg/kg/pois chg l'adulte } 32-40 mg/kg
 - EL Risque: surdose hépatique
 - Surdosage Dose létale 10g → 5g d'antidote
 - caution hépatique → N-Acétyl-Cystéine
 - Régénère le glutathion

- Naloxone = Non-opioïde
- AINS
- Antalgiques qui I° Récepteurs Monoamines { SERT, NET, DAT }

- INDC double Aiguë uniquement
- EL S° Anti-cholinergique: constip° / Reten° Urin° / Tachycard° / Sécr° gland° = bouche sèche

Série de Paracétamol
 Anti-médicament: doloipin / effalgol / dafalgol → PARACÉTAMOL

Palais 2: Opioïdes faibles

- Tramadol
 - CYP 2D6 (weak "Pain")
 - I° Récepteurs NET / SERT
 - Récepteurs μ -opioïdes
 - EL Trouble gastro-intestinal / nauséeux / constipation

- Codéine
 - CYP 2D6 (général)
 - Morphine
 - Polymorphisme CYP2D6: 5-10% CYP2D6 no fonction pas de douleur!
 - EL Toxicomanie probable + détresse Respiratoire
 - Anti-toux à faible dose

Palais 3: Opioïdes Forts

- μ -opioïdes RCP6-Gi
 - Pro-Synaptique
 - Post-Synaptique
 - Ca²⁺
 - dim libération NT
 - K⁺ / δ -opioïdes
 - Hyperpolarisation

- Agoniste Complet: Morphine / Oxycodone / Fentanyl / Carfentanyl - 10 con
- T50: Méthadone / Buprénorphine
- Agoniste Complet: Nalbexone → Antidouleur supé. MMS 1/2 con

Naloxophane $\begin{cases} \rightarrow \text{Agoniste K} \\ \rightarrow \text{Antagoniste \mu} \end{cases}$

(EI) Constipation $\rightarrow$ Prévenir des bouchons "préventif" + Spas + Dié

Nausée $\rightarrow$ 2 à 3 semaines

Confusion & Somnolence

Rétention Urinaire $\rightarrow$ diurétique associé

Myosis

Détresse Respiratoire

Dépendance $\rightarrow$ Marques Effigines: "Soraya" (Mydriasis: pleurésie pleurésie à la recherche du Trachéotomie)

Tolérance: 1 dose

Psychologie: addictif



ATTENTION programmation du dosage