

# Einführung in die Funktionalanalysis

31. Oktober 2013

## Organisatorisches

**Vorlesung** Di 12.15 - 13.45 HS4; Mi 14.15 - 15.45 HS4

15.10.13

**Übung** Do 16.00 - 17.30 HS4

**Dozent** Christian Lageman <christian.lageman@mathematik.uni-wuerzburg.de>  
Sprechstunde: Mi 10.00 - 11.30 Übungsblätter: Abgabe Vorlesung Dienstag

**Wuecampus**

**Klausur** 5.4.2014, 14:00 HS4

**Literatur** D. Werner, Funktionalanalysis, Springer-Verlag 2011 F. Hirzebruch, W. Scharlau, Einführung in die Funktionalanalysis, Spektrum Akademischer Verlage, 1991 E. Kreyzig, Introduction Functional Analysis with Applications, John Wiley & Sons, 1989 R. Meise, D. Vogt, Einführung in die Funktionalanalysis, Vieweg + Teubner Verlag, 2011

**Voraussetzungen** Lineare Algebra I und II; Analysis I und II; Veriefung Analysis; insbesondere metrische Räume, Folgen in metrischen Räumen, offene und abgeschlossene Mengen, Integration im  $\mathbb{R}^n$

## 1 Normierte Räume

Sprechen wir von einem  $\mathbb{K}$ -Vektorraum, so meinen wir einen  $\mathbb{R}$ - oder  $\mathbb{C}$ -Vektorraum, d.h. die entsprechenden Definitionen und Sätze gelten sowohl für reelle als auch für komplexe Vektorräume. Wir verwenden  $\mathbb{K}$  als Platzhalter für  $\mathbb{R}$  bzw.  $\mathbb{C}$  in den Sätzen und Definitionen.

**Definition 1.** Sei  $X$  ein  $\mathbb{K}$ -Vektorraum. Wir nennen eine Funktion  $\|\cdot\| : X \rightarrow [0, \infty)$  eine *Halbnorm auf  $X$* , falls gilt:

1.  $\forall_{v \in X, \lambda \in \mathbb{K}} : \|\lambda v\| = |\lambda| \cdot \|v\|$
2.  $\forall_{v, w \in X} : \|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$  (Dreiecksungleichung)

Gilt zusätzlich noch  $\forall v \in X : \|v\| = 0 \implies v = 0$ , so nennen wir  $\|\cdot\|$  eine *Norm* auf  $X$ . Ist  $\|\cdot\|$  eine Norm auf  $X$ , so bezeichnen wir  $(X, \|\cdot\|)$  als *normierten Raum*.

Eine Norm  $\|\cdot\|$  auf einem  $\mathbb{K}$ -Vektorraum  $X$  induziert durch  $d(v, w) = \|v - w\|$  eine Metrik  $d : X \times X \rightarrow [0, \infty)$  auf  $X$ , die wir als kanonische Metrik auf  $(X, \|\cdot\|)$  bezeichnen.  $\square$

Ein normierter Raum ist damit auch ein metrischer Raum. Die Begriffe von offenen und abgeschlossenen Mengen, Konvergenz von Folgen, Cauchy-Folgen, Vollständigkeit, Stetigkeit von Abbildungen ergeben sich für normierte Räume aus den entsprechenden Begriffen für metrische Räume.

**Example 1.** Sei  $(X, \|\cdot\|)$  ein normierter Raum. Eine Folge  $(v_n)$  in  $X$  heißt konvergent gegen  $v^* \in X$  falls gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \|v_n - v^*\| < \varepsilon$$

wobei  $\|v_n - v^*\| = d(v_n, v^*)$  mit der kanonischen Metrik  $d$  ist.  $\triangle$

Für einen normierten Raum  $(X, \|\cdot\|)$  notieren wir:

1. den Abschluss einer Menge  $M \subset X$  mit  $\overline{M}$ ,
2. den Rand einer Menge  $M \subset X$  mit  $\partial M$ ,
3. das Innere einer Menge  $M \subset X$  mit  $\text{int } M$ ,

Aus der entsprechenden Definitionen für metrische Räume ergibt sich: eine Folge  $(v_n)$  in einem normierten Raum  $(X, \|\cdot\|)$  heißt *Cauchy-Folge*, falls gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n, m > N : \|v_n - v_m\| < \varepsilon.$$

Ein metrischer Raum und entsprechend auch ein normierter Raum, in dem jede Cauchy-Folge konvergiert, nennt man *vollständig*.

1. die offene Kugel um  $v \in X$  mit Radius  $r$  mit  $U_r(v) = \{w \in X : \|v - w\| < r\}$ .

**Definition 2.** Einen vollständigen normierten Raum bezeichnet man als *Banachraum*.  $\square$

**Example 2.** 1. Versehen wir  $\mathbb{R}^n$  bzw.  $\mathbb{C}^n$  mit einer Norm  $\|\cdot\|$ , so ist der normierte Raum  $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$  bzw.  $(\mathbb{C}^n, \|\cdot\|)$  ein Banachraum. Es sei daran erinnert, dass auf einem endlich-dimensionalen Vektorraum alle Normen äquivalent sind, d.h. sind  $\|\cdot\|_*$ ,  $\|\cdot\|_+$  Normen auf einem endlich-dimensionalen  $\mathbb{K}$ -Vektorraum  $X$ , so gibt es Konstanten  $m, M > 0$  mit  $\forall v \in X : m\|v\|_* \leq \|v\|_+ \leq M\|v\|_*$ . Die Vollständigkeit im  $\mathbb{R}^n$  bzw.  $\mathbb{C}^n$  ist damit nur für eine Norm nachzuweisen und aus der Analysis bekannt.

2. Sei  $M$  eine nicht-leere Menge. Wir bezeichnen mit  $l^\infty(M)$  den  $\mathbb{K}$ -Vektorraum der beschränkten Funktionen  $M \rightarrow \mathbb{K}$ . Wir definieren auf  $l^\infty(M)$  die Norm  $\|\cdot\|_\infty$  durch  $\|f\|_\infty = \sup_{x \in M} |f(x)|$  für  $f \in l^\infty(M)$ . Die Norm ist wohldefiniert, da  $f$  beschränkt ist. Man bezeichnet  $\|\cdot\|_\infty$  auch als die sogenannte *Supremumsnorm*.  $\|\cdot\|_\infty$  ist eine Norm, denn:

- (a) für  $f \in l^\infty(M), \lambda \in \mathbb{K}$  gilt:  $\|\lambda f\|_\infty = \sup_{x \in M} |\lambda f(x)| = \sup_{x \in M} |\lambda| |f(x)| = |\lambda| \sup_{x \in M} |f(x)| = |\lambda| \|f\|_\infty$ .
- (b) für  $f, g \in l^\infty(M)$  gilt:  $\|f+g\|_\infty = \sup_{x \in M} |(f+g)(x)| = \sup_{x \in M} |f(x) + g(x)| \leq \sup_{x \in M} |f(x)| + \sup_{x \in M} |g(x)| = \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ .
- (c) für  $f \in l^\infty(M)$  gilt:  $\|f\|_\infty = 0 \implies \sup_{x \in M} |f(x)| = 0 \implies \forall_{x \in M} : |f(x)| = 0 \implies f \equiv 0$ .

$(l^\infty(M), \|\cdot\|_\infty)$  ist also ein normierter Raum. Wir zeigen nun, dass der Raum vollständig ist. Sei dazu  $(f_n)$  eine Cauchy-Folge in  $l^\infty(M)$ . Es gilt also  $\forall_{\varepsilon > 0} \exists N \in \mathbb{N} \forall_{n, m > N} : \|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon$ . Es gilt außerdem  $\|f_n - f_m\|_\infty = \sup_{x \in M} |f_n(x) - f_m(x)|$ . Dies impliziert, dass  $\forall_{\varepsilon > 0} \exists N \in \mathbb{N} \forall_{n, m > N} \forall_{x \in M} : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ . Insbesondere gilt für alle  $x \in M$  daher  $\forall_{\varepsilon > 0} \exists N \in \mathbb{N} \forall_{n, m > N} : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ , und also ist  $(f_n(x))$  eine Cauchy-Folge für jedes  $x \in M$ . Da  $\mathbb{R}$  und  $\mathbb{C}$  vollständig sind, ist für jedes  $x \in M$  die Folge  $(f_n(x))$  konvergent. Wir erhalten die Funktion  $f^* : M \rightarrow \mathbb{K}$  durch  $\forall_{x \in M} : f^*(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ . Wir erhalten eine Funktion  $f^* : M \rightarrow \mathbb{K}$  mit  $\forall_{x \in M} : f^*(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ . Wir hatten uns überlegt, dass

$$\forall_{\varepsilon > 0} \exists N \in \mathbb{N} \forall_{n, m > N} \forall_{x \in M} : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon.$$

Damit gibt es ein  $N \in \mathbb{N}$  mit  $\forall_{n, m > N} \forall_{x \in M} : |f_n(x) - f_m(x)| < 1$ . (Dies ist äquivalent zu  $f_m(x) \in U_1(f_n(x))$ .) Also  $\forall_{m > N} \forall_{x \in M} : f_m(x) \in U_1(f_{N+1}(x))$ . Somit  $\forall_{x \in M} : f^*(x) \in U_1(f_{N+1}(x))$ . Damit  $\forall_{x \in M} : |f_{N+1}(x) - f^*(x)| \leq 1$ . Da  $f_{N+1} \in l^\infty(M)$ , also beschränkt ist, muss auch  $f^*$  beschränkt sein. Wir erhalten  $f^* \in l^\infty(M)$ . Wir zeigen nun die Konvergenz von  $(f_n)$  gegen  $f^*$ . Sei  $\varepsilon > 0$  gegeben. Dann gibt es ein  $N \in \mathbb{N}$ , so dass  $\forall_{n, m > N} \forall_{x \in M} : |f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$ . Also  $\forall_{x \in M} \forall_{n > N} \forall_{m > N} : |f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$ . Da es zu jedem  $x \in M$  und  $n > N$  ein  $m(x, n) \in \mathbb{N}, m(x, n) > N$  gibt mit

$$|f_{m(x, n)}(x) - f^*(x)| < \underbrace{\frac{\varepsilon}{2} - |f_n(x) - f_{m(x, n)}(x)|}_{> \frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon}{3} = \frac{1}{6}\varepsilon}.$$

folgt

$$\forall_{x \in M} \forall_{n > N} : \underbrace{|f_n(x) - f_{m(x, n)}(x)| + |f_{m(x, n)}(x) - f^*(x)|}_{|f_n(x) - f^*(x)| \leq} < \frac{\varepsilon}{2} - |f_n(x) - f_{m(x, n)}(x)| + |f_n(x) - f_{m(x, n)}(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Also  $\forall_{n>N} \forall_{x \in M} : |f_n(x) - f^*(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ . Damit  $\forall_{n>N} : \|f_n - f^*\|_\infty \leq \frac{\varepsilon}{2} \leq \varepsilon$ . Damit konvergiert  $(f_n)$  gegen  $f^*$ . Somit ist  $(l^\infty(M), \|\cdot\|_\infty)$  ein Banachraum.

△

**Theorem 1.** Sei  $(X, \|\cdot\|)$  ein normierter Raum und  $U \subset X$  ein Unterraum von  $X$ .

1. Ist  $(X, \|\cdot\|)$  ein Banachraum und  $U$  eine abgeschlossene Teilmenge von  $X$ , so ist  $(U, \|\cdot\|)$  ein Banachraum.
2. Ist  $U$  vollständig, so ist  $U$  eine abgeschlossene Teilmenge von  $X$ .

○

*Beweis.* 1. Sei  $(u_n)$  eine Cauchy-Folge in  $(U, \|\cdot\|)$ . Dann ist  $(u_n)$  eine Cauchy-Folge in  $(X, \|\cdot\|)$ . Also konvergiert  $(u_n)$  gegen ein  $u^* \in X$ . Damit ist  $u^* \in \overline{U}$ , also  $u^* \in U$ . Somit ist  $U$  vollständig.

2. Sei  $U$  vollständig. Ist  $u^* \in \overline{U} \setminus U$ , so gibt es Folge  $(u_n)$  in  $U$  die gegen  $u^*$  konvergiert. Diese Folge ist eine Cauchy-Folge in  $U$  und konvergiert somit gegen einen Grenzwert  $u^{**} \in U$ . Wegen der Eindeutigkeit von Grenzwerten folgt  $u^* = u^{**} \in U$ . Also  $\overline{U} \setminus U = \emptyset$  und  $U$  abgeschlossen.

□

**Example 3.** Wir verwenden die Notation  $l^\infty = l^\infty(\mathbb{N})$ . Da eine Folge in  $\mathbb{K}$  eine Funktion  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$  ist, ist  $l^\infty$  also der Raum aller beschränkten Folgen in  $\mathbb{K}$ . Wir definieren die folgenden Unterräume von  $l^\infty$ :  $c = \{(x_n) | x_n \in \mathbb{K}, (x_n) \text{ konvergent}\}$ ,  $c_0 = \{(x_n) | x_n \in \mathbb{K}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0\}$ ,  $d = \{(x_n) | x_n \in \mathbb{K}, x_n \text{ bis auf endlich viele Folgenglieder gleich } 0\}$ . Da die konvergente Folge in  $\mathbb{K}$  in  $\mathbb{R}$  bzw.  $\mathbb{C}$  beschränkt ist, folgt  $d \subset c_0 \subset c \subset l^\infty$ . Sei  $\|\cdot\|_\infty$  die Supremumsnorm auf  $l^\infty$ . Es sind  $(d, \|\cdot\|_\infty)$ ,  $(c_0, \|\cdot\|_\infty)$ ,  $(c, \|\cdot\|_\infty)$  normierte Räume. Welche dieser Räume sind Banachräume? Mit Satz 1 reicht es zu zeigen, dass der entsprechende Raum abgeschlossen in  $l^\infty$  ist.

Sei  $(f_n)$  eine Folge in  $c$ , die konvergent gegen ein  $f^* \in l^\infty$  ist. Um Doppelindizes zu vermeiden, verwenden wir die Darstellung von Folgen als Funktionen  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$ . Da  $(f_n)$  eine Folge in  $c$  ist, können wir durch  $x_n = \lim_{m \rightarrow \infty} f_n(m)$  eine Folge  $(x_n)$  in  $\mathbb{K}$  definieren. Es gilt  $|x_n - x_l| \leq \sup_{m \in \mathbb{N}} |f_n(m) - f_l(m)| = \|f_n - f_l\|_\infty$ . Da  $(f_n)$  eine Cauchy-Folge ist, ist durch diese Abschätzung die Folge  $(x_n)$  eine Cauchy-Folge in  $\mathbb{K}$ . Also konvergiert  $(x_n)$  gegen ein  $x^* \in \mathbb{K}$ . Wir wollen nun zeigen, dass  $f^*$  gegen  $x^*$  konvergiert. Sei  $\varepsilon > 0$ . Wähle  $N \in \mathbb{N}$ , so dass  $\|f^* - f_N\| < \frac{\varepsilon}{3}$  und  $|x_N - x^*| < \frac{\varepsilon}{3}$ . Wähle  $M \in \mathbb{N}$ , so dass für alle  $m > M$  gilt  $|f_N(m) - x_N| < \frac{\varepsilon}{3}$ . Dann gilt für alle  $m > M$

$$|f^*(m) - x^*| \leq \underbrace{|f^*(m) - f_N(m)|}_{\leq \|f^* - f_N\|_\infty} + \underbrace{|f_N(m) - x_N|}_{< \frac{\varepsilon}{3}} + \underbrace{|x_N - x^*|}_{< \frac{\varepsilon}{3}} < \underbrace{\|f^* - f_N\|_\infty}_{< \frac{\varepsilon}{3}} + \frac{2}{3}\varepsilon < \varepsilon.$$

Also ist  $f^*$  konvergente Folge und  $f^* \in c$ . Damit ist  $c$  abgeschlossen und nach Satz 1 ein Banachraum.

Sei  $(f_n)$  eine Folge in  $c_0$  die konvergent gegen ein  $f^* \in l^\infty$  ist. Wiederholen wir das obige Argument, so erhalten wir zusätzlich dass  $(x_n)$  konstant 0 ist. Damit ist  $x^* = 0$  und  $f^* \in c_0$ . Somit ist  $c_0$  abgeschlossen und nach Satz 1 ein Banachraum. Der Raum  $(d, \|\cdot\|_\infty)$  ist kein Banachraum.

△

Wir definieren nun weitere Folgenräume.

**Definition 3.** Für  $p \in \mathbb{R}$  mit  $1 \leq p < \infty$  setzen wir  $l^p = \{(x_n) | x_n \in \mathbb{K}, \sum_{n=1}^\infty |x_n|^p < \infty\}$  und  $\|(x_n)\|_p = (\sum_{n=1}^\infty |x_n|^p)^{\frac{1}{p}}$  für  $(x_n) \in l^p$ . Wir wollen im Folgenden zeigen, dass  $(l^p, \|\cdot\|_p)$  Banachräume sind.

□

22.10.13

**Theorem 2.** Für  $1 \leq p < \infty$  ist  $l^p$  versehen mit der Addition und Skalarmultiplikation von Folgen ein  $\mathbb{K}$ -Vektorraum.

○

*Beweis.* Offensichtlich ist die konstante Folge  $(a_n)$  für alle  $n \in \mathbb{N}$   $a_n = 0$  in  $l^p$  enthalten. Desweiteren ist für  $\lambda \in \mathbb{K}$  und  $(x_n) \in l^p$  auch  $(\lambda x_n) \in l^p$ , da  $\sum_{n=1}^\infty |\lambda x_n|^p = |\lambda|^p \sum_{n=1}^\infty |x_n|^p$  konvergiert. Schließlich, sind  $(x_n), (y_n) \in l^p$ , so gilt  $\sum_{n=1}^\infty |x_n + y_n|^p \leq \sum_{n=1}^\infty (|x_n| + |y_n|)^p \leq \sum_{n=1}^\infty (2 \max\{|x_n|, |y_n|\})^p = 2^p \sum_{n=1}^\infty (\max\{|x_n|, |y_n|\})^p \leq 2^p \sum_{n=1}^\infty |x_n|^p + |y_n|^p = 2^p (\sum_{n=1}^\infty |x_n|^p + \sum_{n=1}^\infty |y_n|^p) < \infty$ . Also  $(x_n + y_n) \in l^p$ .

□

**Theorem 3.** Holdesche Ungleichung

1. Sind  $(x_n) \in l'$  und  $(y_n) \in l^\infty$ , so ist  $(x_n y_n) \in l'$  und  $\|(x_n y_n)\|_{l'} \leq \|(x_n)\|_{l'} \|(y_n)\|_\infty$ .
2. Sei  $1 < p < \infty$  und  $q = \frac{p}{p-1}$ . Sind  $(x_n) \in l^p$  und  $(y_n) \in l^q$ , so ist  $(x_n y_n) \in l'$  und  $\|(x_n y_n)\|_{l'} \leq \|(x_n)\|_p \|(y_n)\|_q$ .

○

*Beweis.* 1. Es gilt  $\sum_{n=1}^\infty |x_n y_n| \leq \sum_{n=1}^\infty |x_n| \|(y_n)\|_\infty = \|(y_n)\|_\infty \sum_{n=1}^\infty |x_n| = \|(y_n)\|_\infty \|(x_n)\|_{l'} < \infty$ .

2. Wir haben  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ . Sei  $a, b > 0$  und  $A = p \log a$  sowie  $B = q \log b$ . Die Funktion  $t \mapsto \exp(t)$  ist konvex, also  $\exp(\frac{1}{p}A + \frac{1}{q}B) \leq \frac{1}{p} \exp(A) + \frac{1}{q} \exp(B)$ . Somit

$$ab = \exp(\underbrace{\log a}_{=\frac{1}{p}A} + \underbrace{\log b}_{=\frac{1}{q}B}) \leq \frac{1}{p} \exp(\underbrace{p \log a}_A) + \frac{1}{q} \exp(\underbrace{q \log b}_B) = \frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} b^q.$$

Wir haben für  $(x_n) \in l^p, (y_n) \in l^q$  mit  $\|(x_n)\|_p = 1 = \|(y_n)\|_q$ . Es gilt

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n| |y_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{p} |x_n|^p + \frac{1}{q} |y_n|^q \right) = \underbrace{\frac{1}{p} \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p}_{=1} + \underbrace{\frac{1}{q} \sum_{n=1}^{\infty} |y_n|^q}_{=1} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1. \quad (1)$$

Sind  $(x_n) \in l^p, (y_n) \in l^q$  mit  $\|(x_n)\|_p \neq 0$  und  $\|(y_n)\|_q \neq 0$ , so ist mit (1)

$$\underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} |x_n y_n|}_{= \|(x_n y_n)\|} = \|(x_n)\|_p \|(y_n)\|_q \sum_{m=1}^{\infty} \frac{|x_m|}{\|(x_n)\|_p} \cdot \frac{|y_m|}{\|(y_n)\|_q} \leq \|(x_n)\|_p \|(y_n)\|_q \cdot 1.$$

Sind  $(x_n) \in l^p$  und  $(y_n) \in l^q$  mit  $\|(x_n)\|_p = 0$  oder  $\|(y_n)\|_q = 0$ , so ist  $(x_n y_n) \in l^1$  und  $\|(x_n y_n)\|_1 = 0$ . □

**Theorem 4.** *Minkowskische Ungleichung.* Sei  $1 \leq p < \infty$ . Für  $(x_n), (y_n) \in l^p$  gilt  $\|(x_n + y_n)\|_p \leq \|(x_n)\|_p + \|(y_n)\|_p$ . ◦

*Beweis.* Für  $p = 1$  erhalten wir die Ungleichung direkt. Sei  $p > 1$  und  $q = \frac{p}{p-1}$ . Weiterhin seien  $(x_n), (y_n) \in l^p$ . Nach Satz 2 ist  $(x_n + y_n) \in l^p$  und  $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n + y_n|^p = \sum_{n=1}^{\infty} (|x_n + y_n|^{p-1})^q$  konvergent<sup>1</sup>. Somit ist  $(|x_n + y_n|^{p-1}) \in l^q$ . Nach Satz 3 ist damit  $(|x_n| |x_n + y_n|^{p-1}) \in l^1$  und  $(|y_n| |x_n + y_n|^{p-1}) \in l^1$  und wir erhalten  $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n| |x_n + y_n|^{p-1} = \|(|x_n| |x_n + y_n|^{p-1})\|_1 \leq \|(x_n)\|_p \|(x_n + y_n)\|_p^{p-1}$ . Also  $\sum_{n=1}^{\infty} |y_n| |x_n + y_n|^{p-1} \leq \|(y_n)\|_p \|(x_n + y_n)\|_p^{p-1}$ . Somit  $\|(x_n + y_n)\|_p^p = \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{|x_n + y_n|^p}_{= |x_n + y_n| \cdot |x_n + y_n|^{p-1}} \leq \sum_{n=1}^{\infty} (|x_n| + |y_n|) \cdot |x_n + y_n|^{p-1} \leq \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| |x_n + y_n|^{p-1} + \sum_{n=1}^{\infty} |y_n| |x_n + y_n|^{p-1} \leq \|(x_n)\|_p \|(x_n + y_n)\|_p^{p-1} + \|(y_n)\|_p \|(x_n + y_n)\|_p^{p-1} = (\|(x_n)\|_p + \|(y_n)\|_p) \|(x_n + y_n)\|_p^{p-1}$ . Für  $\|(x_n + y_n)\|_p \neq 0$  liefert Division die Minkowski-Ungleichung. Für  $\|(x_n + y_n)\|_p = 0$  ist die Minkowski-Ungleichung trivial. □

**Theorem 5.** Für  $1 \leq p < \infty$  ist  $(l^p, \|\cdot\|_p)$  ein Banachraum. Ebenso ist  $(l^\infty, \|\cdot\|_\infty)$  ein Banachraum. ◦

*Beweis.* Die Behauptung für  $l^\infty$  wurde bereits in Beispiel 1 gezeigt. Sei  $1 \leq p < \infty$ . Nach Satz 2 ist  $l^p$  ein  $\mathbb{K}$ -Vektorraum. Für all  $(x_n) \in l^p, \lambda \in \mathbb{K}$  ist  $\|(\lambda x_n)\|_p = (\sum_{n=1}^{\infty} |\lambda x_n|^p)^{\frac{1}{p}} = |\lambda| (\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p)^{\frac{1}{p}} = |\lambda| \|(x_n)\|_p$ . Die Dreiecksungleichung gilt für  $\|\cdot\|_p$  nach Satz 4. Ist für  $(x_n) \in l^p, \|(x_n)\|_p = 0$ , so ist  $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p = 0$ , also  $x_n = 0$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ . Insgesamt ist  $\|\cdot\|_p$  also eine Norm auf  $l^p$ .

<sup>1</sup>Nebenrechnung:  $(p-1)q = p$ .

Sei  $(f_n)$  eine Cauchy-Folge in  $l^p$ . Wir verwenden für den Rest des Beweises die Schreibweise von Elementen aus  $l^p$  als Funktionen  $\mathbb{N} \mapsto \mathbb{K}$ . Für  $m, n, k \in \mathbb{N}$  gilt

$$|f_n(m) - f_k(m)| = (|f_n(m) - f_k(m)|^p)^{\frac{1}{p}} \leq \left( \sum_{l=1}^{\infty} |f_n(l) - f_k(l)|^p \right)^{\frac{1}{p}} = \|f_n - f_k\|_p.$$

Wie schon für  $l^\infty$  folgt, dass für jedes  $m \in \mathbb{N}$  die Folge  $(f_n(m))_n$  eine Cauchy-Folge in  $\mathbb{K}$  ist. Somit konvergiert für jedes  $m \in \mathbb{N}$  die Folge  $(f_n(m))_n$  und wir erhalten eine Funktion  $f^* : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$  mit  $f^*(m) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(m)$ . Sei  $\varepsilon > 0$  gegeben. Wähle  $N \in \mathbb{N}$  so dass  $\forall_{n,k > N} : \|f_n - f_k\| < \frac{\varepsilon}{2}$ . Somit gilt  $\forall_{n,k > N}$  und alle  $M \in \mathbb{N}$

$$\left( \sum_{m=1}^M |f_n(m) - f_k(m)|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \|f_n - f_k\|_p < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Für  $k \rightarrow \infty$  erhalten wir  $\forall_{n > N}, \forall_{M \in \mathbb{N}}$

$$\left( \sum_{m=1}^M |f_n(m) - f^*(m)|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Also  $\forall_{n > N}$

$$\left( \sum_{m=1}^{\infty} |f_n(m) - f^*(m)|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Somit  $f_n - f^* \in l^p$  für  $n > N$ , also wegen  $f^* = f_n - (f_n - f^*)$  auch  $f^* \in l^p$ . Desweiteren  $\forall_{n > N} : \|f_n - f^*\|_p < \varepsilon$ . Also konvergiert  $(f_n)$  gegen  $f^*$ . Damit ist  $(l^p, \|\cdot\|_p)$  ein Banachraum.

□

**Example 4.** 1. Sei  $X$  ein metrischer Raum mit Metrik  $d : X \times X \rightarrow [0, \infty)$ .

Wir bezeichnen  $C^b(X)$  den Vektorraum der stetigen, beschränkten Funktionen  $X \rightarrow \mathbb{K}$ .  $C^b(X)$  ist ein Unterraum von  $l^\infty(X)$ , also ist  $C^b(X)$  versehen mit der Supremumsnorm  $\|\cdot\|_\infty$  ein normierter Raum.

Die Konvergenz in  $C^b(X)$  bezüglich  $\|\cdot\|_\infty$  entspricht der gleichmäßigen Konvergenz wie wir sie aus der Analysis kennen.

Sei  $(f_n)$  eine Folge in  $C^b(X)$ , die gegen ein  $f^* \in l^\infty(X)$  konvergiert. Aus der Analysis wissen wir, dass dann  $f^*$  stetig, also  $f^* \in C^b(X)$  ist. Also ist  $C^b(X)$  abgeschlossener Unterraum von  $l^\infty(X)$  und  $(C^b(X), \|\cdot\|_\infty)$  ist ein Banachraum.

Ist der Raum  $X$  kompakt, z.B. eine kompakte Teilmenge des  $\mathbb{R}^n$  mit der euklidischen Metrik, so sind alle stetigen Funktionen  $X \rightarrow \mathbb{K}$  beschränkt, also  $C^b(X) = C(X) = \{f : X \rightarrow \mathbb{K} | f \text{ stetig}\}$ .

2. Sei  $a, b \in \mathbb{R}, a < b$ . Wir bezeichnen mit  $C^1([a, b])$  den Vektorraum der stetig differenzierbaren Funktionen  $[a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ . Es ist  $C^1([a, b]) \subset l^\infty([a, b])$ .

Der Raum  $(C^1([a, b]), \|\cdot\|_\infty)$  ist kein Banachraum (siehe 3. Übungsblatt). Wir können auf  $C^1([a, b])$  jedoch eine andere Norm definieren und zwar  $\|f\| := \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$ . Mit dieser Norm versehen ist  $C^1([a, b])$  ein Banachraum. Dies folgt aus dem nächsten Beispiel.

3. Sei  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  eine offene Menge. Ist  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{K}$  eine  $r$ -mal stetig differenzierbare Funktion so verwenden wir die Multiindexschreibweise  $D^\alpha f$  mit  $\alpha \in \mathbb{N}_0^n$  für die partielle Ableitung

$$\frac{\partial^{\alpha_1} \partial^{\alpha_2} \dots \partial^{\alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}} f(x_1, \dots, x_n)$$

der Ordnung  $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n \leq r$ ,  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ . Ist  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  offen und beschränkt, so können wir durch

$C^r(\overline{\Omega}) = \{f : \Omega \rightarrow \mathbb{K} : f \text{ ist } r\text{-mal stetig differenzierbar, für alle Multiindizes } \alpha \in \mathbb{N}_0^n \text{ mit } 0 \leq |\alpha| \leq r \text{ ist } D^\alpha f \text{ stetig}\}$

einen Unterraum von  $l^\infty(\Omega)$  definieren. Durch

$$\|f\| := \sum_{\alpha \in \mathbb{N}_0^n, 0 \leq |\alpha| \leq r} \|D^\alpha f\|_\infty$$

für  $f \in C^r(\overline{\Omega})$  definieren wir eine Norm auf  $C^r(\overline{\Omega})$  (siehe 2. Übungsblatt). Der normierte Raum  $(C^r(\overline{\Omega}), \|\cdot\|)$  ist ein Banachraum.

△

## 1.1 Eigenschaften normierter Räume

**Lemma 1.** Sei  $(X, \|\cdot\|)$  ein normierter Raum. Es gilt

1.  $\forall v, w \in X : |||v|| - ||w||| \leq \|v - w\|$ .
2. Die Abbildung  $\|\cdot\| : x \mapsto [0, \infty)$  ist stetig.
3. Eine Folge  $(x_n)$  in  $X$  konvergiert genau dann gegen  $x \in X$  wenn  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0$ .

■

*Beweis.* Für 1 und 2 siehe erstes Übungsblatt. 3 folgt direkt aus der entsprechenden Eigenschaft für metrische Räume.

□

**Theorem 6.** Sei  $(X, \|\cdot\|)$  ein metrischer Raum.

1. Konvergiert die Folge  $(x_n)$  in  $X$  gegen  $x \in X$  und die Folge  $(y_n)$  in  $X$  gegen  $y \in X$ , so konvergiert für alle  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$  die Folge  $(\lambda x_n + \mu y_n)$  gegen  $\lambda x + \mu y$ .
2. Ist  $U$  ein Unterraum von  $X$ , so ist auch  $\overline{U}$  ein Unterraum von  $X$ .



◦

*Beweis.* 1. Für alle  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  gilt  $\|\lambda x_n + \mu y_n - (\lambda x + \mu y)\| \leq \|\lambda x_n - \lambda x + \mu y_n - \mu y\| \leq |\lambda| \|x_n - x\| + |\mu| \|y_n - y\|$ . Mit Lemma 1 (3) folgt dann die Behauptung.

2. Sei  $x, y \in \overline{U}$ . Dann gibt es Folgen  $(x_n), (y_n)$  in  $U$  mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$ . Sei  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ . Da  $U$  linearer Unterraum von  $X$  ist, ist  $(\lambda x_n + \mu y_n)$  Folge in  $U$ . Nach 1 ist  $(\lambda x_n + \mu y_n)$  konvergent mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda x_n + \mu y_n = \lambda x + \mu y$ . Also  $\lambda x + \mu y \in \overline{U}$ . Da  $U \neq \emptyset$  und  $\overline{U} \subset \overline{U}$  ist  $\overline{U} \neq \emptyset$ . Damit ist  $\overline{U}$  Unterraum von  $X$ .

□

**Definition 4.** Sei  $X$  ein  $\mathbb{K}$ -Vektorraum. Zwei Normen  $\|\cdot\|_a, \|\cdot\|_b$  auf  $X$  heißen äquivalent, falls es  $m, M > 0$  gibt, so dass  $\forall_{v \in X} m\|v\|_a \leq \|v\|_b \leq M\|v\|_a$ .

□

**Lemma 2.** Die Äquivalenz von Normen auf einem  $\mathbb{K}$ -Vektorraum  $X$  definiert eine Äquivalenzrelation auf der Menge der Normen auf  $X$ .

■

*Beweis.* Siehe 2. Übungsblatt.

□

**Theorem 7.** Sei  $X$  ein  $\mathbb{K}$ -Vektorraum und  $\|\cdot\|_a, \|\cdot\|_b$  Normen auf  $X$ . Die folgenden Aussagen sind äquivalent:

1. Die Normen  $\|\cdot\|_a$  und  $\|\cdot\|_b$  sind äquivalent.
2. Eine Folge  $(x_n)$  in  $X$  konvergiert genau dann gegen  $x \in X$  bzgl.  $\|\cdot\|_a$ , wenn sie gegen  $x$  bzgl.  $\|\cdot\|_b$  konvergiert.
3. Eine Folge  $(x_n)$  in  $X$  konvergiert genau dann gegen 0 bzgl.  $\|\cdot\|_a$ , wenn sie gegen 0 bzgl.  $\|\cdot\|_b$  konvergiert.

◦

*Beweis.* 1  $\implies$  2: Sei  $m, M, \widetilde{m}, \widetilde{M} > 0$  mit  $\forall_{v \in X} : m\|v\|_a \leq \|v\|_b \leq M\|v\|_a$  und  $\forall_{v \in X} : \widetilde{m}\|v\|_b \leq \|v\|_a \leq \widetilde{M}\|v\|_b$  (siehe Lemma 2). Dann gilt für Folge  $(x_n)$  in  $X$  und  $x \in X$  stets  $\|x_n - x\|_a \leq \widetilde{M}\|x_n - x\|_b$  und  $\|x_n - x\|_b \leq M\|x_n - x\|_a$ .

2  $\implies$  3: 3 ist Sonderfall von 2.

3  $\implies$  1: Angenommen  $\|\cdot\|_a$  und  $\|\cdot\|_b$  sind nicht äquivalent. Dann gibt es kein  $M > 0$  oder kein  $\widetilde{M} > 0$  so dass für alle  $v \in X$ :  $\|v\|_b \leq M\|v\|_a$  und  $\|v\|_a \leq \widetilde{M}\|v\|_b$ .

□

## 2 Übungsblätter

### 2.1 Übungsblatt 1

#### 2.1.1 Aufgabe 1.1

Zunächst zeigen wir:  $\forall x, y \in X : ||x|| - ||y|| \leq ||x - y||$ :

$$||x|| - ||y|| = ||x - y + y|| - ||y|| \leq ||x - y|| + ||y|| - ||y|| = ||x - y||$$

$$||y|| - ||x|| = ||y - x + x|| - ||x|| \leq ||y - x|| + ||x|| - ||x|| = ||x - y||$$

Dies impliziert die Ungleichung.

Sei  $x \in X$  gegeben und  $\varepsilon > 0$ . Wähle  $\delta = \varepsilon$ . Dann gilt für alle  $y \in U_\delta(x) : ||x|| - ||y|| \leq ||x - y|| < \delta = \varepsilon$ . Damit ist die Abbildung  $x \mapsto ||x||$  stetig.

#### 2.1.2 Aufgabe 1.2

Sei  $v \in X$  und  $r > 0$ . Ist  $(w_n)$  Folge in  $U_r(v)$ , die gegen  $w \in X$  konvergiert, so folgt wegen der Stetigkeit von  $x \mapsto ||x||$ , dass  $||w - v|| = \lim_{n \rightarrow \infty} ||w_n - v|| \leq r$ . Also  $\overline{U_r(v)} \subset \{w \in X : ||w - v|| \leq r\}$ . Sei  $w \in X$  mit  $||w - v|| = r$ . Definiere Folge  $(w_n)$  durch  $w_n = v + (1 - \frac{1}{n})(w - v)$ . Da  $||w - w_n|| = ||w - v - (1 - \frac{1}{n})(w - v)|| = ||w - v + \frac{w}{n} - v + v - \frac{v}{n}|| = ||\frac{1}{n}(w - v)|| = \frac{1}{n}||w - v|| = \frac{1}{n}r \rightarrow_{n \rightarrow \infty} 0$  konvergiert  $(w_n)$  gegen  $w$ . Weiterhin ist  $||v - w_n|| = ||v - v - (1 - \frac{1}{n})(w - v)|| = (1 - \frac{1}{n})||w - v|| = (1 - \frac{1}{n})r < r$  also  $(w_n)$  Folge in  $U_r(v)$ . Damit  $\{w \in X : ||w - v|| \leq r\} \subset \overline{U_r(v)}$  und es folgt die Gleichheit der Mengen. Gegenbeispiel für metrische Räume: Sei  $X = \mathbb{Z}$  und  $d(v, w) = |v - w|$ .  $X$  ist mit  $d$  ein metrischer Raum und es gilt  $\overline{\{w \in X : d(w, 0) < 1\}} = \overline{\{0\}} = \{0\} \neq \{-1, 0, 1\} = \{w \in X : d(w, 0) \leq 1\}$ .

#### 2.1.3 Aufgabe 1.3

Behauptung: Für  $1 < p < q < \infty$  gilt:  $l^1 \subset l^p \subset l^q \subset l^\infty$ . Beweis: Sei  $(x_n) \in l^p$  für  $1 \leq p < \infty$ . Dann ist die Reihe  $\sum_{n=1}^\infty |x_n|^p$  konvergent. Damit konvergiert  $(|x_n|^p)_{n \in \mathbb{N}}$  und somit  $(x_n)$  gegen 0. Also ist  $(x_n)$  beschränkt und  $(x_n) \in l^\infty$ .

Sei  $q \in \mathbb{R}$  mit  $p < q$ . Da  $(x_n)$  gegen 0 konvergiert, gibt es  $N \in \mathbb{N}$ , so dass für alle  $n > N$ :  $|x_n| < 1$ . Damit ist für alle  $n > N$ :  $|x_n|^q < |x_n|^p$ . Da  $\sum_{n=1}^\infty |x_n|^p$  konvergiert ist nach dem Majorantenkriterium auch  $\sum_{n=1}^\infty |x_n|^q$  konvergent und  $(x_n) \in l^q$ .

Beweis, dass die Inklusionen echt sind: Sei  $p \in \mathbb{R}$  mit  $1 \leq p < \infty$ . Die konstante Folge  $(a_n)$ ,  $\forall n \in \mathbb{N} a_n = 1$ , ist beschränkt, also  $(a_n) \in l^\infty$ . Da  $\sum_{n=1}^\infty |1|^p$  divergent, ist  $(a_n) \notin l^p$ . Sei  $q \in \mathbb{R}$  mit  $p < q$ . Wähle  $\alpha \in (\frac{1}{q}, \frac{1}{p})$ . Dann ist  $\alpha p < \frac{1}{p}p = 1$  und  $\alpha q > \frac{1}{q}q = 1$ . Betrachte die Folge  $x = (\frac{1}{n^\alpha})_{n \in \mathbb{N}}$ . Die Reihe  $\sum_{n=1}^\infty (\frac{1}{n^\alpha})^p = \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^{\alpha p}}$  ist divergent. Die Reihe  $\sum_{n=1}^\infty (\frac{1}{n^\alpha})^q = \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^{\alpha q}}$  ist konvergent. Damit  $x \notin l^p$  und  $x \in l^q$ .

### 2.1.4 Aufgabe 1.4

Wir verwenden wieder die Schreibweise von Folgen als Funktionen  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$ . Wir definieren  $f_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$  für  $n \in \mathbb{N}$  durch

$$f_n(m) = \begin{cases} \frac{1}{m} & (m < n) \\ 0 & (m \geq n) \end{cases}$$

(also  $(0,0,0,\dots)$ ,  $(1,0,0,0,\dots)$ ,  $(1, \frac{1}{2}, 0, 0, 0, \dots)$ , ...) und  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$ ,  $f(m) = \frac{1}{m}$ . Es ist  $(f_n)$  Folge in  $d$  und  $f \in c_0 \setminus d$ . Da

$$(f_n - f)(m) = \begin{cases} 0 & m < n \\ -\frac{1}{m} & m \geq n \end{cases}$$

folgt  $\|f_n - f\|_\infty = \frac{1}{n}$ . Also konvergiert  $(f_n)$  in  $(c_0, \|\cdot\|_\infty)$  gegen  $f$ . Damit ist  $d$  nicht abgeschlossen in  $(c_0, \|\cdot\|_\infty)$ . Somit ist  $(d, \|\cdot\|_\infty)$  nicht vollständig (nach Satz 1).

### 2.1.5 Aufgabe 2.1

1. Wir überprüfen die drei Normaxiome.

- (a) Sei  $\lambda \in \mathbb{K}$ ,  $f \in C^r(\overline{\Omega})$ . Es gilt  $\|\lambda f\| = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}_0^n, 0 \leq |\alpha| \leq r} \|D^\alpha(\lambda f)\|_\infty = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}_0^n, 0 \leq |\alpha| \leq r} \|\lambda D^\alpha f\|_\infty = |\lambda| \sum_{\alpha \in \mathbb{N}_0^n, 0 \leq |\alpha| \leq r} \|D^\alpha f\|_\infty = |\lambda| \|f\|$ .
- (b) Seien  $f, g \in C^r(\overline{\Omega})$ . Es gilt  $\|f + g\| = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}_0^n, 0 \leq |\alpha| \leq r} \|D^\alpha(f + g)\|_\infty = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}_0^n, 0 \leq |\alpha| \leq r} \|(D^\alpha f) + (D^\alpha g)\|_\infty \leq \sum_{\alpha \in \mathbb{N}_0^n, 0 \leq |\alpha| \leq r} (\|D^\alpha f\|_\infty + \|D^\alpha g\|_\infty) = \|f\| + \|g\|$ .
- (c) Sei  $f \in C^r(\overline{\Omega})$ . Es sei  $\|f\| = 0$ . Also  $\sum_{\alpha \in \mathbb{N}_0^n, 0 \leq |\alpha| \leq r} \|D^\alpha f\|_\infty = 0$ . Damit folgt  $\|D^0 f\|_\infty = 0$  und somit  $\|f\|_\infty = 0$ . Da  $f \in l^\infty(\Omega)$ , folgt für alle  $x \in \Omega$  dass  $f(x) = 0$ .
- (d) Wir zeigen zuerst, dass  $f$  auf  $\Omega$  stetig fortsetzbar ist. Konvergiere  $(f_m)$  auf  $\Omega$  gleichmäßig gegen  $f$ , mit  $(f_m)$  Folge wie in Aufgabenstellung und  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Dann ist für alle  $x \in \Omega$ :  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ . Die Folge  $(f_m|_\Omega)_{m \in \mathbb{N}}$  ist konvergent in  $(l^\infty(\Omega), \|\cdot\|_\infty)$ , also Cauchy-Folge in  $(l^\infty(\Omega), \|\cdot\|_\infty)$ . Da für alle  $k, m \in \mathbb{N}$ :

$$\underbrace{\sup_{x \in \Omega} |f_k(x) - f_m(x)|}_{\|f_k|_\Omega - f_m|_\Omega\|_\infty} = \underbrace{\sup_{x \in \overline{\Omega}} |f_k(x) - f_m(x)|}_{\|f_k - f_m\|_\infty}$$

ist  $(f_m)_{m \in \mathbb{N}}$  Cauchy-Folge in  $(l^\infty(\overline{\Omega}), \|\cdot\|_\infty)$ . Da dieser Raum ein Banachraum ist, gibt es  $\tilde{f} \in l^\infty(\overline{\Omega})$  mit  $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - \tilde{f}\|_\infty = 0$ . Also konvergiert  $(f_m)$  gleichmäßig gegen  $\tilde{f}$  und damit ist  $\tilde{f}$  stetig. Da für alle  $x \in \Omega$  gilt:

$$\tilde{f}(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = f(x).$$

Damit ist  $f$  stetig fortsetzbar auf  $\bar{\Omega}$ . Analog für  $g_j$ . Nun zeigen wir die Differenzierbarkeit von  $f$  nach  $x_j$ : Wir schreiben  $f(\_, x_j, \_)$  für  $f(x_1, \dots, x_j, \dots, x_n)$  und  $f(\_, x_j + h, \_)$  für  $f(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j + h, x_{j+1}, \dots, x_n)$ . Sei  $j \in \{1, \dots, n\}$ ,  $x = (x_1, \dots, x_n) \in \Omega$ . Wähle  $r > 0$ , so dass  $U_r(x) \subset \Omega$  mit  $U_r(x)$  bezüglich  $\|\cdot\|_2$ -Norm auf  $\mathbb{R}^n$ . Nach dem Mittelwertsatz gibt es für jedes  $h \in (-r, r)$  und  $m \in \mathbb{N}$  ein  $\zeta_{h,m} \in [-|h|, |h|]$  mit

$$\left| f_m(\_, x_j + h, \_) - f_m(\_, x_j, \_) - h \frac{d}{dx_j} f_m(\_, x_j + \zeta_{h,m}, \_) \right| = 0 \quad (2)$$

$(\zeta_{h,m})_{m \in \mathbb{N}}$  ist Folge in  $[-|h|, |h|]$ . Durch Übergang zu einer Teilfolge von  $(f_m)$  können wir o.B.d.A. annehmen, dass  $(\zeta_{h,m})_{m \in \mathbb{N}}$  gegen ein  $\zeta_h^* \in [-|h|, |h|]$  konvergiert. Mit der Abschätzung

$$\begin{aligned} & \left| \frac{d}{dx_j} f_m(\_, x_j + \zeta_{h,m}, \_) - g_j(\_, x_j + \zeta_h^*, \_) \right| \\ & \leq \left| \frac{d}{dx_j} f_m(\_, x_j + \zeta_{h,m}, \_) - g_j(\_, x_j + \zeta_{h,m}, \_) \right| \\ & \quad + |g_j(\_, x_j + \zeta_{h,m}, \_) - g_j(\_, x_j + \zeta_h^*, \_)| \\ & \leq \underbrace{\left\| \frac{d}{dx_j} f_m - g_j \right\|_\infty}_{\rightarrow 0} + \underbrace{|g_j(\_, x_j + \zeta_{h,m}, \_) - g_j(\_, x_j + \zeta_h^*, \_)|}_{\rightarrow 0}. \end{aligned}$$

folgt, dass  $\left( \frac{d}{dx_j} f_m(\_, x_j + \zeta_{h,m}, \_) \right)_{m \in \mathbb{N}}$  gegen  $g_j(\_, x_j + \zeta_h^*, \_)$  konvergiert. Für  $m \rightarrow \infty$  folgt aus (2), dass

$$|f(\_, x_j + h, \_) - f_j(\_, x_j, \_) - h g_j(\_, x_j + \zeta_h^*, \_)| = 0.$$

Sei  $(h_k)_{k \in \mathbb{N}}$  Folge in  $(-r, r)$  mit  $h_k \rightarrow 0$  für  $k \rightarrow \infty$  mit  $h_k \neq 0$  für alle  $k \in \mathbb{N}$ . Dann folgt mit (2)

$$\begin{aligned} & \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(\_, x_j + h_k, \_) - f(\_, x_j, \_)}{h_k} \\ & = \lim_{k \rightarrow \infty} g_j(\_, x_j + \underbrace{\zeta_{h_k}^*}_{\rightarrow 0 \text{ (} k \rightarrow \infty \text{)}}, \_) \\ & = g_j(\_, x_j, \_) \end{aligned}$$

mit  $|\zeta_{h_k}^*| \leq |h_k|$  und  $g_j$  stetig. Somit ist  $f$  nach  $x_j$  partiell differenzierbar und  $\frac{d}{dx_j} f(x) = g_j(x)$ .

### 2.1.6 Aufgabe 2.3

1. Seien  $p, q \in \mathbb{R}$  mit  $1 \leq p < q$ . Wähle  $\alpha \in (\frac{1}{q}, \frac{1}{p})$ . Dann gilt  $\alpha p < 1$  und  $\alpha q > 1$ . Wir schreiben Elemente aus  $l^p$  als Funktionen  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$ . Wir

definieren für  $n \in \mathbb{N}$  die Funktionen  $f_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$  durch

$$f_n(m) = \begin{cases} \frac{1}{m^\alpha} & m \leq n, \\ 0 & m > n. \end{cases}$$

Da  $f_n \in d$  für alle  $n \in \mathbb{N}$  ist  $f_n \in l^p$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ . Es ist die Folge  $(\|f_n\|_p^p)_{n \in \mathbb{N}}$  divergent, da  $\|f_n\|_p^p = \sum_{m=1}^n \frac{1}{m^{\alpha p}}$  mit  $\alpha p < 1$ . Die Folge  $(\|f_n\|_q^q)_{n \in \mathbb{N}}$  ist konvergent, da  $\|f_n\|_q^q = \sum_{m=1}^n \frac{1}{m^{\alpha q}}$  mit  $\alpha q > 1$ . Also ist die Folge  $(\|f_n\|_p)_{n \in \mathbb{N}}$  divergent und die Folge  $(\|f_n\|_q)_{n \in \mathbb{N}}$  ist konvergent. Damit können  $\|\cdot\|_p$  und  $\|\cdot\|_q$  nicht äquivalent sein, denn sonst gäbe es  $M > 0 \forall n \in \mathbb{N} : \|f_n\|_p \leq M \|f_n\|_q$ . (Unter Verwendung von Aufgabe 2.2.) Widerspruch.

2. Sei  $p \in \mathbb{R}$ ,  $1 \leq p$ . Für  $n \in \mathbb{N}$  definieren wir  $f_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$  durch

$$f_n(m) = \begin{cases} 1 & m \leq n, \\ 0 & m > n. \end{cases}$$

Wieder ist für alle  $n \in \mathbb{N}$ :  $f_n \in d \subset l^p$ , also  $(f_n)$  Folge in  $l^p$ . Es ist  $\|f_n\|_\infty = 1$  für alle  $n \in \mathbb{N}$  und

$$\|f_n\|_p = \left( \sum_{m=1}^n 1^p \right)^{\frac{1}{p}} = n^{\frac{1}{p}}.$$

Damit ist  $(\|f_n\|_\infty)_{n \in \mathbb{N}}$  konvergent und  $(\|f_n\|_p)_{n \in \mathbb{N}}$  divergent. Analog zur obigen Aufgabe folgt, dass  $\|\cdot\|_\infty$  und  $\|\cdot\|_p$  nicht äquivalent sind.