



Lista 1 - Estrutura de Repetição

Exercícios complementares

- 1) Apresentar todos os números entre 20 e 35 separados por tabulação.
- 2) Apresentar os múltiplos de 5, entre 5 e 50 separados por tabulação.
- 3) Apresentar os números entre 0 e 4, com intervalo de 0.25 entre eles, separados por tabulação.
- 4) Apresentar os números entre 10 e 0, ou seja, em ordem decrescente, separados por tabulação.
- 5) Uma indústria fabrica roupas categorizadas em masculinas, femininas e infantis. Ler a quantidade e a respectiva categoria (M, F ou I). Após o loop, calcular e mostrar o percentual de produtos por categoria. Validar para que seja informada uma categoria válida. Finalizar a leitura quando informado um valor 0 ou negativo para a quantidade. Ler inicialmente a quantidade e depois a categoria. Se informada uma quantidade negativa, não ler a categoria.

Exemplo:

```
Informe a quantidade: 2
Informe a categoria (M/m/F/f/I/i): M
Informe a quantidade: 4
Informe a categoria (M/m/F/f/I/i): m
Informe a quantidade: 3
Informe a categoria (M/m/F/f/I/i): f
Informe a quantidade: 2
Informe a categoria (M/m/F/f/I/i): F
Informe a quantidade: 5
Informe a categoria (M/m/F/f/I/i): I
Informe a quantidade: 7
Informe a categoria (M/m/F/f/I/i): u
Categoria invalida
Informe a categoria (M/m/F/f/I/i): i
Informe a quantidade: 0
```

```
26.1% masculino
21.7% feminino
52.2% infantil
```

6) Elaborar um programa para mostrar os números pares entre 20 e 100. Fazer a média dos valores desse intervalo que são divisíveis por 5.

7) Elaborar um programa para mostrar, em ordem decrescente, os números divisíveis por 3 entre 200 e 100.

8) Mostrar os números entre 10 e 0 (ordem decrescente) com intervalo de 0.5.

9) Elaborar um programa que permita ao usuário fornecer 30 números quaisquer e apresente:

- a) A soma dos 10 primeiros números.
- b) A soma do 11º número até o 20º número.
- c) A soma do 21º número até o 30º número.
- d) A soma de todos os números.

10) Apresente (separados por tabulação) os números entre 1 e 1000 que são divisíveis por 11 e ímpares.

11) Leia dois valores que representam os limites de um intervalo. O usuário pode informar os valores em ordem crescente ou decrescente. Validar para que o programa não aceite valores iguais para os limites do intervalo. Mostre os divisíveis por x e não divisíveis por y nesse intervalo. x e y são variáveis informadas pelo usuário.

Exemplo:

```
Informe um valor para o limite inferior de um intervalo: -15
Informe um valor para o limite superior de um intervalo: 15
Informe um valor para x: 2
Informe um valor para y: 3
-14    -10    -8    -4    -2    2    4    8    10    14
```

12) Apresente os pares entre 0 e 100, sem utilizar **if** dentro do **for**. Também calcule e forneça a média dos pares.

13) Leia 10 números e desses contar quantos são pares, quantos são ímpares e quantos são divisíveis por 7. Apresente essas quantidades.

14) Apresente os números pares entre 100 e 200. Contar quantos são ímpares e não divisíveis por 3 nesse intervalo. Faça a média dos valores pares e divisíveis por 5 do intervalo.

15) Apresente os múltiplos de 10 entre 1000 e 0 (ordem decrescente). Mostre os valores separados por uma tabulação e em colunas com 8 números por linha.