

Math Basics

Mathias Balling Christiansen

Last updated: December 28, 2023

Contents

1	SinCosTan	2
2	Brøkgeregler	3
3	Kvadratsætninger	3
4	Potensregneregler	4
5	Logaritmeregneregler	5
6	Vektorer i planen	6
7	Vektorer i rummet	8
8	Rummet	10
9	Complex Numbers	11
10	Differentialligninger	14
11	Differential- og integralregning	15
12	Funktioner	17
13	Procent- og rentesregning	18
14	SinCosTan relationer	19
15	SI prefixes	20

1 SinCosTan

Relationer for SinCosTan

$$\mathbf{SOH} \quad \sin \theta = \frac{\text{opposite}}{\text{hypotenuse}}$$

$$\mathbf{CAH} \quad \cos \theta = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypotenuse}}$$

$$\mathbf{TOA} \quad \tan \theta = \frac{\text{opposite}}{\text{adjacent}}$$

2 Brøkregler

$$a \cdot \frac{b}{c} = \frac{a \cdot b}{c}$$

$$\frac{a}{\frac{b}{c}} = \frac{a \cdot c}{b}$$

$$\frac{\frac{a}{b}}{c} = \frac{a}{b \cdot c}$$

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

3 Kvadratsætninger

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$$

$$(a - b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

4 Potensregeln

$$a^r \cdot a^s = a^{r+s}$$

$$\frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}$$

$$(a^r)^s = a^{r \cdot s}$$

$$(a \cdot b)^r = a^r \cdot b^r$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^r = \frac{a^r}{b^r}$$

$$a^0 = 1$$

$$a^{-r} = \frac{1}{a^r}$$

$$a^{-1} = \frac{1}{a}$$

$$\sqrt[r]{a} = a^{\frac{1}{r}}$$

$$\sqrt[s]{a^r} = a^{\frac{r}{s}}$$

$$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

$$\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$$

5 Logaritmeregneregler

Husk formler fra matundervisning med log

$$\log_n(a^x) = x \cdot \log_n(a)$$

$$\log_n(a \cdot b) = \log_n(a) + \log_n(b)$$

$$\log_n\left(\frac{a}{b}\right) = \log_n(a) - \log_n(b)$$

$$\log_n(a) = b \quad \Leftrightarrow \quad n^b = a$$

$$\log_n(n) = 1$$

$$n^{\log_n(x)} = x$$

$$n^{\frac{a}{b} \cdot \log_n(x)} = \sqrt[b]{x^a} = x^{\frac{a}{b}}$$

$$n^{\log_n(x) \pm c} = x \cdot n^{\pm c}$$

Naturlig logaritme

$$\ln = \log_e$$

$$\ln(e) = 1$$

$$e^{\ln(x)} = x$$

$$e^{\frac{a}{b} \cdot \ln(x)} = \sqrt[b]{x^a} = x^{\frac{a}{b}}$$

$$e^{\ln(x) \pm c} = x \cdot e^{\pm c}$$

6 Vektorer i planen

Koordinatsættet for \vec{a}

$$\vec{a} = a_1 \cdot \vec{i} + a_2 \cdot \vec{j} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

Enhedsvektor

$$\vec{e} = \begin{pmatrix} \cos(v) \\ \sin(v) \end{pmatrix}$$

Længden af \vec{a}

$$|\vec{a}| = \left| \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

Multiplikation af \vec{a} med tallet k

$$k \cdot \vec{a} = k \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \cdot a_1 \\ k \cdot a_2 \end{pmatrix}$$

Summen af to vektorere

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \end{pmatrix}$$

Differensen af to vektorere

$$\vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 - b_1 \\ a_2 - b_2 \end{pmatrix}$$

Koordinatsættet for \overrightarrow{AB}

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{pmatrix}$$

Skalarproduktet (prikproduktet) af \vec{a} og \vec{b}

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(v)$$

$$\cos(v) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

Ortogonale vektorer

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \vec{a} \perp \vec{b}$$

Kvadratet på en vektor

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$$

Projektion af \vec{b} på \vec{a}

$$\vec{b}_a = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|^2} \cdot \vec{a}$$

Længden af projektionen

$$\vec{b}_a = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{a}|}$$

Tværvektoren til \vec{a}

$$\hat{\vec{a}} = \widehat{\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} -a_2 \\ a_1 \end{pmatrix}$$

Determinanten for vektorparret (\vec{a}, \vec{b})

$$\det(\vec{a}, \vec{b}) = \hat{\vec{a}} \cdot \vec{b} = a_1 b_2 - a_2 b_1 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$$

$$\det(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin(v)$$

Parallelle vektorer

$$\det(\vec{a}, \vec{b}) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \vec{a} \parallel \vec{b}$$

Arealet af parallelogrammet udspændt af \vec{a} og \vec{b}

$$A = |\det(\vec{a}, \vec{b})|$$

<https://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-a/vektorfunktioner>

7 Vektorer i rummet

Vektorprodukt (Krydsprodukt):

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} a_3 & b_3 \\ a_1 & b_1 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix}$$

Længden af vektorproduktet:

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin v$$

Længden af vektorproduktet er også lig arealet af det parallellogram der udspændes af \vec{a} og \vec{b}

$$A = |\vec{a} \times \vec{b}|$$

Parameterfremstilling for linjen l gennem punktet: $P_0(x_0, y_0, z_0)$ med retningsvektor $\vec{r} = \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix}$$

Afstand fra punktet P til linjen l der går gennem punktet P_0 med retningsvektor \vec{r}

$$dist(P, l) = \frac{|\vec{r} \times \overrightarrow{P_0P}|}{|\vec{r}|}$$

Ligningen for planen α gennem punktet $P_0(x_0, y_0, z_0)$ med normalvektor $\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$

$$\vec{n} \cdot \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{pmatrix} = 0$$

$$a \cdot (x - x_0) + b \cdot (y - y_0) + c \cdot (z - z_0) = 0$$

Afstand fra punktet $P(x_1, y_1, z_1)$ til planen α gennem punktet $P_0(x_0, y_0, z_0)$ med normalvektor

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$dist(P, \alpha) = \frac{\left| \vec{n} \cdot \begin{pmatrix} x_1 - x_0 \\ y_1 - y_0 \\ z_1 - z_0 \end{pmatrix} \right|}{|\vec{n}|}$$

Afstand fra punktet $P(x_1, y_1, z_1)$ til planen α med ligningen: $ax + by + cz + d = 0$

$$dist(P, \alpha) = \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Ligningen for en kugle med centrum $C(x_0, y_0, z_0)$ og radius r :

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2$$

<https://www.webmatematik.dk/lektioner/matematik-a/vektorer-i-3d>

8 Rummet

Cartesian koordinater

$$(x, y, z)$$

Cylindrisk koordinater

$$[r, \theta, z]$$

$$x = r \cdot \cos \theta$$

$$y = r \cdot \sin \theta$$

$$z = z$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x}$$

Sfæriske koordinater

$$[R, \phi, \theta]$$

$$x = R \cdot \sin \phi \cos \theta$$

$$y = R \cdot \sin \phi \sin \theta$$

$$z = R \cdot \cos \phi$$

$$R = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\tan \phi = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z}$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x}$$

9 Complex Numbers

Cartesian coordinate system

$$z = x + yi$$

$$w = a + bi$$

$$a, b, x, y \in \mathbb{R} \text{ og } z, w \in \mathbb{C}$$

$$i^2 = -1$$

$$|i| = 1$$

$$\frac{1}{i} = -j$$

$$\arg(i) = \frac{\pi}{2}$$

$$\operatorname{Re}(z) = x$$

$$\operatorname{Im}(z) = y$$


$$w + z = (a + x) + (b + y)i$$

$$w - z = (a - x) + (b - y)i$$

$$wz = (a + bi)(x + yi) = (ax - by) + (ay + bx)i$$

$$\frac{w}{z} = \frac{a + ib}{x + iy} = \frac{ax + by + i(bx - ay)}{x^2 + y^2}$$

Argand diagram:



Modulus

$$|w| = M = r = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$|wz| = |w| |z|$$

$$\left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|}$$

Argument

$$\arg(w) = \theta$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{b}{a} \right) \pm p \cdot \pi$$

$$p \in \{-1, 0, 1\}$$

$$\arg(wz) = \arg(w) + \arg(z)$$

$$\arg \frac{z}{w} = \arg(z) - \arg(w)$$

Polar representation

$$z = r \cdot \cos \theta + i \cdot r \cdot \sin \theta$$

$$z = r \cdot (\cos \theta + i \cdot \sin \theta)$$

$$z = r \cdot e^{i\theta}$$

Konjugeret

$$\overline{w} = a - bi$$

$$\overline{w + z} = \overline{w} + \overline{z}$$

$$\overline{wz} = \overline{w} \cdot \overline{z}$$

De Moivre's Theorem

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$$

$$r^n = (r \cdot e^{i\theta})^n = r^n \cdot e^{i\theta n} = r^n \cdot (\cos(\theta n) + i \cdot \sin(\theta n))$$

$$r^{\frac{p}{q}} = (r \cdot \cos \theta + i \cdot \sin \theta)^{\frac{p}{q}} = r^{\frac{p}{q}} \cdot (\cos(\frac{p}{q} \cdot \theta) + i \cdot \sin(\frac{p}{q} \cdot \theta))$$

10 Differentialaligninger

11 Differential- og integralregning

Definition af differentialkvotient

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Ligning for tangenten i punktet $P(x_0, f(x_0))$

$$y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$$

Konstantreglen

$$(k \cdot f(x))' = k \cdot f'(x)$$

Sumreglen

$$(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$$

Produktreglen

$$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

Kvotientreglen

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}$$

Kædereglen

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Regneregler for integration

$$\int f(x) dx = F(x) + c$$

$$\int k \cdot f(x) dx = k \cdot \int f(x) dx$$

$$\int f(x) \pm g(x) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int f(t) dt, \quad t = g(x)$$

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

$$\int_a^b k \cdot f(x) dx = k \cdot \int_a^b f(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) \pm g(x) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

$$\int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t) dt = [F(t)]_{g(a)}^{g(b)} = F(g(b)) - F(g(a))$$

12 Funktioner

13 Procent- og rentesregning

14 SinCosTan relationer

$$\cos^2 + \sin^2 = 1^2 \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\cos(x + 2\pi) = \cos(x) \qquad \sin(x + 2\pi) = \sin(x)$$

$$\cos(-x) = \cos(x) \qquad \sin(-x) = -\sin(x)$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos(x) \qquad \sin(\pi - x) = \sin(x)$$

$$\cos(x + y) = \cos x \cdot \cos y - \sin x \cdot \sin y$$


$$\cos(x - y) = \cos x \cdot \cos y + \sin x \cdot \sin y$$

$$\sin(x + y) = \cos x \cdot \sin y + \sin x \cdot \cos y$$

$$\sin(x - y) = \cos x \cdot \sin y - \sin x \cdot \cos y$$

$$\cos^2(x) - \sin^2(x) = \cos(2x)$$

15 SI prefixes



Yotta (**Y**): 10^{24}
Zetta (**Z**): 10^{21}
Exa (**E**): 10^{18}
Peta (**P**): 10^{15}
Tera (**T**): 10^{12}
Giga (**G**): 10^9
Mega (**M**): 10^6
Kilo (**k**): 10^3
Hecto (**h**): 10^2
Deka (**da**): 10^1
Deci (**d**): 10^{-1}
Centi (**c**): 10^{-2}
Milli (**m**): 10^{-3}
Micro (**μ**): 10^{-6}
Nano (**n**): 10^{-9}
Pico (**p**): 10^{-12}
Femto (**f**): 10^{-15}
Atto (**a**): 10^{-18}
Zepto (**z**): 10^{-21}
Yocto (**y**): 10^{-24}