

# Elementos de Cálculo Numérico/Cálculo Numérico

## Clase 3

Primer Cuatrimestre 2021

# Estimación del error

Por el desarrollo de Taylor

# Estimación del error

Por el desarrollo de Taylor

si  $a = f_t(t_0, x_0) + f_x(t_0, x_0) f(t_0, x_0)$

$$x(t_1) = x_0 + hf(t_0, x_0) + h^2/2 a + O(h^3)$$

# Estimación del error

Por el desarrollo de Taylor

si  $a = f_t(t_0, x_0) + f_x(t_0, x_0) f(t_0, x_0)$

$$x(t_1) = x_0 + hf(t_0, x_0) + h^2/2 a + O(h^3)$$

$$x_1 = x_0 + hf(t_0, x_0)$$

# Estimación del error

Por el desarrollo de Taylor

si  $a = f_t(t_0, x_0) + f_x(t_0, x_0) f(t_0, x_0)$

$$x(t_1) = x_0 + hf(t_0, x_0) + h^2/2 a + O(h^3)$$

$$x_1 = x_0 + hf(t_0, x_0)$$

$$\tilde{x}_1 = x_0 + hf(t_0, x_0) + h^2/4 a + O(h^3)$$

# Estimación del error

Por el desarrollo de Taylor

si  $a = f_t(t_0, x_0) + f_x(t_0, x_0) f(t_0, x_0)$

$$x(t_1) = x_0 + hf(t_0, x_0) + h^2/2 a + O(h^3)$$

$$x_1 = x_0 + hf(t_0, x_0)$$

$$\tilde{x}_1 = x_0 + hf(t_0, x_0) + h^2/4 a + O(h^3)$$

Los errores verifican

$$\epsilon_1 = x(t_1) - x_1 = h^2/2 a + O(h^3)$$

# Estimación del error

Por el desarrollo de Taylor

si  $a = f_t(t_0, x_0) + f_x(t_0, x_0) f(t_0, x_0)$

$$x(t_1) = x_0 + hf(t_0, x_0) + h^2/2 a + O(h^3)$$

$$x_1 = x_0 + hf(t_0, x_0)$$

$$\tilde{x}_1 = x_0 + hf(t_0, x_0) + h^2/4 a + O(h^3)$$

Los errores verifican

$$\epsilon_1 = x(t_1) - x_1 = h^2/2 a + O(h^3)$$

$$\tilde{\epsilon}_1 = x(t_1) - \tilde{x}_1 = h^2/4 a + O(h^3)$$

# Estimación del error

Por el desarrollo de Taylor

si  $a = f_t(t_0, x_0) + f_x(t_0, x_0) f(t_0, x_0)$

$$x(t_1) = x_0 + hf(t_0, x_0) + h^2/2 a + O(h^3)$$

$$x_1 = x_0 + hf(t_0, x_0)$$

$$\tilde{x}_1 = x_0 + hf(t_0, x_0) + h^2/4 a + O(h^3)$$

Los errores verifican

$$\epsilon_1 = x(t_1) - x_1 = h^2/2 a + O(h^3)$$

$$\tilde{\epsilon}_1 = x(t_1) - \tilde{x}_1 = h^2/4 a + O(h^3)$$

$$\tilde{x}_1 - x_1 = \epsilon_1 - \tilde{\epsilon}_1 = h^2/4 a + O(h^3)$$



# Estimación del error

Por el desarrollo de Taylor

si  $a = f_t(t_0, x_0) + f_x(t_0, x_0) f(t_0, x_0)$

$$x(t_1) = x_0 + hf(t_0, x_0) + h^2/2 a + O(h^3)$$

$$x_1 = x_0 + hf(t_0, x_0)$$

$$\tilde{x}_1 = x_0 + hf(t_0, x_0) + h^2/4 a + O(h^3)$$

Los errores verifican

$$\epsilon_1 = x(t_1) - x_1 = h^2/2 a + O(h^3)$$

$$\tilde{\epsilon}_1 = x(t_1) - \tilde{x}_1 = h^2/4 a + O(h^3)$$

$$\tilde{x}_1 - x_1 = \epsilon_1 - \tilde{\epsilon}_1 = h^2/4 a + O(h^3) = 1/2 \epsilon_1 + O(h^3)$$

# Euler modificado

Por la estimación del error local de truncamiento

$$\epsilon_1 = x(t_1) - x_1 = h^2/2 a + O(h^3)$$

$$\tilde{\epsilon}_1 = x(t_1) - \tilde{x}_1 = h^2/4 a + O(h^3)$$

$$\tilde{x}_1 - x_1 = h^2/4 a + O(h^3)$$

# Euler modificado

Por la estimación del error local de truncamiento

$$\epsilon_1 = x(t_1) - x_1 = h^2/2 a + O(h^3)$$

$$\tilde{\epsilon}_1 = x(t_1) - \tilde{x}_1 = h^2/4 a + O(h^3)$$

$$\tilde{x}_1 - x_1 = h^2/4 a + O(h^3)$$

Obtenemos  $\epsilon_1 = 2(\tilde{x}_1 - x_1) + O(h^3)$

# Euler modificado

Por la estimación del error local de truncamiento

$$\epsilon_1 = x(t_1) - x_1 = h^2/2 a + O(h^3)$$

$$\tilde{\epsilon}_1 = x(t_1) - \tilde{x}_1 = h^2/4 a + O(h^3)$$

$$\tilde{x}_1 - x_1 = h^2/4 a + O(h^3)$$

Obtenemos  $\epsilon_1 = 2(\tilde{x}_1 - x_1) + O(h^3)$

Método de Euler modificado:

$$\bar{x}_1 = x_1 + 2(\tilde{x}_1 - x_1) = 2\tilde{x}_1 - x_1$$

# Euler modificado

Por la estimación del error local de truncamiento

$$\epsilon_1 = x(t_1) - x_1 = h^2/2 a + O(h^3)$$

$$\tilde{\epsilon}_1 = x(t_1) - \tilde{x}_1 = h^2/4 a + O(h^3)$$

$$\tilde{x}_1 - x_1 = h^2/4 a + O(h^3)$$

Obtenemos  $\epsilon_1 = 2(\tilde{x}_1 - x_1) + O(h^3)$

Método de Euler modificado:

$$\bar{x}_1 = x_1 + 2(\tilde{x}_1 - x_1) = 2\tilde{x}_1 - x_1$$

Error de Euler modificado:  $\bar{\epsilon}_1 = x(t_1) - \bar{x}_1 = O(h^3)$

# Euler modificado: ejemplo

Problema:  $\dot{x}(t) = 3x(t) - 3x^2(t)$ ,  $x(0) = 0.01$

# Euler modificado: ejemplo

Problema:  $\dot{x}(t) = 3x(t) - 3x^2(t)$ ,  $x(0) = 0.01$



Solución exacta:  $x(t) = 0.01 e^{3t} / (1 + 0.01 (e^{3t} - 1))$

# Euler modificado: ejemplo

Problema:  $\dot{x}(t) = 3x(t) - 3x^2(t)$ ,  $x(0) = 0.01$

Solución exacta:  $x(t) = 0.01 e^{3t} / (1 + 0.01 (e^{3t} - 1))$

Soluciones numéricas y errores para  $h = 0.05$





# Método Runge-Kutta de segundo orden

$$k_1 = f(t_0, x_0)$$

# Método Runge-Kutta de segundo orden

$$k_1 = f(t_0, x_0)$$

$$k_2 = f(t_0 + h, x_0 + hk_1)$$

# Método Runge-Kutta de segundo orden

$$k_1 = f(t_0, x_0)$$

$$k_2 = f(t_0 + h, x_0 + h k_1)$$

Desarrollo de Taylor

$$k_2 = f(t_0, x_0) + h f_t(t_0, x_0) + h f_x(t_0, x_0) k_1 + O(h^2)$$

# Método Runge-Kutta de segundo orden

$$k_1 = f(t_0, x_0)$$

$$k_2 = f(t_0 + h, x_0 + hk_1)$$

Desarrollo de Taylor

$$\begin{aligned} k_2 &= f(t_0, x_0) + h f_t(t_0, x_0) + h f_x(t_0, x_0) k_1 + O(h^2) \\ &= f(t_0, x_0) + h (f_t(t_0, x_0) + f_x(t_0, x_0) f(t_0, x_0)) + O(h^2) \end{aligned}$$

# Método Runge-Kutta de segundo orden

$$k_1 = f(t_0, x_0)$$

$$k_2 = f(t_0 + h, x_0 + hk_1)$$

Desarrollo de Taylor

$$\begin{aligned} k_2 &= f(t_0, x_0) + h f_t(t_0, x_0) + h f_x(t_0, x_0) k_1 + O(h^2) \\ &= f(t_0, x_0) + h (f_t(t_0, x_0) + f_x(t_0, x_0) f(t_0, x_0)) + O(h^2) \end{aligned}$$

$$\frac{k_1 + k_2}{2} = f(t_0, x_0) + h/2 (f_t(t_0, x_0) + f_x(t_0, x_0) f(t_0, x_0)) + O(h^2)$$

# Método Runge-Kutta de segundo orden

$$k_1 = f(t_0, x_0)$$

$$k_2 = f(t_0 + h, x_0 + hk_1)$$

Desarrollo de Taylor

$$\begin{aligned} k_2 &= f(t_0, x_0) + h f_t(t_0, x_0) + h f_x(t_0, x_0) k_1 + O(h^2) \\ &= f(t_0, x_0) + h (f_t(t_0, x_0) + f_x(t_0, x_0) f(t_0, x_0)) + O(h^2) \end{aligned}$$

$$\frac{k_1 + k_2}{2} = f(t_0, x_0) + h/2 (f_t(t_0, x_0) + f_x(t_0, x_0) f(t_0, x_0)) + O(h^2)$$

Definimos  $x_1 = x_0 + h(k_1 + k_2)/2$

# Método Runge-Kutta de segundo orden

$$k_1 = f(t_0, x_0)$$

$$k_2 = f(t_0 + h, x_0 + h k_1)$$

Desarrollo de Taylor

$$\begin{aligned} k_2 &= f(t_0, x_0) + h f_t(t_0, x_0) + h f_x(t_0, x_0) k_1 + O(h^2) \\ &= f(t_0, x_0) + h (f_t(t_0, x_0) + f_x(t_0, x_0) f(t_0, x_0)) + O(h^2) \end{aligned}$$

$$\frac{k_1 + k_2}{2} = f(t_0, x_0) + h/2 (f_t(t_0, x_0) + f_x(t_0, x_0) f(t_0, x_0)) + O(h^2)$$

Definimos  $x_1 = x_0 + h(k_1 + k_2)/2$

Error local de truncamiento:  $x(t_1) - x_1 = O(h^3)$

# Método Runge-Kutta de cuarto orden

$$k_1 = f(t_0, x_0)$$



# Método Runge-Kutta de cuarto orden

$$k_1 = f(t_0, x_0)$$

$$k_2 = f(t_0 + h/2, x_0 + h/2 k_1)$$

# Método Runge-Kutta de cuarto orden

$$k_1 = f(t_0, x_0)$$

$$k_2 = f(t_0 + h/2, x_0 + h/2 k_1)$$

$$k_3 = f(t_0 + h/2, x_0 + h/2 k_2)$$

# Método Runge-Kutta de cuarto orden

$$k_1 = f(t_0, x_0)$$

$$k_2 = f(t_0 + h/2, x_0 + h/2 k_1)$$

$$k_3 = f(t_0 + h/2, x_0 + h/2 k_2)$$

$$k_4 = f(t_0 + h, x_0 + h k_3)$$

# Método Runge-Kutta de cuarto orden

$$k_1 = f(t_0, x_0)$$

$$k_2 = f(t_0 + h/2, x_0 + h/2 k_1)$$

$$k_3 = f(t_0 + h/2, x_0 + h/2 k_2)$$

$$k_4 = f(t_0 + h, x_0 + h k_3)$$

Definimos

$$x_1 = x_0 + \frac{h}{6}(k_1 + 2 k_2 + 2 k_3 + k_4)$$

# Método Runge-Kutta de cuarto orden

$$k_1 = f(t_0, x_0)$$

$$k_2 = f(t_0 + h/2, x_0 + h/2 k_1)$$

$$k_3 = f(t_0 + h/2, x_0 + h/2 k_2)$$

$$k_4 = f(t_0 + h, x_0 + h k_3)$$

Definimos

$$x_1 = x_0 + \frac{h}{6}(k_1 + 2 k_2 + 2 k_3 + k_4)$$

Error local de truncamiento:  $x(t_1) - x_1 = O(h^5)$

# Método Runge-Kutta de cuarto orden: verificación

Problema:  $\dot{x}(t) = x(t), x(0) = 1$

Solución:  $x(t) = e^t$

# Método Runge-Kutta de cuarto orden: verificación

Problema:  $\dot{x}(t) = x(t), x(0) = 1$

Solución:  $x(t) = e^t$

$x(t_1) = x(h) = e^h$

# Método Runge-Kutta de cuarto orden: verificación

Problema:  $\dot{x}(t) = x(t), x(0) = 1$

Solución:  $x(t) = e^t$

$$x(t_1) = x(h) = e^h = 1 + h + h^2/2 + h^3/6 + h^4/24 + O(h^5)$$



# Método Runge-Kutta de cuarto orden: verificación

Problema:  $\dot{x}(t) = x(t), x(0) = 1$

Solución:  $x(t) = e^t$

$$x(t_1) = x(h) = e^h = 1 + h + h^2/2 + h^3/6 + h^4/24 + O(h^5)$$

$$k_1 = 1$$

# Método Runge-Kutta de cuarto orden: verificación

Problema:  $\dot{x}(t) = x(t), x(0) = 1$

Solución:  $x(t) = e^t$

$$x(t_1) = x(h) = e^h = 1 + h + h^2/2 + h^3/6 + h^4/24 + O(h^5)$$

$$k_1 = 1$$

$$k_2 = 1 + h/2 k_1 = 1 + h/2$$

# Método Runge-Kutta de cuarto orden: verificación

Problema:  $\dot{x}(t) = x(t), x(0) = 1$

Solución:  $x(t) = e^t$

$$x(t_1) = x(h) = e^h = 1 + h + h^2/2 + h^3/6 + h^4/24 + O(h^5)$$

$$k_1 = 1$$

$$k_2 = 1 + h/2 k_1 = 1 + h/2$$

$$k_3 = 1 + h/2 k_2 = 1 + h/2 + h^2/4$$

# Método Runge-Kutta de cuarto orden: verificación

Problema:  $\dot{x}(t) = x(t), x(0) = 1$

Solución:  $x(t) = e^t$

$$x(t_1) = x(h) = e^h = 1 + h + h^2/2 + h^3/6 + h^4/24 + O(h^5)$$

$$k_1 = 1$$

$$k_2 = 1 + h/2 k_1 = 1 + h/2$$

$$k_3 = 1 + h/2 k_2 = 1 + h/2 + h^2/4$$

$$k_4 = 1 + h k_3 = 1 + h + h^2/2 + h^3/4$$

# Método Runge-Kutta de cuarto orden: verificación

Problema:  $\dot{x}(t) = x(t), x(0) = 1$

Solución:  $x(t) = e^t$

$$x(t_1) = x(h) = e^h = 1 + h + h^2/2 + h^3/6 + h^4/24 + O(h^5)$$

$$k_1 = 1$$

$$k_2 = 1 + h/2 k_1 = 1 + h/2$$

$$k_3 = 1 + h/2 k_2 = 1 + h/2 + h^2/4$$

$$k_4 = 1 + h k_3 = 1 + h + h^2/2 + h^3/4$$

$$x_1 = 1 + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

# Método Runge-Kutta de cuarto orden: verificación

Problema:  $\dot{x}(t) = x(t), x(0) = 1$

Solución:  $x(t) = e^t$

$$x(t_1) = x(h) = e^h = 1 + h + h^2/2 + h^3/6 + h^4/24 + O(h^5)$$

$$k_1 = 1$$

$$k_2 = 1 + h/2 k_1 = 1 + h/2$$

$$k_3 = 1 + h/2 k_2 = 1 + h/2 + h^2/4$$

$$k_4 = 1 + h k_3 = 1 + h + h^2/2 + h^3/4$$

$$x_1 = 1 + h + h^2/2 + h^3/6 + h^4/24$$

# Método Runge-Kutta de cuarto orden: verificación

Problema:  $\dot{x}(t) = x(t), x(0) = 1$

Solución:  $x(t) = e^t$

$$x(t_1) = x(h) = e^h = 1 + h + h^2/2 + h^3/6 + h^4/24 + O(h^5)$$

$$k_1 = 1$$

$$k_2 = 1 + h/2 k_1 = 1 + h/2$$

$$k_3 = 1 + h/2 k_2 = 1 + h/2 + h^2/4$$

$$k_4 = 1 + h k_3 = 1 + h + h^2/2 + h^3/4$$

$$x_1 = 1 + h + h^2/2 + h^3/6 + h^4/24$$

Error local de truncamiento:  $x(t_1) - x_1 = O(h^5)$

# Errores de Runge-Kutta (orden 2 y 4)


Problema:  $\dot{x}(t) = x(t), x(0) = 1, h = 0.1, 0.01$




# Errores de Runge-Kutta (orden 2 y 4)

Problema:  $\dot{x}(t) = x(t)$ ,  $x(0) = 1$ ,  $h = 0.1, 0.01$

Gráfico de errores



(a) R-K de orden 2



(b) R-K de orden 4

# Métodos de un paso

Método general:  $x_n = x_{n-1} + h \Phi(h, t_{n-1}, x_{n-1})$

# Métodos de un paso

Método general:  $x_n = x_{n-1} + h \Phi(h, t_{n-1}, x_{n-1})$

Consistencia:

$$\epsilon(h, t) = x(t + h) - x(t) - h \Phi(h, t, x(t)) = O(h^{p+1})$$

# Métodos de un paso

Método general:  $x_n = x_{n-1} + h \Phi(h, t_{n-1}, x_{n-1})$

Consistencia:

$$\epsilon(h, t) = x(t+h) - x(t) - h \Phi(h, t, x(t)) = O(h^{p+1})$$

Condición de Lipschitz:

$$|\Phi(h, t, x) - \Phi(h, t, \tilde{x})| \leq L|x - \tilde{x}|$$

# Métodos de un paso

Método general:  $x_n = x_{n-1} + h \Phi(h, t_{n-1}, x_{n-1})$

Consistencia:

$$\epsilon(h, t) = x(t+h) - x(t) - h \Phi(h, t, x(t)) = O(h^{p+1})$$

Condición de Lipschitz:

$$|\Phi(h, t, x) - \Phi(h, t, \tilde{x})| \leq L|x - \tilde{x}|$$

Convergencia:

$$E_n = |x(t_n) - x_n| \leq \epsilon(h, t_{n-1}) + (1 + Lh)E_{n-1}$$
$$\max_{0 \leq n \leq N} E_n \leq \frac{e^{LT} - 1}{L} \max_{1 \leq n \leq N} \frac{\epsilon(h, t_{n-1})}{h} = O(h^p)$$

# Métodos de un paso

## ■ Método de Euler:

$$\Phi(h, t, x) = f(t, x)$$

$$\epsilon(h, t) = O(h^2), \quad L_\Phi = L_f$$

# Métodos de un paso

## ■ Método de Euler:

$$\Phi(h, t, x) = f(t, x)$$

$$\epsilon(h, t) = O(h^2), \quad L_\Phi = L_f$$

## ■ Método de Euler modificado:

$$\Phi(h, t, x) = f(t + h/2, x + h/2 f(t, x))$$

$$\epsilon(h, t) = O(h^3), \quad L_\Phi = L_f(1 + h/2 L_f)$$

# Métodos de un paso

## ■ Método de Euler:

$$\begin{aligned}\Phi(h, t, x) &= f(t, x) \\ \epsilon(h, t) &= O(h^2), \quad L_\Phi = L_f\end{aligned}$$

## ■ Método de Euler modificado:

$$\begin{aligned}\Phi(h, t, x) &= f(t + h/2, x + h/2 f(t, x)) \\ \epsilon(h, t) &= O(h^3), \quad L_\Phi = L_f(1 + h/2 L_f)\end{aligned}$$

## ■ Runge-Kutta de orden 2:

$$\begin{aligned}\Phi(h, t, x) &= \frac{1}{2} (f(t, x) + f(t + h, x + h f(t, x))) \\ \epsilon(h, t) &= O(h^3), \quad L_\Phi = L_f(1 + h/2 L_f)\end{aligned}$$



# Métodos de un paso

- Runge-Kutta de orden 4:

# Métodos de un paso

- Runge-Kutta de orden 4:

$$k_1 = \Phi_1(h, t, x) = f(t, x)$$

# Métodos de un paso

## ■ Runge-Kutta de orden 4:

$$k_1 = \Phi_1(h, t, x) = f(t, x)$$

$$k_2 = \Phi_2(h, t, x) = f(t + h/2, x + h/2 \Phi_1(h, t, x))$$

# Métodos de un paso

## ■ Runge-Kutta de orden 4:

$$k_1 = \Phi_1(h, t, x) = f(t, x)$$

$$k_2 = \Phi_2(h, t, x) = f(t + h/2, x + h/2 \Phi_1(h, t, x))$$

$$k_3 = \Phi_3(h, t, x) = f(t + h/2, x + h/2 \Phi_2(h, t, x))$$

# Métodos de un paso

## ■ Runge-Kutta de orden 4:

$$k_1 = \Phi_1(h, t, x) = f(t, x)$$

$$k_2 = \Phi_2(h, t, x) = f(t + h/2, x + h/2 \Phi_1(h, t, x))$$

$$k_3 = \Phi_3(h, t, x) = f(t + h/2, x + h/2 \Phi_2(h, t, x))$$

$$k_4 = \Phi_4(h, t, x) = f(t + h, x + h \Phi_3(h, t, x))$$

# Métodos de un paso

## ■ Runge-Kutta de orden 4:

$$k_1 = \Phi_1(h, t, x) = f(t, x)$$

$$k_2 = \Phi_2(h, t, x) = f(t + h/2, x + h/2 \Phi_1(h, t, x))$$

$$k_3 = \Phi_3(h, t, x) = f(t + h/2, x + h/2 \Phi_2(h, t, x))$$

$$k_4 = \Phi_4(h, t, x) = f(t + h, x + h \Phi_3(h, t, x))$$

## ■ Constante de Lipschitz

# Métodos de un paso

## ■ Runge-Kutta de orden 4:

$$k_1 = \Phi_1(h, t, x) = f(t, x)$$

$$k_2 = \Phi_2(h, t, x) = f(t + h/2, x + h/2 \Phi_1(h, t, x))$$

$$k_3 = \Phi_3(h, t, x) = f(t + h/2, x + h/2 \Phi_2(h, t, x))$$

$$k_4 = \Phi_4(h, t, x) = f(t + h, x + h \Phi_3(h, t, x))$$

## ■ Constante de Lipschitz

$$L_{\Phi_1} = L_f$$

# Métodos de un paso

## ■ Runge-Kutta de orden 4:

$$k_1 = \Phi_1(h, t, x) = f(t, x)$$

$$k_2 = \Phi_2(h, t, x) = f(t + h/2, x + h/2 \Phi_1(h, t, x))$$

$$k_3 = \Phi_3(h, t, x) = f(t + h/2, x + h/2 \Phi_2(h, t, x))$$

$$k_4 = \Phi_4(h, t, x) = f(t + h, x + h \Phi_3(h, t, x))$$

## ■ Constante de Lipschitz

$$L_{\Phi_1} = L_f$$

$$L_{\Phi_2} = L_f(1 + h/2 L_{\Phi_1}) = L_f(1 + h/2 L_f)$$



# Métodos de un paso

## ■ Runge-Kutta de orden 4:

$$k_1 = \Phi_1(h, t, x) = f(t, x)$$

$$k_2 = \Phi_2(h, t, x) = f(t + h/2, x + h/2 \Phi_1(h, t, x))$$

$$k_3 = \Phi_3(h, t, x) = f(t + h/2, x + h/2 \Phi_2(h, t, x))$$

$$k_4 = \Phi_4(h, t, x) = f(t + h, x + h \Phi_3(h, t, x))$$

## ■ Constante de Lipschitz

$$L_{\Phi_1} = L_f$$

$$L_{\Phi_2} = L_f(1 + h/2 L_{\Phi_1}) = L_f(1 + h/2 L_f)$$

$$L_{\Phi_3} = L_f(1 + h/2 L_{\Phi_2}) = L_f(1 + h/2 L_f(1 + h/2 L_f))$$

# Métodos de un paso

## ■ Runge-Kutta de orden 4:

$$k_1 = \Phi_1(h, t, x) = f(t, x)$$

$$k_2 = \Phi_2(h, t, x) = f(t + h/2, x + h/2 \Phi_1(h, t, x))$$

$$k_3 = \Phi_3(h, t, x) = f(t + h/2, x + h/2 \Phi_2(h, t, x))$$

$$k_4 = \Phi_4(h, t, x) = f(t + h, x + h \Phi_3(h, t, x))$$

## ■ Constante de Lipschitz

$$L_{\Phi_1} = L_f$$

$$L_{\Phi_2} = L_f(1 + h/2 L_{\Phi_1}) = L_f(1 + h/2 L_f)$$

$$L_{\Phi_3} = L_f(1 + h/2 L_{\Phi_2}) = L_f(1 + h/2 L_f(1 + h/2 L_f))$$

$$L_{\Phi_4} = L_f(1 + h L_{\Phi_3}) = L_f(1 + h L_f(1 + h/2 L_f(1 + h/2 L_f)))$$

# Métodos de un paso

- Runge-Kutta de orden 4:

# Métodos de un paso

## ■ Runge-Kutta de orden 4:

$$\Phi(h, t, x) = \frac{1}{6}(\Phi_1(h, t, x) + 2\Phi_1(h, t, x) + 2\Phi_1(h, t, x) + \Phi_1(h, t, x))$$

# Métodos de un paso

- Runge-Kutta de orden 4:

$$\Phi(h, t, x) = \frac{1}{6}(\Phi_1(h, t, x) + 2\Phi_2(h, t, x) + 2\Phi_3(h, t, x) + \Phi_4(h, t, x))$$

- Constante de Lipschitz

$$L_\Phi = \frac{1}{6}(L_{\Phi_1} + 2L_{\Phi_2} + 2L_{\Phi_3} + L_{\Phi_4})$$

# Métodos de un paso

- Runge-Kutta de orden 4:

$$\Phi(h, t, x) = \frac{1}{6}(\Phi_1(h, t, x) + 2 \Phi_1(h, t, x) + 2 \Phi_1(h, t, x) + \Phi_1(h, t, x))$$

- Constante de Lipschitz

$$\begin{aligned} L_{\Phi} &= \frac{1}{6}(L_{\Phi_1} + 2 L_{\Phi_2} + 2 L_{\Phi_3} + L_{\Phi_4}) \\ &= L_f + \frac{h}{2} L_f^2 + \frac{h^2}{6} L_f^3 + \frac{h^3}{24} L_f^4 \end{aligned}$$

# Métodos de un paso

- Runge-Kutta de orden 4:

$$\Phi(h, t, x) = \frac{1}{6}(\Phi_1(h, t, x) + 2 \Phi_2(h, t, x) + 2 \Phi_3(h, t, x) + \Phi_4(h, t, x))$$

- Constante de Lipschitz

$$\begin{aligned} L_{\Phi} &= \frac{1}{6}(L_{\Phi_1} + 2 L_{\Phi_2} + 2 L_{\Phi_3} + L_{\Phi_4}) \\ &= L_f + \frac{h}{2} L_f^2 + \frac{h^2}{6} L_f^3 + \frac{h^3}{24} L_f^4 \leq \frac{e^{h L_f} - 1}{h} \end{aligned}$$

# Paso adaptativo

Métodos de un paso:  $x_n = x_{n-1} + h \Phi(h, t_{n-1}, x_{n-1})$



# Paso adaptativo

Métodos de un paso:  $x_n = x_{n-1} + h \Phi(h, t_{n-1}, x_{n-1})$

$$\epsilon(h, t) = a(t, x(t))h^{p+1} + O(h^{p+2})$$

# Paso adaptativo

Métodos de un paso:  $x_n = x_{n-1} + h \Phi(h, t_{n-1}, x_{n-1})$

$$\epsilon(h, t) = a(t, x(t))h^{p+1} + O(h^{p+2})$$

Si  $x_n = x_{n-1} + h \tilde{\Phi}(h, t_{n-1}, x_{n-1})$  se define

$$\begin{aligned}x_{n-1/2} &= x_{n-1} + \frac{h}{2} \Phi\left(\frac{h}{2}, t_{n-1}, x_{n-1}\right) \\x_n &= x_{n-1/2} + \frac{h}{2} \Phi\left(\frac{h}{2}, t_{n-1/2}, x_{n-1/2}\right)\end{aligned}$$

$$x_{n-1/2} = x_{n-1} + h \Phi(h, t_{n-1}, x_{n-1})$$