

Examen en curso

Introducción a la inmunología humana · libro completo

Pregunta 1 de 10 · sin responder

0 respondidas · 0 saltadas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Qué moléculas de adhesión y quimiocinas median selectivamente el tropismo (homing) de linfocitos T hacia la mucosa intestinal?

ELEGÍ UNA OPCIÓN

A Integrina alfa-4-beta-7 y receptor de quimiocinas CCR9.

B Selectina E y receptor de quimiocinas CCR4.

C Antígeno cutáneo linfocitario (CLA) y receptor CCR10.

D Integrina LFA-1 y receptor de quimiocinas CXCR5.



Siguiente →



Avanzar sola al responder

Saltear

Finalizar examen

🗂 Podés usar el teclado: números para elegir, flechas para avanzar



Aplazo

3/10 correctas (30%) · 7 incorrectas · 0 salteadas
Introducción a la inmunología humana · libro completo ·
00:00:56 · escala UBA, aprueba con nota 4

Reintentar 7 pendientes

Compartir · Armar otro examen

✓ Correcta

¿Cuál de las siguientes combinaciones describe correctamente la composición y la activación de la convertasa de C3 de la vía clásica del complemento?

✓ A. Complejo C4b2b generado por la escisión mediada por C1s. — tu respuesta
C1s escinde a C4 y C2 dando lugar a la convertasa C4b2b.

📄 Página 54 del PDF · La convertasa de C3 de la vía clásica está formada por C4b2b tras la escisión por C1s.

✗ Incorrecta

Durante la maduración de las células dendríticas inducida por PAMP, ¿qué cambio funcional y fenotípico característico ocurre?

✗ A. Aumento de la capacidad endocítica y descenso de CCR7. — tu respuesta

📄 Página 15 del PDF

La respuesta correcta no se revela. Reintentalo en el modo revancha hasta acertarla.

✗ Incorrecta

¿Qué función cumple la enzima AID durante la diferenciación del linfocito B en el centro germinal?

✗ A. Inicia la recombinación V(D)J en los precursores medulares. — tu respuesta

📄 Página 286 del PDF

La respuesta correcta no se revela. Reintentalo en el modo revancha hasta acertarla.

Mostrando 3 de 10 preguntas