

I. Calcular el valor de a y b para que el vector $\vec{v} = (a, -2, 1, b)$ se pueda expresar como combinación lineal de los vectores $\vec{u}_1 = (1, 2, 3, 4)$ y $\vec{u}_2 = (-1, 0, -2, 3)$.

Que \vec{v} sea combinación lineal de \vec{u}_1 y \vec{u}_2 quiere decir que se pueden encontrar dos escalares (nº reales) x, y tales que permitan expresar \vec{v} como combinación lineal de \vec{u}_1, \vec{u}_2 , es decir

$\vec{v} = x\vec{u}_1 + y\vec{u}_2$, sustituyendo $\vec{v}, \vec{u}_1, \vec{u}_2$ por los del problema resulta

$(a, -2, 1, b) = x(1, 2, 3, 4) + y(-1, 0, -2, 3)$ de donde se obtiene:

$$a = x - y; -2 = 2x + 0 \cdot y; 1 = 3x - 2y;$$

$b = 4x + 3y$, es decir tenemos 4 ecuaciones para obtener los valores de x, y , así que elegimos la 2ª y la 3ª de donde resulta

$$2x = -2 \Rightarrow \boxed{x = -1}$$

$$3x - 2y = 1 \Rightarrow 3(-1) - 2y = 1 \Rightarrow -2y = 1 + 3$$

$$y = \frac{4}{-2} = \boxed{-2}, \text{ de donde tomando la 1ª ecuación } a = x - y \Rightarrow$$

$$a = (-1) - (-2) = -1 + 2 = 1; \boxed{a = 1}; \text{ tomando la 4ª ecuación}$$

$$\text{tenemos } b = 4x + 3y = 4(-1) + 3(-2) \Rightarrow b = -4 - 6 = \boxed{-10}$$

$$\boxed{a = +1}; \boxed{b = -10}$$

Nota: En general, encontrar los escalares de una combinación lineal es resolver un sistema de ecuaciones, en este caso, usando la escritura de los vectores como columnas tendríamos

$$x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ -2 \\ 1 \\ b \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 3 & -2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ -2 \\ 1 \\ b \end{bmatrix}, \text{ es decir}$$

el sistema

$$\begin{aligned} x - y &= a \\ 2x &= -2 \\ 3x - 2y &= 1 \\ 4x + 3y &= b \end{aligned}$$

PN
Gauss

$$\begin{array}{cc|c} x & y & \\ \hline 1 & -1 & a \\ 2 & 0 & -2 \\ 3 & -2 & 1 \\ 4 & 3 & b \end{array}$$

$J_2 \rightarrow J_1$
 $J_3 \rightarrow J_1$

$$\begin{array}{cc|c} x & y & \\ \hline 2 & 0 & -2 \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & a \\ 4 & 3 & b \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{I} \text{ signe} \\ \frac{1}{2} J_2 \\ \text{II} = \frac{3}{2} J_2 \\ \text{III} = J_2 \\ \text{IV} = 4 J_2 \end{array} \quad \begin{array}{cc|c} x & y & \\ \hline 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & -1 & a+1 \\ 0 & 3 & b+4 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{II} \text{ signe} \\ \frac{1}{2} J_2 \\ \text{III} = J_2 \\ \text{IV} = 3 J_2 \end{array} \quad \begin{array}{cc|c} x & y & \\ \hline 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & (a-1) \\ 0 & 0 & (b+10) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} x = -1 \\ y = 2 \\ a - 1 = 0 \\ b + 10 = 0 \end{array}$$

$$\boxed{a = 1 ; b = -10}$$

II. Sea $(V_3, +, \cdot, \mathbb{R})$ un espacio vectorial, sea $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ un conjunto de vectores linealmente independientes. Demostrar que el conjunto de los vectores $\{\vec{u}_1 + \vec{u}_2, \vec{u}_1 + \vec{u}_3, \vec{u}_2 + \vec{u}_3\}$ está formado por vectores linealmente independientes.

• Recordatorio: Que los vectores $(\vec{u}_1 + \vec{u}_2); (\vec{u}_1 + \vec{u}_3); (\vec{u}_2 + \vec{u}_3)$ sean linealmente independientes quiere decir que cualquier combinación lineal de ellos igualada al vector $\vec{0}$ está producida por escalares nulos, es decir si

$\alpha_1(\vec{u}_1 + \vec{u}_2) + \alpha_2(\vec{u}_1 + \vec{u}_3) + \alpha_3(\vec{u}_2 + \vec{u}_3) = \vec{0}$, debemos deducir que $\alpha_1 = 0, \alpha_2 = 0, \alpha_3 = 0$. Veamos:

$\alpha_1 \vec{u}_1 + \alpha_1 \vec{u}_2 + \alpha_2 \vec{u}_1 + \alpha_2 \vec{u}_3 + \alpha_3 \vec{u}_2 + \alpha_3 \vec{u}_3 = \vec{0}$, entonces
 $[\alpha_1 + \alpha_2] \vec{u}_1 + [\alpha_1 + \alpha_3] \vec{u}_2 + [\alpha_2 + \alpha_3] \vec{u}_3 = \vec{0}$, pero como $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$ son linealmente independientes los escalares $(\alpha_1 + \alpha_2); (\alpha_1 + \alpha_3); (\alpha_2 + \alpha_3)$ que producen la combinación lineal nula ($= \vec{0}$) deben ser cero, es decir

$$\begin{array}{l} \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \\ \alpha_1 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \\ \alpha_1 - \alpha_2 = 0 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} 2\alpha_1 = 0 \Rightarrow \boxed{\alpha_1 = 0} \\ \alpha_1 + \alpha_2 = 0; 0 + \alpha_2 = 0 \\ \boxed{\alpha_2 = 0} \Rightarrow \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ \Rightarrow \boxed{\alpha_3 = 0} \end{array}$$

es decir $\alpha_1 = 0, \alpha_2 = 0, \alpha_3 = 0$ son escalares cero, verificándose de los vectores $(\vec{u}_1 + \vec{u}_2); (\vec{u}_1 + \vec{u}_3); (\vec{u}_2 + \vec{u}_3)$ son linealmente independientes porque lo son también los vectores $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$ de donde proceden.

III.- Dado el conjunto $U = \{(x, y, z) \mid x+y+z=1, x, y, z \in \mathbb{R}\}$ \cup
 $U \subset \mathbb{R}^3$, estudiar si U tiene estructura de subespacio
 vectorial del espacio $(\mathbb{R}^3, +, \cdot, \mathbb{R})$.

- Recordatorio. Si U es subespacio vectorial, entonces
 debe verificar estas dos propiedades:

I. Si $\vec{u} \in U, \vec{v} \in U$, entonces $\vec{u} + \vec{v} \in U$

II. Si $\alpha \in \mathbb{R}, \vec{u} \in U$, entonces $\alpha \vec{u} \in U$

Pero no cumple ninguna de las dos, veamos:

Si $\vec{u} \in U$, entonces $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$ con $x_1 + y_1 + z_1 = 1$

Si $\vec{v} \in U$, entonces $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$ con $x_2 + y_2 + z_2 = 1$

pero $(\vec{u} + \vec{v}) = (x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2) = (\overbrace{x_1+x_2}^{x_3}, \overbrace{y_1+y_2}^{y_3}, \overbrace{z_1+z_2}^{z_3})$,

ahora bien, $(\vec{u} + \vec{v}) = (x_3, y_3, z_3)$ para que pertenezca a

U debe verificar que $x_3 + y_3 + z_3 = 1$, pero $(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) +$

$(z_1 + z_2) = (x_1 + y_1 + z_1) + (x_2 + y_2 + z_2) = 1 + 1 = 2 \neq 1$, de don-
 de $(\vec{u} + \vec{v}) \notin U \Rightarrow U$ no es subespacio vectorial, No es

necesario verificar que tampoco cumple la propiedad II (que
 es más fácil). [Sea $0 \in \mathbb{R}, \vec{u} = (x_1, y_1, z_1) \in U, x_1 + y_1 + z_1 = 1$, entonces

$0 \cdot \vec{u} = 0 \cdot (x_1, y_1, z_1) = (0, 0, 0), 0 + 0 + 0 = 0 \neq 1 \Rightarrow 0\vec{u} \notin U$]

IV. Dado el conjunto de vectores $S = \{(x, y, z) \mid 2x - y + z = 0$

; $x + y + z = 0\}$, donde $x, y, z \in \mathbb{R}$. Demostrar que es un sub-

espacio vectorial del espacio $(\mathbb{R}^3, +, \cdot, \mathbb{R})$. Encontrar un

conjunto finito de vectores A tal que las combinaciones
 lineales de los vectores de A coincidan con S : $S = \langle A \rangle$

El conjunto S es el conjunto de las soluciones del
 sistema de ecuaciones:

$2x - y + z = 0$, que se puede resolver por el

$x + y + z = 0$

método de Gauss:

$$\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \xrightarrow{I \leftrightarrow II} \begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \end{array}$$

III.- Dado el conjunto $U = \{(x, y, z) \mid x+y+z=1, x, y, z \in \mathbb{R}\}$ $\cup \mathbb{R}^3$, estudiar si U tiene estructura de subespacio vectorial del espacio $(\mathbb{R}^3, +, \cdot, \mathbb{R})$.

- Recordatorio. Si U es subespacio vectorial, entonces debe verificar estas dos propiedades:

I. Si $\vec{u} \in U, \vec{v} \in U$, entonces $\vec{u} + \vec{v} \in U$

II. Si $\alpha \in \mathbb{R}, \vec{u} \in U$, entonces $\alpha \vec{u} \in U$

Pero no cumple ninguna de las dos, veamos:

Si $\vec{u} \in U$, entonces $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$ con $x_1 + y_1 + z_1 = 1$

Si $\vec{v} \in U$, entonces $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$ con $x_2 + y_2 + z_2 = 1$

pero $(\vec{u} + \vec{v}) = (x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2) = (\overbrace{x_1+x_2}^{x_3}, \overbrace{y_1+y_2}^{y_3}, \overbrace{z_1+z_2}^{z_3})$,

ahora bien, $(\vec{u} + \vec{v}) = (x_3, y_3, z_3)$ para que pertenezca a

U debe verificar que $x_3 + y_3 + z_3 = 1$, pero $(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) + (z_1 + z_2) = (x_1 + y_1 + z_1) + (x_2 + y_2 + z_2) = 1 + 1 = 2 \neq 1$, de don-

de $(\vec{u} + \vec{v}) \notin U \Rightarrow U$ no es subespacio vectorial, No es

necesario verificar que tampoco cumple la propiedad II (que es más fácil). [Sea $0 \in \mathbb{R}, \vec{u} = (x_1, y_1, z_1) \in U, x_1 + y_1 + z_1 = 1$, entonces

$0 \cdot \vec{u} = 0 \cdot (x_1, y_1, z_1) = (0, 0, 0), 0 + 0 + 0 = 0 \neq 1 \Rightarrow 0\vec{u} \notin U$]

IV. Dado el conjunto de vectores $S = \{(x, y, z) \mid 2x - y + z = 0; x + y + z = 0\}$, donde $x, y, z \in \mathbb{R}$. Demostrar que es un subespacio vectorial del espacio $(\mathbb{R}^3, +, \cdot, \mathbb{R})$. Encontrar un conjunto finito de vectores A tal que las combinaciones lineales de los vectores de A coincidan con S : $S = \langle A \rangle$

El conjunto S es el conjunto de las soluciones del sistema de ecuaciones:

$2x - y + z = 0$
 $x + y + z = 0$, que se puede resolver por el

método de Gauss:

$$\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \xrightarrow{I \leftrightarrow II} \begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \end{array}$$