CONJUNTO SIGUIENTE

Para todos los no terminales:

1.- Colocar $ en SGTE del símbolo inicial ✓

2.- Si $\exists\ A \to \alpha B \beta$, colocar todo lo que hay en PRIM(β) excepto ϵ, en SGTE(B)

3.- Si $\exists\ A \to \alpha B$ ó $\exists A \to \alpha B \beta$ y $\epsilon \in$ PRIM(β), colocar todo lo que está en SGTE(A) en SGTE(B)

$E \to TE'$

$E' \to +TE' \mid \epsilon$

$T \to FT'$

$T' \to *FT' \mid \epsilon$

$F \to (E) \mid id$

$P(E) = \{(, id\}$

$P(E') = \{+\} \cup \{\epsilon\} = \{+, \epsilon\}$

$P(T) = \{(, id\}$

$P(T') = \{*\} \cup \{\epsilon\} = \{*, \epsilon\}$

$P(F) = \{(\} \cup \{id\} = \{(, id\}$

$S(E) = \{\$,)\}$

$S(E') = \{\$,), \$\} = \{\$,)\}$

$S(T) = \{+, \$,)\}$

$S(T') = \{SGTE(T)\} = \{+, \$,)\}$

$S(F) = \{*, +, \$,)\}$

$\sum = \{(,), id, *, +\}$

$F \to (E)$

$A \to \alpha B \beta$

$B \to a \mid ab$

$\{a\} \cup \{a\} = \{a\}$

$A \to abC$

$C \to d \mid f$

$Y \to ABC$

bexpr → bexpr or bterm | bterm

bterm → bterm and bfactor | bfactor

bfactor → not bfactor | (bexpr) | true | false

S(bexpr) = { $, or,) }

S(bterm) = { and, $, or,) }

S(bfactor) = { and, $, or,) }

P(bexpr) = { not, (, true, false }

CONJUNTO SIGUIENTE

Para todos los no terminales:

1.- Colocar $ en SGTE del símbolo inicial ✓

2.- Si $\exists\ A \to \alpha B \beta$, colocar todo lo que hay en PRIM(β) excepto ϵ, en SGTE(B)

3.- Si $\exists\ A \to \alpha B$ ó $\exists\ A \to \alpha B \beta$ y $\epsilon \in$ PRIM(β), colocar todo lo qué está en SGTE(A) en SGTE(B)

TABLA DE ANALISIS SINTACTICO M

Para c/prod $A \to \alpha$ de la gramática: ε y $ no son TERMINALES

1.- Para c/terminal a en P(A), agregar $A \to \alpha$ en $M[A, a]$.

2.- Si ε está en P(α), entonces para c/terminal b es S(A), agregar $A \to \alpha$ en $M[A, b]$

- Si ε está en P(α), y $ en S(A), agregar $A \to \alpha$ en $M[A, \$]$

		P	S
$E \to TE'$		P(E): {(, id}	S(E): {$,)}
$E' \to +TE'$	ε	P(E'): {+, ε}	S(E'): {$,)}
$T \to FT'$		P(T): {(, id}	S(T): {+, $,)}
$T' \to *FT'$	ε	P(T'): {*, ε}	S(T'): {+, $,)}
$F \to (E)$	id	P(F): {(, id}	S(F): {*, +, $,)}

$S \to aSbS \mid bSaS \mid \epsilon$

M	(	)	id	*	+	$
E	$E \to TE'$		$E \to TE'$			
E'		$E' \to \epsilon$			$E' \to +TE'$	$E' \to \epsilon$
T	$T \to FT'$		$T \to FT'$			
T'		$T' \to \epsilon$		$T' \to *FT'$	$T' \to \epsilon$	$T' \to \epsilon$
F	$F \to (E)$		$F \to id$			

$P(S) = \{i\}$ $S(S) = \{\$, e\}$

$P(S') = \{e\} \cup \alpha \mid \alpha \in P(S')\} = \{\$, e\}$

$P(E) = \{b\}$ $S(E) = \{t\}$

M	i	t	e	b	$
S	S→iEtSS'				
S'			S'→eS S'→ϵ		S'→ϵ
E				E→b	

TABLA DE ANALISIS SINTACTICO M

Para c/prod A→K de la gramatica

1. Para c/terminal a en P(A), agregar A→K en M[A,a]
2. Si ϵ está en P(K), entonces para c/terminal b en S(A), agregar A→K en M[A,b]
   Si ϵ está en P(K), y $ en S(A), agregar A→K en M[A,$]

M	a	b	$
S	S→aSbS'	S→bSaS'	S→ϵ
	S→ϵ	S→ϵ	

$E \to TE'$

$E' \to +TE' \mid \epsilon$

$T \to FT'$

$T' \to *FT' \mid \epsilon$

$F \to (E) \mid id$

$P(E) = \{(, id\}$

$P(E') = \{+, \epsilon\}$

$P(T) = \{(, id\}$

$P(T') = \{*, \epsilon\}$

$P(F) = \{(, id\}$

$S(E) = \{\$,)\}$ ① $S \to aSbS \mid bSaS \mid \epsilon$

$S(E') = \{\$,)\}$ ② $S \to iEtSS'$

$S(T) = \{+, \$,)\}$ $S' \to eS \mid \epsilon$

$S(T') = \{+, \$,)\}$ $\epsilon \to b$

$S(F) = \{*, +, \$,)\}$ $S \to aSbS \mid bSaS \mid c$

M	(	)	id	*	+	$
E	E→TE'		E→TE'			
E'		E'→ϵ			E'→TE'	E'→ϵ
T	T→FT'		T→FT'			
T'		T'→ϵ		T'→*FT'	T'→ϵ	T'→ϵ
F	F→(E)		F→id			