

# Espacios Vectoriales

## Álgebra II

### 1 Definición

Sea  $V$  un conjunto cuyos elementos se llamarán vectores en el cual se definen dos operaciones :

- Suma de vectores
- Producto de un vector por un escalar  $k \in \mathbb{R}$

Estas operaciones cumplen las siguientes propiedades:

Propiedades de la Suma:

1. **Cerrada:** Si  $\vec{u}, \vec{v} \in V \Rightarrow \vec{u} + \vec{v} \in V$
2. **Conmutativa:**  $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$  para todo  $\vec{u}, \vec{v} \in V$
3. **Asociativa:**  $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
4. **Elemento Neutro:**  $\exists \vec{0} \in V / \vec{0} + \vec{x} = \vec{x} \forall \vec{x} \in V$
5. **Vector Inverso:**  $\forall \vec{x} \in V$ , existe un vector inverso  $-\vec{x} / \vec{x} + (-\vec{x}) = \vec{0}$

Propiedades del producto:

1. **Cerrada:** Si  $\vec{x} \in V \Rightarrow k \cdot \vec{x} \in V$
2. **Neutro:**  $1 \cdot \vec{x} = \vec{x} \forall \vec{x} \in V$
3. **Asociativa:**  $k_1 \cdot (k_2 \cdot \vec{x}) = (k_1 \cdot k_2) \cdot \vec{x}$
4. **Distributiva:**  $k \cdot (\vec{x} + \vec{y}) = k \cdot \vec{x} + k \cdot \vec{y}$
5. **Distributiva:**  $(k_1 + k_2) \cdot \vec{x} = k_1 \cdot \vec{x} + k_2 \cdot \vec{x}$

## 2 Subespacios

**Definición:** Un subconjunto  $S$  no vacío de  $V$  e.v. es un subespacio de  $V$  si la suma y el producto definidas en  $V$  estructuran también a  $S$  como un espacio vectorial

Propiedades necesarias para que  $S \subseteq V$  sea subespacio

1. Si  $\vec{x} \in S$  e  $\vec{y} \in S \Rightarrow \vec{x} + \vec{y} \in S$
2. Si  $\vec{x} \in S \Rightarrow k \cdot \vec{x} \in S$
3.  $\vec{0} \in S$

### 2.1 Definiciones

1. **Combinación Lineal:**  $\vec{x}$  es una combinación lineal de los vectores  $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_k$  si existen escalares  $k_1, k_2, \dots, k_k$  tal que  $\vec{x} = k_1\vec{x}_1 + k_2\vec{x}_2 + \dots + k_k\vec{x}_k$
2. **Sistema de Generadores:** Un conjunto de vectores  $M = \{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_k\}$  es un sistema de generadores de  $V \Leftrightarrow \forall \vec{v} \in V, \vec{v} = \alpha_1\vec{x}_1 + \alpha_2\vec{x}_2 + \dots + \alpha_k\vec{x}_k$

#### 3. Conjunto de vectores linealmente independiente y linealmente dependiente:

Sea  $M = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k\}$  tal que  $\vec{v}_i \in V \forall i$ , y sea  $\alpha_1\vec{x}_1 + \alpha_2\vec{x}_2 + \dots + \alpha_k\vec{x}_k = \vec{0}$  (o sea una combinación lineal de ellos igualada a  $\vec{0}$ )

Nos queda entonces un sistema lineal homogéneo que puede tener:

- a) Solución Única: La única solución es la trivial, por lo que  $M$  es un conjunto **Linealmente Independiente (L.I.)**
- b) Infinitas Soluciones:  $M$  es un conjunto **Linealmente Dependiente (L.D.)**

### 3 Base de un Espacio Vectorial

**Definición:** Dado  $V$  e.v. y  $B = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$  tal que  $\forall \vec{v}_i \in V$  decimos que  $B$  es una base de  $V$  si y sólo si se cumple:

- a)  $B$  es un conjunto L.I.
- b)  $B$  es un sistema de generadores de  $V$

Ejemplos de bases canónicas:

- **En  $\mathbf{R}^n$ :**  $(1,0,0,\dots,0), (0,1,0,\dots,0), \dots (0,0,0,\dots,1)$
- **En  $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ :**  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- **En  $\mathbf{P}_n$ :**  $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$

### 4 Coordenadas de un vector respecto de una base

Dado  $B = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$  una base de  $V$  (e.v.) y dado  $\vec{x} \in V$

$\Rightarrow$  Se denomina a los escalares  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  tal que  $\vec{x} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2 + \dots + \lambda_n \vec{e}_n$  como **coordenadas de  $\vec{x}$**  respecto de la base  $B$  y se escribe  $\vec{x}|_B$

Por lo tanto:  $\vec{x}|_B = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$

## 5 Proposiciones

### 5.1 Las coordenadas de un vector respecto de una base son únicas

**Hipótesis:** V e.v.  $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$  base de V,  $\vec{x} \in V$

**Tesis:** Existe una única n-upla  $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$  tal que  $\vec{x} = \alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2 + \dots + \alpha_n \vec{e}_n$

**Demostración:** Supongo que existen 2 n-uplas que satisfacen la definición de coordenadas respecto de una base, es decir:

$$\vec{x} = \alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2 + \dots + \alpha_n \vec{e}_n = \beta_1 \vec{e}_1 + \beta_2 \vec{e}_2 + \dots + \beta_n \vec{e}_n$$

Pasando al segundo miembro y sacando factor común  $\vec{e}_i$  nos queda:

$$(\alpha_1 - \beta_1) \cdot \vec{e}_1 + (\alpha_2 - \beta_2) \cdot \vec{e}_2 + \dots + (\alpha_n - \beta_n) \cdot \vec{e}_n = \vec{0}$$

Como  $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$  es una base de V, es decir se trata de vectores L.I. Esto significa que si tengo una combinación lineal de ellos igualada a  $\vec{0}$ , sus escalares son = 0.

Por lo tanto,  $\alpha_i = \beta_i \forall i$ .

### 5.2 Si un espacio vectorial tiene una base de n elementos , entonces cualquier conjunto de n+1 elementos es un conjunto l.d.

**Hipótesis:** V e.v.  $B = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$  base de V,  $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n, \vec{x}_{n+1}\}$  conjunto de n+1 elementos

**Tesis:**  $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n, \vec{x}_{n+1}\}$  es L.D.

**Demostración:** Para demostrar si un conjunto es l.i. debo probar que cualquier combinación lineal de sus vectores igualada a  $\vec{0}$  tiene una única solución (La solución trivial). Para probar que es L.D., una combinación lineal de dichos vectores igualada a  $\vec{0}$  tendrá infinitas soluciones.